

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Φοράτε κατάλληλες μπότες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης, να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. **Σε περίπτωση ασυμπίπτουσας ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία,** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** αφαιρέστε τα εμπίπτωμενα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά το προσβεβλημένο μέρος του σώματος με νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ). ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΓΙΑ 1 ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΦΕΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΝΤΟΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΗΣΗΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑ Η ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΤΣΙΖΑΝΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ Ή ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΣΙΖΑΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Το κενό υλικό συσκευασίας ξεπλένεται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (α νερό του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρίψιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τοποθετημένο από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Assist®

10EC

Κυpermethrin (Συπερμεθρίν) 10% Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό

Εγγυημένη σύνθεση: **Cypermethrin** 10% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 88,4% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. ρφ.: 14374/28.12.2011

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου. Επίσης ασκεί αντιτρωφική δράση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΑΤΜΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΠΗΝΗΙΑ ΚΑΙ ΖΑΛΗ
ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ



Κάτοχος της έγκρισης-Υπευθύνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Cedre Deux SAS - Γαλλία

Συσκευαστής-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσα/νίκης: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωλία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΑΣΙΣΤ 10: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευρικούς των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτρωφική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος εξασφαλίζοντας ποτή καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά 3/4 και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού)-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ: Δοσολογία, Κογχυλίδιο, Δόση: 30-60. **ΜΑΡΟΥΛΙ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου):** Πρόσανο ακουλή, Πρόσανο αψίδα, Δόση: 37.5-50. **ΤΟΜΑΤΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου):** Πρόσανο ακουλή, Πρόσανο αψίδα, Δόση: 30-60. **ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ-ΜΠΡΟΚΟΛΟ-ΛΑΧΑΝΟ (Υπαίθρου):** Πρόσανο αψίδα, Δόση: 30. Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):

Αμπέλι, Τομάτα-Μελιτζάνα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου) (50-100). Κουνουπίδι-Μπρόκολο-Λάχανο (Υπαίθρου) (100). Μαρούλι (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου) (60-80).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:

Αμπέλι: μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Μαρούλι (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)-Τομάτα-Μελιτζάνα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): 1. Κουνουπίδι-Μπρόκολο-Λάχανο (Υπαίθρου): μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις:

Οι μικρές δόσεις σκευάσματος ανά 100λίτρο χρησιμοποιούνται με τους μεγάλους όγκους ψεκαστικού διαλύματος και οι μεγάλες δόσεις σκευάσματος ανά 100λίτρο με τους μικρούς όγκους ψεκαστικού διαλύματος, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα (30 κ.εκ.).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

• Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών βιοηλικών μεθόδων, ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. • Εφαρμογές μόνον όταν είναι απαραίτητο, με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς και με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα αρθρόποδα. • Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. • Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με Assist* 10 EC. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλασσόμενα εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα πυρεθρινοειδή. • Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνουν με σκεύασμα διαφορετικής ομάδας.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινολογιστικό), Μαρούλι (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου), Κουνουπίδι-Μπρόκολο-Λάχανο: 7 ημέρες.

Τομάτα-Μελιτζάνα: 7 ημέρες (Υπαίθρου), 3 ημέρες (Θερμοκηπίου).