L163613 GREC/1Q

Atemi®
10 WG

syngenta®

Cyproconazole (συπροκοναζόλη)
(Ομάδα τριαζόλες/DMIs)

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Cyproconazole 10% β/β
Βοηθητικές ουσίες 89,4% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ. Τροφ.: 60156/28-1-2008

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζόλες) με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

*ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: **Syngenta Hellas A.E.B.E.**,*
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: Βί.Πε. Θ. Σινδός, Τηλ.: 231 0796940-3
*ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: **Kwizda Agro GmbH**, Αυστρία*

Product names marked ® or ™, the ALL BRACE TRIANGLE, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE LOGO are Trademarks of a Syngenta Group Company

150 gr

Xn

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- *Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.*

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- *Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.*

TM

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ:
• Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο. • Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. • Μη χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβάλλομα για να αποφευκθεί ρύπανση του περιβάλλοντος. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά το ψεκασμό. • Μα μην χρησιμοποιείται από έγκυες γυναίκες ή παρουσία εγκύων γυναικών. • Αποφύγετε την εξειδέρωσή του στο περιβάλλον. Ανοφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό και κρατήστε ανοικτό νοτιά.
Σε περίπτωση επαφής με το μάτι: Ξεπλύνετέ τα ομέδως με κάθαρο νερό για αρκετά λεπτά, κρατώντας το βλέφαρα ανοικτά και συμβουλευθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα περιμμένα ρούχα και πλύθείτε με νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετέ τον πρόκνιτα από την επικίνδυνη περίοχή. Εάν δεν αναπνέει σωστά εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή και καλέστε γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμού φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε το 1/3 του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό, προσθέστε την καθορισθείσα δόση ή την υδατοδιαλυτό σάκκο στο νερό, ανακατέψτε καλά και γεμίστε το ψεκαστικό με νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Οδηγίες για την ασφαλή απόρριψη της συσκευασίας:
Τα κενά μέσα συσκευασίας (βαζάκια, σακούλες) ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τρίπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίνουμε στο ψεκαστικό υγρό), καταστρέφονται με τρύπημα ή σκίσιμο ανιστοτικά, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης και ενημερώνονται όλα οι σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

L163613 GREC/1Q

Atemi®
10 WG

syngenta®

Cyproconazole (συπροκοναζόλη)
(Ομάδα τριαζόλες/DMIs)

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Cyproconazole 10% β/β
Βοηθητικές ουσίες 89,4% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ. Τροφ.: 60156/28-1-2008

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζόλες) με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

*ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: **Syngenta Hellas A.E.B.E.**,*
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: Βί.Πε. Θ. Σινδός, Τηλ.: 231 0796940-3
*ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: **Kwizda Agro GmbH**, Αυστρία*

Product names marked ® or ™, the ALL BRACE TRIANGLE, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE LOGO are Trademarks of a Syngenta Group Company

150 gr

Xn

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- *Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.*

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- *Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.*

TM

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Μηλιά: *Για βουλκιλάδιο (Venturia inaequalis) 10-15 γρ. ακ./100 λίτρα ψεκ. υγρού η 30 γρ. ακ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα/στρέμμα. Έως 4 εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής και εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Στις περιοχές που εφαρμόζεται σύστημα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι σχετικές συστάσεις των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών.*
Ροδακινιά: *Για βαιά σήψη (Sclerotinia laxa) 10-15 γρ. ακ./100 λίτρα ψεκ. υγρού η 37,5 γρ. ακ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-250 λίτρα/στρέμμα. Έως 3 εφαρμογές στην εκπτύξη των ανθοβλαστών, στη ρόδινη κορυφή και στην πλήρη άνθιση.*
Αμπέλι: *Για Οίδιο (Uncinula necator) 10-15 γρ. ακ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 22,5 γρ. ακ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα. Έως 4 εφαρμογές στον οι βλαστοί αποκτήσουν 3-4 φύλλα, στην άνθηση και δύο μετά το δέσιμο των ραγών.*
Σπαράγι: *Για Σκωρίαση (Puccinia asparagi) 20-30 γρ. ακ./100 λίτρα ψεκ. υγρού η 30 γρ. ακ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Έως 6 εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 15 ημέρες.*

Παρατηρήσεις: *Τα εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής.*

Φυτοτοξικότητα: *Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καθήκοντες και τις συνιστώμενες δόσεις.*

Διαχείριση ανθεκτικότητας:
1. Οι επεμβάσεις με το σκεύασμα, πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτή.
2. Χρήση μόνο της εγκεκριμένης δοσολογίας.
3. Ορθή εφαρμογή ψεκασμών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Μηλιά: *90 ημέρες. **Ροδακινιά:*** *21 ημέρες.*
Αμπέλι: *28 ημέρες. **Σπαράγι:*** *90 ημέρες.*

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται στην κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Αρ. Παρτίδας:
Ημ/νία Παραγωγής: