



K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1



K-31951/31307 - GREECE - (BASE) - PAGE 2

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  
ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 8099/3.7.95

Παρασκευαστής - Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική  
συσκευασία και σήμανση - Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά - Διανομέας:



ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Υδρας 2 και Α.Κηφισίας 280 - 152 32 Χαλάνδρι  
Τηλ. 210 688 9700

Τυποποιητής και συσκευαστής:

DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Γαλλία



50 Κ.Ε.Κ. e

**ATONIK® SL**

Πυκνό διάλυμα

Εγγυημένη σύνθεση:  
sodium ortho-nitrophenolate 0,6% β/ο  
sodium para-nitrophenolate 0,9% β/ο  
sodium 5-nitroguaiacolate 0,3% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες 98,20% β/β  
Φυτορρυθμιστική ουσία που επιβράδυνει την ανάπτυξη,  
καρπόδεση και ριζοβολία των φυτών



Χρονική σταθερότητα του  
σκευάσματος - συνθήκες  
αποθήκευσης:  
Το σκεύασμα αποθηκευμένο  
καλά κλειστό στην αρχική του  
συσκευασία, σε θερμοκρασίες  
25-50° C διατηρείται σταθερό  
για 3 χρόνια.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** • Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.  
• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές • Όταν  
το χρησιμοποιείτε μην τρώτε ή καπνίζετε. • Μην  
ζευαλω χρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας.  
**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Σε περίπτωση ατυχήματος  
ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό  
αντίδοτο.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη,  
του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.  
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.  
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

K-31951/31307 - GREECE

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR



K-31951/31307 - GREECE - PAGE 3

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:**

• Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

Σε περίπτωση ατυχήματος ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

NOIR



K-31951/31307 - GREECE - PAGE 4

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προ ιόντων καθώς και για το περιβάλλον.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - συνθήκες αποθήκευσης:** Το σκεύασμα αποθηκευμένο καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε θερμοκρασίες 25-50° C διατηρείται σταθερό για 3 χρόνια.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 8099/3.7.95

NOIR





Κ-31951/31307 - GREECE - PAGE 5

Παρασκευαστής - Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση - Υπεύθυνος  
διάθεσης στην αγορά - Διανομέας:



**ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Υδρας 2 και Α.Κηφισίας 280

152 32 Χαλάνδρι

Τηλ. 210 688 9700

Τυποποιητής και συσκευαστής:

**DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Γαλλία**

NOIR



K-31951/31307 - GREECE - PAGE 6

#### **ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**

Φυτορρυθμιστική ουσία που επιδρά στην ανάπτυξη, καρπόδεση και ριζοβολία των φυτών.

Το ΑΤΟΝΙΚ είναι διεγέρτης της φυσικής δραστηριότητας των φυτών. Έχει σαν αποτέλεσμα την επιτάχυνση και αύξηση ριζοβολίας, επιτάχυνση και ομοιομορφία στο φύτευμα, πρωίμηση και αύξηση στην ανάπτυξη και βελτίωση στην ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής.

Το ΑΤΟΝΙΚ έχει επίσης επίδραση στο παρθενοκαρπικό δέσιμο και ιδιαίτερα στη βελτίωση της βλάστησης της γύρης και στην επιμήκυνση του γυρεοσωλήνα και έτσι εξασφαλίζει καλύτερη γονιμοποίηση και σχηματοποίηση των καρπών.

#### **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Διαβροχή σπόρου, διαβροχή βάσεων μοσχευμάτων-εμβολίων, ψεκασμοί, πότισμα.

**NOIR**





Κ-31951/31307 - GREECE - PAGE 7

#### **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ**

Ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο μισογεμισμένο με νερό δοχείο ψεκασμού και συμπληρώνουμε με νερό αναδεύοντας.

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1. Να μην εφαρμόζεται πριν από βροχή γιατί εκπλένεται εύκολα.
2. Για να αξιοποιηθεί η διέγερση του φυτικού οργανισμού που προκαλεί το ATONIK, τα φυτά πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα θρεπτικά στοιχεία.  
Γι αυτό όταν χρησιμοποιείτε ATONIK, προσθέστε και λίπασμα που θα δώσει στο φυτό ό, τι χρειάζεται για καλύτερη ανάπτυξη.
3. Σε ορισμένες περιπτώσεις φυτών που διαβρέχονται δύσκολα (π.χ. βαμβάκι, σόγια, ρύζι κ.λ.π.) συνιστάται η προσθήκη μη ιονικού προσκολλητικού.

**NOIR**





K-31951/31307 - GREECE - PAGE 8

#### **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ**

Το ATONIK SL δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις και υπό τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

#### **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Το σκεύασμα μπορεί να αναμιχθεί με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή λιπάσματα με ουδέτερο ή αλκαλικό pH. Στην περίπτωση προσθήκης προσκολλητικού αυτό θα πρέπει να προστεθεί στο ήδη διαλυμένο σκεύασμα.



**NOIR**



K-31951/31307 - GREECE - PAGE 9

| ΧΡΗΣΕΙΣ                                                         | ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ                                                                                                                | ΔΟΣΗ         |            | ΣΤΟΧΟΙ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                  | ΑΤΟΝΙΚ Κ.ΕΚ. | ΝΕΡΟ ΛΙΤΡΑ |                                                                              |
| ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΠΕΠΟΝΙ |                                                                                                                                  |              |            |                                                                              |
| Σπόρος                                                          | Διαβροχή σπόρου επί 8 ώρες                                                                                                       | 1,5          | 6          | Διακοπή του ληθάργου. Ομοιόμορφο και γρήγορο φύτερωμα σπόρου.                |
| Σπορείο                                                         | 1 <sup>ος</sup> ψεκασμός στα 2-4 πραγματικά φύλλα και στη συνέχεια κάθε 5 μέρες μέχρι τη μεταφύτευση. Συστήνεται ελαφρύ πότισμα. | 1,5          | 6          | Ανάπτυξη ριζικού συστήματος στο σπορείο και γρήγορη ανάπτυξη υγιών φυταρίων. |

NOIR

K-31951/31307 - GREECE - PAGE 10

|                     |                                                          |     |     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Μεταφύτευση         | Εμβάπτιση των ριζών πριν τη μεταφύτευση.                 | 1,5 | 6   | Ταχεία ανάπτυξη ριζικού συστήματος μετά τη μεταφύτευση και γρήγορη ανάπτυξη των φυτών. |
| Ψεκασμοί ανάπτυξης  | 3-4 ψεκασμοί ανά 7 μέρες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. | 17  | 100 | Ταχεία ανάπτυξη φυλλικής επιφάνειας και φυτών.                                         |
| Ψεκασμοί καρπόδεσης | 1-2 ψεκασμοί στα μπουμπούκια πριν την άνθηση.            | 17  | 100 | Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.     |

NOIR

K-31951/31307 - GREECE - PAGE 11

| ΧΡΗΣΕΙΣ             | ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ                                                                                                                                                  | ΔΟΣΗ         |              | ΣΤΟΧΟΙ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                    | ΑΤΟΝΙΚ Κ.ΕΚ. | ΝΕΡΟ ΛΙΤΡΑ   |                                                                                                |
| ΒΑΜΒΑΚΙ             |                                                                                                                                                                    |              |              |                                                                                                |
| Ψεκασμοί ανάπτυξης  | Ένας ψεκασμός στα 2 πραγματικά φύλλα                                                                                                                               | 10           | για 1 στρεμ. | Ταχεία, υγιής και ζωνηρή ανάπτυξη βλαστικών μερών                                              |
| Ψεκασμοί καρπόδεσης | 1 <sup>ος</sup> ψεκασμός:<br>Στα πρώτα χτένια<br>2 <sup>ος</sup> ψεκασμός:<br>Στα πρώτα άνθη<br>3 <sup>ος</sup> ψεκασμός:<br>Αφού δέσουν αρκετά παραγωγικά καρύδια | 20           | για 1 στρεμ. | Πρώιμη άνθιση, άνοιγμα και ωρίμανση καρυδιών, πρώιμη συγκομιδή, ποσότητα & ποιότητα παραγωγής. |

NOIR

K-31951/31307 - GREECE - PAGE 12

**ΚΑΠΝΟΣ**

|                           |                                                                |   |     |                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Σπορείο</b>            | Πότισμα κάθε 7 μέρες με 1 λίτρο διαλύματος ανά τετρ. μέτρο.    | 6 | 100 | Ανάπτυξη ριζικού συστήματος στα σπορεία και γρήγορη ανάπτυξη υγιών φυταρίων. |
| <b>Ψεκασμοί ανάπτυξης</b> | Μετά την μεταφύτευση 4 ψεκασμοί ανά 7 μέρες μέχρι 1 μήνα μετά. | 8 | 100 | Βελτίωση μεγέθους και ποιότητας καπνοφύλλων.                                 |

**NOIR**

K-31951/31307 - GREECE - PAGE 13

| ΧΡΗΣΕΙΣ            | ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ                                                       | ΔΟΣΗ         |            | ΣΤΟΧΟΙ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                         | ΑΤΟΝΙΚ Κ.ΕΚ. | ΝΕΡΟ ΛΙΤΡΑ |                                                                   |
| ΠΑΤΑΤΑ             |                                                                         |              |            |                                                                   |
| Σπόρος             | Διαβροχή άκοπου πατατόσπορου σε σωρό με βρεγμένα σακκιά επί 12-24 ώρες. | 17           | 100        | Ομοιόμορφο και γρήγορο φύτευμα του σπόρου για καλοκαιρινή φυτεία. |
| Ψεκασμοί ανάπτυξης | 3-4 ψεκασμοί ανά 7 μέρες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.                | 17           | 100        | Ταχεία, υγιής και ζωηρή ανάπτυξη των φυτών.                       |

NOIR

K-31951/31307 - GREECE - PAGE 14

## ΣΟΓΙΑ

|                        |                                                                                                                          |    |     |                                                                                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ψεκασμοί<br>καρπόδεσης | 1 <sup>ος</sup> ψεκασμός: 5 μέρες μετά<br>την έναρξη της άνθησης.<br>2 <sup>ος</sup> ψεκασμός: 3-4 βδομάδες<br>αργότερα. | 17 | 100 | Βελτίωση της γονιμοποίησης<br>των ανθέων και καρπόδεσης.<br>Βελτίωση της θρέψης των<br>σπόρων και της ποιότητας<br>και ποσότητας της παραγωγής. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

NOIR

K-31951/31307 - GREECE - PAGE 15

| ΜΗΛΟΕΙΔΗ                  | ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ                                    | ΔΟΣΗ         |            | ΣΤΟΧΟΙ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                      | ΑΤΟΝΙΚ Κ.ΕΚ. | ΝΕΡΟ ΛΙΤΡΑ |                                                                                    |
| ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά) |                                                      |              |            |                                                                                    |
| Μοσχεύματα Εμβόλια        | Διαβροχή των βάσεων επί 12 ώρες.                     | 1            | 1          | Βελτίωση ριζοβολίας των μοσχευμάτων-εμβολίων.                                      |
| Μεταφύτευση               | Εμβάπτιση των ριζών πριν τη μεταφύτευση επί 12 ώρες. | 1            | 6          | Ταχεία ανάπτυξη ριζικού συστήματος στη μεταφύτευση και γρήγορη ανάπτυξη των φυτών. |

NOIR

K-31951/31307 - GREECE - PAGE 16

|                                |                                                                                                            |    |     |                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ψεκασμοί<br/>ανάπτυξης</b>  | 3-4 ψεκασμοί στο νέο<br>φύλλωμα την άνοιξη.                                                                | 17 | 100 | Ταχεία ανάπτυξη, πλούσιο και<br>υγιές φύλλωμα των δένδρων.                                                                               |
| <b>Ψεκασμοί<br/>καρπόδεσης</b> | 2-3 ψεκασμοί, κάθε<br>10-12 μέρες, ιδιαίτερα στα<br>μπουμπούκια, αρχίζοντας<br>3 βδομάδες πριν την άνθηση. | 17 | 100 | Αύξηση γονιμότητας γύρης,<br>καλύτερη γονιμοποίηση,<br>παρθενοκαρπικό δέσιμο,<br>βελτίωση μεγέθους &<br>ποιότητας καρπών,<br>πρωιμότητα. |

NOIR

Κ-31951/31307 - GREECE - PAGE 17

| ΧΡΗΣΕΙΣ             | ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ                                                                                  | ΔΟΣΗ         |            | ΣΤΟΧΟΙ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                    | ΑΤΟΝΙΚ Κ.ΕΚ. | ΝΕΡΟ ΛΙΤΡΑ |                                                                                                                           |
| ΑΜΠΕΛΙ-ΣΤΑΦΙΔΑ      |                                                                                                    |              |            |                                                                                                                           |
| Ψεκασμοί ανάπτυξης  | 3-4 ψεκασμοί με την έκπτυξη της βλάστησης.                                                         | 17           | 100        | Ταχεία, υγιής και ζωνηρή ανάπτυξη των φυτών.                                                                              |
| Ψεκασμοί καρπόδεσης | Ένας ψεκασμός 10 περίπου μέρες πριν την άνθηση και 2 ψεκασμοί στην αρχή της άνθησης κάθε 10 μέρες. | 17           | 100        | Αύξηση γονιμότητας γύρης, καλύτερη γονιμοποίηση, παρθενοκαρπικό δέσιμο, βελτίωση μεγέθους & ποιότητας καρπών, πρωιμότητα. |

NOIR

K-31951/31307 - GREECE - PAGE 18

## ΡΥΖΙ

|                        |                                                                                                            |    |     |                                                                                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ψεκασμοί<br>καρπόδεσης | 1 <sup>ος</sup> ψεκασμός: Στην αρχή<br>της άνθησης (φόβες)<br>2 <sup>ος</sup> ψεκασμός: Μετά την<br>άνθηση | 17 | 100 | Βελτίωση της Γονιμοποίησης<br>των ανθέων και καρπόδεσης.<br>Βελτίωση της θρέψης των<br>σπόρων και της ποιότητας<br>και ποσότητας της παραγωγής. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

NOIR

K-31951/31307 - GREECE - PAGE 19

| ΧΡΗΣΕΙΣ                 | ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ                                          | ΔΟΣΗ         |            | ΣΤΟΧΟΙ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                            | ΑΤΟΝΙΚ Κ.ΕΚ. | ΝΕΡΟ ΛΙΤΡΑ |                                                                        |
| ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ-ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ |                                                            |              |            |                                                                        |
| Μοσχεύματα Εμβόλια      | Για θάμνους: Διαβροχή των βάσεων επί 12 ώρες.              | 1            | 6          | Βελτίωση ριζοβολίας.                                                   |
|                         | Για ανθοκομικά: Διαβροχή των βάσεων επί 15 λεπτά της ώρας. | 1            | 12         | Βελτίωση ριζοβολίας.                                                   |
| Σπορείο                 | Πότισμα κάθε 2-3 μέρες με 1 λίτρο διάλυμα ανά τετρ. μέτρο. | 3            | 100        | Ανάπτυξη ριζικού συστήματος στο σπορείο και γρήγορη ανάπτυξη φυταρίων. |

NOIR

K-31951/31307 - GREECE - PAGE 20

|                    |                                                          |    |     |                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| Μεταφύτευση        | Εμβάπτιση των ριζών πριν τη μεταφύτευση                  | 1  | 6   | Ταχεία ανάπτυξη ριζικού συστήματος στη μεταφύτευση και γρήγορη ανάπτυξη των φυτών. |
| Ψεκασμοί ανάπτυξης | 3-4 ψεκασμοί ανά 7 μέρες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. | 17 | 100 | Ταχεία, υγιής και ζωνερή ανάπτυξη του φυλλώματος, ποιότητα και ποσότητα παραγωγής. |

NOIR



K-31951/31307 - GREECE - PAGE 21

**ATONIK<sup>®</sup> SL**

NOIR





K-31951/31307 - GREECE - PAGE 22

**ATONIK<sup>®</sup> SL**

NOIR



K-31951/31307 - GREECE - (REAR COVER) - PAGE 23



Εγγυημένη σύνθεση:

sodium ortho-nitrophenolate

0,6% β/ο

sodium para-nitrophenolate

0,9% β/ο

sodium 5-nitroguaiacolate

0,3% β/ο

Βοηθητικές ουσίες

98,20% β/β

Φυτορρυθμιστική ουσία που επιδρά στην ανάπτυξη,  
καρπόδεση και ριζοβολία των φυτών

**NOIR**



K-31951/31307 - GREECE - (COVER) - PAGE 24

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 8099/3.7.95

Παρασκευαστής - Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική  
συσκευασία και σήμανση - Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά - Διανομέας:



**NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**  
Υόρας 2 και Α.Κηφισίας 280 - 152 32 Χαλάνδρι  
Τηλ. 210 688 9700

Τυποποιητής και συσκευαστής:  
**DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Γαλλία**



**50 κ.εκ. e**  
**ATONIK® SL**  
Πυκνό διάλυμα

Εγγυημένη σύνθεση:  
sodium ortho-nitrophenolate 0,6% β/ο  
sodium para-nitrophenolate 0,9% β/ο  
sodium 5-nitroguaiacolate 0,3% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες 98,20% β/β  
Φυτορρυθμιστική ουσία που επιδρά στην ανάπτυξη,  
καρπόδεση και ριζοβολία των φυτών



Χρονική σταθερότητα του  
σκευάσματος - συνθήκες  
αποθήκευσης:  
Το σκεύασμα αποθηκευμένο  
καλά κλειστό στην αρχική του  
συσκευασία, σε θερμοκρασίες  
25-50° C διατηρείται σταθερό  
για 3 χρόνια.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** • Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μα-  
κριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε  
μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην εναεραριθμασείτε τα κενά υλικά συσκευασίας.  
**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Σε περίπτωση ατυχήματος ακολουθείται  
συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντιδότο.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του κατανα-  
λωτή αγροτικών προ-όντων καθώς και για το περιβάλλον.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟ-  
ΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

**K-31951/31307 - GREECE**

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

**CYAN MAGENTA JAUNE NOIR**

