

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. • Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. • Φοράτε κατάλληλα γάντια. • **Περιέχει pendimethalin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.**

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το φεκασιτικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση εισπνοής,** απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε προεπιλεγμένη ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση κατάποσης,** ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε στο δοχείο ή την ετικέτα. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 0793777

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Μην σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις συνιστώμενες, στον ίδιο αγρό, την ίδια καλλιεργητική περίοδο, πριν περάσουν 6 (6) μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

α) Εφαρμογή των εφεσθόντων μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα, κ.λπ.), ώστε να μειωθούν οι αρνητικές των εφαρμογών των απορρίψεις. β) Εφαρμογή σε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα άλλων ομάδων, με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Τελειότητα επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Καρότο: 90 ημέρες.
Λοιπές καλλιέργειες: Δεν ορίζεται λόγω πολύ ενωρίς χρόνου εφαρμογής.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΤΑΓΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΚΛΑΣΗΣ: Οι φώδες και τα δοχεία ζιζανιοκτόνων υπό πλύνει με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέβλυση (τα νερά του ξέβλυματος το ρίχνουμε στο φεκασιτικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προληπμένα με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται όλα σε σημείο συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΚΥΕΛΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Διατηρείται στην αρχική του σταθερότητα σε υστερότητα, σε μέγιστο 24, δοσοδότη και κατά ορισμένο, μακριά από θερμότητα ή ημερήσιες αλλαγές. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



01/2013-1



Διανομέας: Ντου Ποντ Ελλάς ΑΕ
Υπόας 2 και 1. Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι-Αθήνα
Τηλ.: 2106898700



Κάτοχος της έγκρισης-Υπευθυνός για την τελική συσκευασία και σήμανση:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικές Αντιστάσεις 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2112105570, Φαξ: 2112105572
Θεσ/νικη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Ονόφυτα Βοιωτίας

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΝΣΗΣ
Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΑΤΜΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΠΗΝΛΙΑ Ή ΖΑΛΗ ΕΥΦΛΕΚΤΟ



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Μέλος του



Pendimethalin (Πεντιμεθαλίνη) 33% Γαλακτωματοποίησιμο υγρό

Εγγυημένη σύνθεση: **Pendimethalin 33% β/ο**
Βοηθητικές ουσίες: 64,4% β/β
Αρωματικό διαλυτικό: Νάφθα

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Φορ.: 7983/23.04.2012

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο και αντιφυλλοξυμικό καπνού

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Xn

ΑΚΤΙΒΟΥΣ: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστικών και ημιαποχλωμένων ζιζανίων κατά το φυτόματό τους, σε διάφορες καλλιέργειες. Εφαρμόζεται και ως αντιφυλλοξυμικό καπνού. Στο βιομηχανικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της μίσχωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροαποχλωμένων της μίσχωσης στράκα. Δρα διέγερσης και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μαλαχίων οφθαλμών-φυλλοξυμ, που ακολουθεί το κορυφομήνυμα των αμερικανικών καπνών Μπέρνελ και Βιρτζίνια.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, προσαρμόζοντας με ενσωμάτωση, προφυλακτικά επιφανειακά ή χωρίς μεταφυτεύσιμα. Στην επιφανειακή εφαρμογή, αν δε βρεθεί μέσα σε 5-6 ημέρες, χρειάζεται πότισμα. Επίσης, εφαρμόζεται ως αντιφυλλοξυμικό καπνού, φεκαζόντας το κορυφομήνυμα καπνίσματος. Χρησιμοποιείται υπεκ τύπου σπρέι, φεκαζόντας με πλεον φεκασιτικού μικρότερη από 3-4 σπρέι/σφαίρες (45-60 psi).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο με φεκασιτικό μηχανισμό μέχρι τη μέση με νερό και προσθέτουμε αναδύοντας τον συσσωματωμένο όγκο του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδύοντας συνεχώς.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΚΘΡΟΙΣ (Κ.Ε.Σ./ΣΤΡ.)-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ετήσια αγροεπίτευξη* και αντιφυλλοξυμ* ζιζανίων. Καπνός (δεν αντιφυλλοξυμ) των Αμερικανικών καπνών Μπέρνελ και Βιρτζίνια. Παρεμπόδιση στην ανάπτυξη μαλαχίων οφθαλμών-φυλλοξυμ.

ΕΠΙΠΡΟΒΛΕΠΩΝ (Πορτοκαλί-Λεμονιά-Μανταρινιά-Γκρέιπ φρουτο-Φράππα-Κίτρο): Δόση: 400-600. Κατευθυνόμενος φεκασιτικός προφυλακτικό των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης την άνοιξη ή το φθινόπωρο χωρίς να βρέχονται τα πρόσωπα μέσω των δένδρων.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά-Αχλάδι)-ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροκανίδι-Νεκταρίνια-Βερνίκια-Δοξακινιά-Κεράσι): Δόση: 400-600. Κατευθυνόμενος φεκασιτικός προφυλακτικό των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης). **ΑΜΠΕΛΙ:** Δόση: 400-600. Κατευθυνόμενος φεκασιτικός προφυλακτικό των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης). **ΦΡΑΓΟΥΛΑ:** Δόση: 400-550. α) Πριν την εγκατάσταση υπαίθριος καλλιέργειας με ενσωμάτωση ή β) κατά τη λήθαργος σε εγκατεστημένη φυτεία. **ΚΑΡΟΤΟ-ΨΥΧΑΝΘΗ (Μιλιτζή-Φασόλι)-ΣΠΙΡΙΑ (Μιλιτζή-Φασόλι-Ρεβίθι-Κουκιά)-ΣΙΤΑΡΙ-ΚΡΙΑΡΙ-ΣΙΚΑΛΗ-ΑΡΑΒΟΤΙΤΕΣ:** Δόση: 400-600. Εφαρμογή προφυλακτικό της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά). **ΚΡΕΜΜΥΔΑ-ΚΟΡΟΘΑ:** Δόση: 400-500. Εφαρμογή χωρίς μεταφυτεύσιμα. **ΜΑΡΟΥΛΙ-ΡΑΠΑΝΟ:** Δόση: 400-500. Εφαρμογή χωρίς μεταφυτεύσιμα. **ΠΕΠΕΡΙΑ-ΛΑΧΑΝΟ-ΜΠΡΟΚΟΛΟ-ΚΟΛΥΝΘΥΛΙΑ:** Δόση: 400-500. Πριν τη μεταφύτευση. **ΣΠΑΡΤΑΓΙ:** Δόση: 500-600. Προφυλακτικό: α) είτε στη επιφάνεια των σομαρίων μετά την κατασκευή τους, πριν την καλλιέργεια με ηλιαστικό, β) είτε στην επιφάνεια του ισοπεδωμένου εδάφους (μετά το τέλος της συγκομιδής και την καταστροφή των σομαρίων), το αργότερο μέχρι τέλη Ιουλίου. **ΑΓΚΙΝΑΡΑ:** Δόση: 400-500. Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση ή μετά τη μεταφύτευση. **ΚΑΡΟΤΟ:** Δόση: 400-500. Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση ή μετά τη μεταφύτευση. **ΠΕΠΕΡΙΑ:** Δόση: 400-500. Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση ή μετά τη μεταφύτευση. **ΒΑΜΒΑΚΙ-ΗΛΙΑΝΘΟΣ-ΣΟΓΙΑ-ΑΡΑΧΙΔΑ:** Δόση: 400-600. Εφαρμογή προσαρμόζοντας με ενσωμάτωση ή προφυλακτικό της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά). **ΠΑΤΑΤΑ:** Δόση: 400-600. Εφαρμογή προφυλακτικό της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την φυτεύση). **ΚΑΠΝΟΣ (αν ζιζανιοκτόνο):** Δόση: 400-600. Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση ή μετά τη μεταφύτευση. **ΜΑΡΟΥΛΙ:** Δόση: 300-400. Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση ή μετά τη μεταφύτευση. **ΚΑΠΝΟΣ (αν αντιφυλλοξυμικό των Αμερικανικών καπνών Μπέρνελ και Βιρτζίνια):** Δόση: 400. Φεκασιτικός στις αρχές της πλήρους άνθησης, αφού κορφοφυλλοξυμ το καπνό αρκετά χαμηλά, με 20 κ.ε. φεκασιτικού υγρού/φύττο, διαλύματος 10 κ.ε. προϊόντος/λίτρο. **ΚΑΛΑΜΙΝΘΑ (συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας ΚΑΛΑΜΙΝΘΑ):** Δόση: 300-400. Κατευθυνόμενος φεκασιτικός προφυλακτικό των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης, μετά τη μεταφύτευση, σε καλή εγκατεστημένη φυτεία. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** Μία (1). **Όγκος φεκασιτικού υγρού (λίτρο/στρ.):** 20-50.

***Ετήσια Αγροεπίτευξη ζιζανίων:** α) Ευρασιατικά ζιζάνια: Μουστάρδα, Πρόσνη Τετάρια, Ξηνοδούλη Τετάρια, Αμαράνθος, Αλεονούρι, Κοινή ήδα β) **Μεσόγειο ευρασιατικά:** Αγορόδινη, Ήρα.
****Ετήσια Πλατυφυλλή ζιζάνια:** α) Ευρασιατικά ζιζάνια: Πιθανότατα Βήνη, Τραχύ βήνη, Αναγλή, Καφέλη, Λαυβούδι, Αγορόδινη, Αγορόδινη, Καπνοκάρτο, Καλλιόλη, Κοινό ηλιόσπορο, Μολόχα, Πολυκόμμη, Αγορόδινη, Πιθανότατα, Πιθανότατα κοινή, Ραυνοκούκος, Ραπανόδι, Κορυφομήνυμα, Σιλιόφι, Σελήνδα, Άγριο Ίνδι, Ήμερο Ίνδι, Σιλιόφι, Ζωός, Τριφύλλι, Βελόνα, Αγορόδινη, β) **Μεσόγειο ευρασιατικά:** Πεντάμυρο, Αλάδα, Μοσκάρι, Αγορόδινη, Χαμυρήλη.

Παρατηρήσεις: • **Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελοφύλλων που προέρχονται από αμπελούς στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Activus® 33EC.** • Η δράση του Activus® 33EC στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές εφαρμογή 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση - «ενεργήση» - του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος. • Στο βαμβάκι, μετά την προσαρμόζοντας με ενσωμάτωση, συνιστάται να ακολουθήσει εφαρμογή μετασποράς, προφυλακτικό της καλλιέργειας, με ένα ζιζανιοκτόνο που περιέχει τον δραστικό ουσία fluometuron στη δόση 250 κ.ε./στρ. (σχεδόν 50% περικεκταμένο, σε δυνάμει ουσία) ή 125 β.β. δραστική ουσία/στρ. για την καλλιέργεια αντιμετώπιση του σπέρνους. • Οι κυριότερες δόσεις αναφέρονται σε εφαρμογή εδάφους - χαμηλής περικεκτατότητας σε οργανική ουσία και μικρότερη πλέον προσβολή, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέγιστο αμπελό ή βαμβάκι εδάφους - μέσης έως υψηλής περικεκτατότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερη πλέον προσβολή. Στις περιπτώσεις που να χρησιμοποιούνται οι μέγιστες δόσεις και ανάλογα με τη σύσταση υγρασίας του εδάφους, είναι δυνατό να παρατηρηθεί παραδοσιακή καταστροφή ανάπτυξης της φυτείας, ειδικά σε καλλιέργειες εδαφικής υγρασίας ή/και χαμηλών θερμοκρασιών. • **Το Activus® 33EC** καταπολεμά το ζιζάνιο που φυτεύονται ή βλασκάνται σε πολύ νεαρό στάδιο (φυτρώματα-καυτηλιόδοτες). Εφόσον υπάρχουν φυτρώματα ζιζανίων, θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με σκάφη ή βότаниα ή με κατάλληλο μεταπολυτικό ζιζανιοκτόνο. • Προτείνεται ειδική καλλινοτική φυτεία: Τούλια, ελάν *Prunus* sp., Κομμεντοκόμμη, Βελούδι, Κράταρος, Ήμερο πορτοκάλι, Ποσάκιά, Μονόβλο, Δρυς, Δολιχός, Πεύκο, Λεύκα, Πλάτανος, τριφύλλι, Καρύδα, Ροδόδεντρο, Πικραλίδα, Καμυή, Γαρίφα, Κυδωνιάδα, Κυπαρίσι, Ευώνυμο, Πυρκαχιά, Φορούδι, βίβλος, Άρκευθος, Λεβάντα, Αγγελική, Μυρτιά, Πικροδάφνη, Χαμοροκάρτα, Φωτιά, Αμύγδαλο, Δάφνη Αιολιόλη, Γαύκια, Κισσός, Πελαγονία, Γασσίρι, Μυρόφι, Σπαργάνη, Φορέζ, Αιόλη, Παιώνια, Φυσταία, *Amorpha* sp. • **Το Activus® 33EC** είναι σπρέι κατά την εφαρμογή του γύρω και κάτω από ποταμία ειδική καλλινοτική (φυτεία) και καλλινοτική (φυτεία) ή/και καλλινοτική ή εκλεκτικό κατά τη σε όλες τις ποικιλίες και το υβρίδια. Ανεπιθύμητες επιπτώσεις, όπως η φυτοτοξικότητα, μπορεί να προκύψει εδαφικά διάφορα περιβαλλοντικών συνθηκών, αυθεντικών ανάπτυξης ή από τον τρόπο εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου. Επομένως, συστήνεται, πριν τη γενική χρήση, να δοκιμάσει σε ένα μικρό αριθμό φυτών και ή εξέτασή τους 1-2 μήνες μετά, για πιθανή φυτοτοξικότητα. • **Μην κινείτε καθόλου φεκασιτικό υγρό σε φυτά που μεταφύτευση.** Μην εφαρμόζετε το Activus® 33EC σε καλλινοτική φυτεία που έχουν εμβολιαστεί ή είναι σε έντονη βλάστηση ανάπτυξη ή κατά την ανθοφορία. • Μην εφαρμόζετε το Activus® 33EC σε φυτά κατά την έναρξη της ανθοφορίας ή την πρώτη βλάστηση ανάπτυξη. Μην επιτρέψετε το σταγονίδια του φεκασιτικού υγρού να πέσουν πάνω στο φύλλωμα, τους οφθαλμούς ή τα άνθη. Φροντίστε ώστε το έδαφος να μην έχει εμβολιαστεί ή ριγμένο, που ενδεχόμενα θα επηρεάσουν την επόμενη σε 20-40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση ή σε 20-40 ημέρες από τη μεταφύτευση στην οριστική τους θέση. • Μην εφαρμόζετε το Activus® 33EC σε βερνίκια ή άλλες κηλιδές κατασκευές.