



Αντόρα 400 SC

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το Adora δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο συνθέτασ του οξυκογαλακτικού (ALS) και την βιοσύνθεση αμινοξέων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ρύζι: Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*) 6,5 κ.εκ./στρέμμα + Biorower σε δόση 0,06-0,1% / στρέμμα. Πεντάνευρο ρυζιού (*Alisma plantago-aquatica*), *Heteranthera* spp., Σκίρπος (*Scirpus* spp.) 7,5 κ.εκ./στρέμμα + Biorower σε δόση 0,06-0,1% / στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 λίτρα / στρέμμα

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Μεταφυτρωτική εφαρμογή, στο στάδιο των 4-5 φύλλων (αρχή αδελφώματος) του ρυζιού.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

• Εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα από άλλες χημικές ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης για να αποφευχθεί η εξάπλωση ανθεκτικών βιοτύπων των στοχευόμενων ζιζανίων. • Ο τρόπος δράσης του bispyribac-sodium είναι όμοιος με αυτόν των σουλφονυλουριών που χρησιμοποιούνται στο ρύζι και για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας του *Echinochloa crus-galli* συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

• Να χρησιμοποιείτε καθαρό και να αποφεύγετε το σκληρό νερό.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκάσμος φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινείτε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα Adora αναδεύοντας συνεχώς. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό. Συνεχίστε την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Ψεκάστε αμέσως μετά την ανάμειξη.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος να γίνεται σε υψικαμίνους που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

Τα κενά υλικά συσκευασίας επεξεργάζονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με σχίσμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενη δόση και χρήσης στις Ελληνικές συνθήκες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο διατηρείται για 2 χρόνια.

Ημερ. Παρασκευής - Ημερ. Λήξης: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.



75 κ.εκ. Ε

Πυκνό Ελαιώρημα

Εγγυημένη σύνθεση: bispyribac-sodium 40 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 62,9 % β/β

Αρ. Εγκρ. Κυβλ.
Υ.Α.Α.Τ.:
7843/23.01.2008

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο

για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση της μουχρίτσας και πλατύφυλλων ζιζανίων στο ρύζι.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

• Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

• Πολύ τοξικό για τους υδροβίους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Απαγορεύεται η πώληση σε ερασιτέχνες καλλιεργητές.

Κάτοχος της έγκρισης,
υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα. • Να φοράτε κατάλληλα γάντια. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένου ασφαλείας. • Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Γενικές υποδείξεις:

Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Απομακρύνετε με ασφάλεια τα μολυσμένα ρούχα. Τοποθετήστε και μεταφέρετε τον παθόντα σε σταθερή θέση (ξηλωμένο στο πλάι). **Επαφή με το δέρμα:** Πλύνετε επμελώς με πολύ νερό και σαπούνι, και εάν υπάρχει, με polyethylene glycol 400 και στη συνέχεια επλύνετε με νερό. **Επαφή με τα μάτια:** Μετά από επαφή με τα μάτια, απομακρύνετε τους φακούς επαφής και πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Κατάποση: Μην προκαλέτε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Θεραπεία: Συμπτωματική.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 7793777.

N 01 0396 08



Bayer CropScience

Διανομέας:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100