

ALIAL® 80 WG

Fosetyl-al (φοζετύλ-αλ) 80%

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: fosetyl-al 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες : 16,7 % β/β

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 60.327/6-6-2012

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάτοχος έγκρισης & Παρασκευαστής: CHEMINOVA AGRO S.A.,
Paseo De La Castellana 257, 5o - 28046, Μαδρίτη, Ισπανία, Τηλ.: +34 915 530 104

Υπεύθυνος για τη διάθεση, την τελική συσκευασία & σήμανση:



NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Ύδρας 2 & Λεωφ. Κηφισίας 280,
152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ: 210 688 9777, 9778

® Σήμα κατατεθέν της E.I. DuPont de Nemours & Co (Inc).

® Σήμα κατατεθέν της Cheminova

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 2,5 κιλά



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλα γάντια. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. • Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77.93.777

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ						
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜ./ΑΝΑ ΚΑΛΛ. ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ
		γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	γρ./ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Κλημεντίνες, Γκρέιπ-φρουτ, Κίτρο, Περγαμόντο, Νεραντζιά)	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora</i> spp.)	250-300	250-450	100-150	Πρώτος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης, δεύτερος ψεκασμός τον Ιούλιο και τρίτος Οκτώβρη-Νοέμβρη	3
Μηλιά, Αχλαδιά	Φυτόφθορα λαϊμού και ριζών (<i>Phytophthora</i> spp.)	250-300	200-360	80-120	Ο πρώτος τον Απρίλιο, ο δεύτερος τον Ιούλιο και τρίτος Σεπτέμβρη- Οκτώβρη	3
Αμπέλι (οινοποιήσιμο)	Περωνόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	250-300	75-330	30-110	Ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες, εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (2)	4/10-14

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (1) Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. (2) Συνιστάται ο συνδυασμός του με μυκητοκτόνα επαφής (με δ.ο. mancozeb, folpet) για να επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία των φυτών και ειδικά στους ψεκασμούς μετά την άνθηση ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση και δρα παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σποριών αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες): Εσπεριδοειδή: 15 ημέρες, Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι (οινοποιήσιμο): 28 ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φυτοτοξικότητα: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστάμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν Mancozeb. Δεν συνδυάζεται με χαλκούχα σκευάσματα και με διαφυλλικά λιπάσματα με βάση το άζωτο. Σε περίπτωση που προηγηθεί εφαρμογή με παραφινικό λάδι, να εφαρμοστεί το ALIAL 80 WG αφού περάσει μία εβδομάδα από την εφαρμογή.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας

