



Αλιέτ 80WG

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Εσπεριδοειδή: (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέϊν-φρουτ): Φυτόφθορα (*Phytophthora parasitica*, *Phytophthora citriphthora*) **Δόση:** 250-300 γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 1200 γρ./στρέμμα). Ένας ψεκάσμος το μήνα, αρχίζοντας από την περίοδο της ενεργού βλάστησης, όταν ο καιρός είναι υγρός ή ένα ψεκάσμο στους 2-4 μήνες όταν έχουμε ξηρασία. Για τη Φυτόφθορα των καρπών ψεκάζουμε το φύλλωμα μία φορά το μήνα αρχίζοντας μόλις αλλάξει το χρώμα (1-2 ψεκάσμοι). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 200-400 λίτρα/στρέμμα.

Μηλιές: Φυτόφθορα λαιμού και ριζών (*Phytophthora cactorum*). **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 500 γρ./στρέμμα). 3-4 ψεκάσμοι στην περίοδο της ενεργού βλάστησης (άνοιξη - αρχές καλοκαιριού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-200 λίτρα/στρέμμα.

Αμπέλι: Περονόσπορος (*Plasmopara viticola*) **Δόση:** 250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 450 γρ./στρέμμα). Ψεκάσμοι στα παρακάτω στάδια: Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα.

Φράουλα: Σήψεις λαιμού (*Phytophthora cactorum*) **α)** Εμβάπτιση του ριζώματος για 15 λεπτά πριν τη φύτευση. **Δόση:** 200-250 γρ./100 λίτρα ή **β)** Ένας φυλλοψεκάσμος αμέσως μετά τη φύτευση. **Δόση:** 400 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 280 γρ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-70 λίτρα/στρέμμα.

Κρεμμύδια: Περονόσπορος (*Peronospora destructa*). **Δόση:** max 300 γρ./στρέμμα (600-750 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Ψεκάσμοι που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται δύο φορές το μήνα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-50 λίτρα/στρέμμα.

Τομάτα υπαίθρου: Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*). **Δόση:** 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 300 γρ./στρέμμα). Ψεκάσμοι που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται δύο φορές το μήνα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα.

Τομάτα θερμοκηπίου: Περονόσπορος (*Phytophthora*

infestans). **Δόση:** 300-400 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 800 γρ./στρέμμα). Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας ψεκάσμοι ανά 8-10 ημέρες. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-200 λίτρα/στρέμμα. **Αγγούρια, Κολοκυθάκια (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου):** Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). **Δόση:** 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 600 γρ./στρέμμα). Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας, δύο ψεκάσμοι το μήνα με καλό λούσιμο των φυτών. Σε περίπτωση έντονης προσβολής συνιστάται ο ψεκάσμος ανά 10ήμερο, με τη μεγαλύτερη δόση. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-200 λίτρα/στρέμμα.

Κολοκύθες, Πεπόνια, Καρπούζα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). **Δόση:** 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 600 γρ./στρέμμα). Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας, δύο ψεκάσμοι το μήνα με καλό λούσιμο των φυτών. Σε περίπτωση έντονης προσβολής συνιστάται ο ψεκάσμος ανά 10ήμερο, με τη μεγαλύτερη δόση. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Κουνουπίδι, Λάχανο: Περονόσπορος (*Peronospora parasitica*). **Δόση:** 60 γρ./τετρ. μέτρο. Δύο ριζοποτίσματα: Ένα κατά τη σπορά και ένα πριν τη μεταφύτευση.

Μαρούλι: Περονόσπορος (*Bremia lactucae*). **Δόση:** 60 γρ./τετρ. μέτρο. Δύο ριζοποτίσματα: Ένα κατά τη σπορά και ένα πριν τη μεταφύτευση.

Πράσσα: Περονόσπορος (*Phytophthora capsici*). **Δόση:** max 300 γρ./στρέμμα (375-600 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Ψεκάσμοι που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται δύο φορές το μήνα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-80 λίτρα/στρέμμα.

Πατάτα: Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*). **Δόση:** 250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 300 γρ. σκευάσματος / στρέμμα). Ψεκάσμοι που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επαναλαμβάνονται 2 φορές το μήνα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Λυκίσκος: Περονόσπορος (*Pseudoperonospora humuli*). **Δόση:** 250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 300 γρ./στρέμμα). Ψεκάσμοι 1ος όταν η βλάστηση έχει μήκος



5-10 εκ. και 2ος όταν φθάσει 20-30 εκ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **Καπνός:** Περονόσπορος (*Peronospora tabacina*). **Δόση:** 250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 300 γρ. σκευάσματος / στρέμμα). Προληπτικοί ψεκάσμοι που αρχίζουν μία εβδομάδα μετά το σταύρωμα των φυτών στο σπορείο και ψεκάσμοι στο χωράφι κάθε 14 ημέρες στην περίοδο που υπάρχει κίνδυνος προσβολής. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Κωνοφόρα: *Phytophthora cactorum*. **Δόση:** 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 500 γρ./στρέμμα). Ψεκάσμος μία φορά το μήνα στη διάρκεια της ανάπτυξης. (Συνολικά 3 ψεκάσμοι). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-200 λίτρα/στρέμμα.

Καλλωπιστικά (Φυτώρια - Σπορεία): Φυτόφθορα (*Phytophthora spp.*). Εφαρμόζεται με ενσωμάτωση στο μίγμα χώματος. **Δόση:** 400 γρ./κυβ. μέτρο χώματος. Ριζοπάση αμέσως μετά τη φύτευση ή μεταφύτευση. Επανάληψη μία φορά το μήνα. **Δόση:** 10 γρ./τετρ. μέτρο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκάσμοι φυλλώματος **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**

• Αμπέλι, μαρούλι, λάχανο, φράουλα: 14 ημέρες, • Αγγούρι: 1 ημέρα

• Λοιπές καλλιέργειες: 3 ημέρες, **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:**

Εσπεριδοειδή: (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέϊν-φρουτ): 4 ψεκάσμοι το χρόνο (τέλος Απρίλη - Μάη, Ιούνιο και Σεπτέμβριο).

Μηλιές, Αμπέλι, Αγγούρια και Κολοκυθάκια (Υ+Θ), Καπνός: 4

Φράουλα: 1 **Κρεμμύδια, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Λυκίσκος:** 2 **Τομάτα Υπαίθρου & Θερμοκηπίου, Πεπόνια - Καρπούζα - Κολοκύθες (Υ+Θ), Πράσσα, Πατάτα, Κωνοφόρα, Καλλωπιστικά (Φυτώρια - Σπορεία):** 3



Καθ. βάρος 400 γρ. **e** **Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:** 6651 / 4-7-96

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι
Εγγυημένη σύνθεση: foseyl - Al 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 16,67% β/β

Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο
με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

• Ερεθίζει τα μάτια.

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

Κάτοχος της έγκρισης,
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE



ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε στο ψεκαστικό την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενη χρήση και δόση, στις ελληνικές εδαφολογικές συνθήκες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμένους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

Τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: Διατηρείστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε μέρος ξηρό, προστατευόμενο από υγρασία, μακριά από πηγές θερμότητας ή απινθήρες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερ. Παρασκευής – Ημερ. Λήξης: Βλέπε στο καπάκι του κυτίου.

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε εσωτερική συσκευασία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε στον παθόντα εάν έχει τις αισθήσεις του 2-3 ποτήρια νερό ή γάλα και μία κουταλιά σιρόπι IPECAC για να προκληθεί εμετός. Εάν δεν έχει προκληθεί εμετός σε 20 λεπτά, επαναλάβετε ακόμη μία φορά τη χορήγηση σιροπίου. Διαφορετικά προκαλέστε τον εμετό με το δάχτυλό σας. Μην προκαλείτε εμετό σε αναισθητό άτομο. Εάν πέσει στο δέρμα πλυθείτε με νερό και σαπούνι. Σε όλες τις περιπτώσεις ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

N 12 0475 10

