

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιεκτικός του να εναποθεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. • Το υλικό και ο περιεκτικός του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικινδύνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας. «Οι εργάτες θα πρέπει να φοράνε προστατευτική ενδυμασία και γάντια εάν πρέπει να εισέλθουν στο ψεκασμένο αγρό αμέσως/σύντομα μετά τον ψεκασμό.» «Για να αποφευχθεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: **Γενικές πληροφορίες:** Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπασε ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση προβλήματος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το φύλλο ορθού χειρισμού στο γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Κρατήστε τον ασθενή ήμερο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά τουλάχιστον, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλέτε εμετό αν δεν συμβουλευθείτε γιατρό. Μην προκαλέτε εμετό ή μη δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει ασπασμούς.

Το σκεύασμα περιέχει Proxel GXL, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 - 7793777

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αμέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων μέχρι τα επιφανειακά ύδατα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Πράσιν. Καύση σε εγκατεστημένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο απόθεσής. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης: 1100°C για 2 sec. **Συσκευασίες:** Οι δόσεις συσκευασίες να ξεπλύνονται 3 φορές και το νερό το ξεπλύνματος να προστεθεί στο ψεκαστικό διάλυμα. Το πλύσιμο υπό πίεση της δόσης συσκευασίας δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες να μην ανακυκλώνονται και να απορριφθούν σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και την καλύτερη διαθέσιμη πρακτική. **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Αποθηκευμένο στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από θερμότητα, υγρασία, άμεσο ηλιακό φως και σε θερμοκρασία μικρότερη των 40°C, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.



Metaflumizone (Μεταφλουμιζόν) Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: metaflumizone 24% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 76.6% β/β



Εντομοκτόνο με βάση τη δραστική ουσία metaflumizone που δρα κυρίως δια της κατάποσης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



- **Επιβλαβές:** κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.
- **Ερεθίζει τα μάτια.**
- **Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 14326/17-2-2009/25-6-2013

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΕΙΔΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ.Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, Τηλ.:210-6860130, www.basf-agro.gr

® Σήμα κατατεθέν της BASF

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το Alverde 24 SC προκαλεί παράλυση του νευρικού συστήματος με αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν να τρέφονται λίγες ώρες μετά την εφαρμογή και να ακολουθεί ο θάνατος εντός 1-2 ημερών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Διαλύστε την απαραίτητη ποσότητα του σκευάσματος αμέσως στο νερό του βυτίου με συνεχή ανάδραση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (από εδάφους): Ψεκάσμι καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΑΤΑΤΑ: Δοσολογίες: Δόση: 25 κ.εκ./στρέμμα. Συστήνεται ψεκάσμι στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση νέας προσβολής συστήνεται επανάληψη ψεκάσμι (2 το πολύ) μετά από 7-10 ημέρες. **ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ:** Δοσολογίες: Δόση: 25 κ.εκ./στρέμμα. **ΤΟΜΑΤΑ (Θερμοκηπίου):** Πράσινο σκουλήκι, Πλούσια, Σποντόττερρα, Φυλορική της τομάτας (*Tuta absoluta*). Δόση: 100 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. (Μέγιστη δόση ανά στρέμμα: 100 κ.εκ.). Συστήνεται ψεκάσμι στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες. **ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θερμοκηπίου):** Πράσινο σκουλήκι, Πλούσια, Σποντόττερρα, *Heliothis* sp. Δόση: 75-100 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. (Μέγιστη δόση ανά στρέμμα: 75 κ.εκ.). Συστήνεται ψεκάσμι στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες. **ΤΟΜΑΤΑ (Υπαίθρου):** Πράσινο σκουλήκι, Πλούσια, Σποντόττερρα, *Heliothis* sp. Δόση: 75-100 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. (Μέγιστη δόση ανά στρέμμα: 75 κ.εκ.). Συστήνεται ψεκάσμι στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες. **ΠΙΠΕΡΙΑ (Θερμοκηπίου):** Κάμπια *Chrysodeixis chalcitis*, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόττερρα. Δόση 100 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. (Μέγιστη δόση ανά στρέμμα: 100 κ.εκ.). Συστήνεται ψεκάσμι στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες. **ΠΙΠΕΡΙΑ (Υπαίθρου):** Πράσινο σκουλήκι, Πλούσια, Σποντόττερρα, *Heliothis* sp. Δόση: 75-90 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. (Μέγιστη δόση ανά στρέμμα: 75 κ.εκ.). Συστήνεται ψεκάσμι στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες. **ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου):** Πράσινο σκουλήκι, Πλούσια, Σποντόττερρα, *Heliothis* sp. Δόση: 75-90 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. (Μέγιστη δόση ανά στρέμμα: 75 κ.εκ.). Συστήνεται ψεκάσμι στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες. **ΜΑΡΟΥΛΙ:** Πλούσια, Σποντόττερρα, Πράσινο σκουλήκι, Δόση: 75-90 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. (Μέγιστη δόση ανά στρέμμα: 75 κ.εκ.). Συστήνεται ψεκάσμι στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες. **ΛΑΧΑΝΟ:** Πλούσια, Σποντόττερρα, Πλούτεια, Πράσινο σκουλήκι, Πιερδιά. Δόση: 75-90 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. (Μέγιστη δόση ανά στρέμμα: 75 κ.εκ.). Συστήνεται ψεκάσμι στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες. **ΜΑΡΟΥΛΙ:** Πλούσια, Σποντόττερρα, Πράσινο σκουλήκι, Δόση: 90-125 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. (Μέγιστη δόση ανά στρέμμα: 75 κ.εκ.). Συστήνεται ψεκάσμι στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες. **ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου):** Πράσινο σκουλήκι, Πλούσια, Σποντόττερρα, *Heliothis* sp. Δόση: 75 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Συστήνεται ψεκάσμι στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7 ημέρες. Οι σπόροι του βαμβάκι να μην χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζωοτροφών ή βαμβακελίων. **ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου):** Πράσινο σκουλήκι, Πλούσια, Σποντόττερρα, *Heliothis* sp. Δόση: 75 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Συστήνεται ψεκάσμι στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** Η υψηλότερη δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με το μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού, ώστε να μη ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα. Η χαμηλότερη δόση ανά εκατόλιτρο θα πρέπει να εφαρμόζεται με το μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

- Προληφθείτε ετησίως στα πρώτα στάδια της προσβολής και σε εναλλαγή με εντομοκτόνα διαφωροκίτο τρόπου δράσης.
- Μείνστε αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 για την πατάτα και 2 για όλες τις υπόλοιπες καλλιεργείες.
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Πατάτα: 14 ημέρες. Τομάτα (υπαίθρου, θερμοκηπίου), Πιπεριά (θερμοκηπίου), Μελιτζάνα (υπαίθρου, θερμοκηπίου): 1 ημέρα. Λάχανο (υπαίθρου): 3 ημέρες. Μαρούλι (υπαίθρου): 7 ημέρες. Βαμβάκι: 21 ημέρες.
- ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Για τις νέες ποικιλίες και κυρίως για τις εφαρμογές σε θερμοκήπια, σας συνιστούμε να κάνετε δοκιμαστική ψεκασμούς σε μικρό αριθμό φυτών προτού προβείτε σε εφαρμογή σε ολόκληρη την καλλιέργεια.
- ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΗΡΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΖΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:**
 - Συστήνεται η επανεισόδος στην ψεκασμένη περιοχή αφού στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.
 - Η περιοχή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για δόσσηση ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

