

AMCOBAC^{6,4 WP}

AMCOBAC^{6,4 WP}

AMCOBAC^{6,4 WP}

AMCOBAC^{6,4 WP}

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ (γραμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού) ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΜΕΠΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:
ΓΚΡΕΪΠ ΦΡΟΥΤ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΚΙΤΡΙΑ. Ανθοτρήτης: 25 γρ. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, συνιστάται ένας ψεκασμός στην αρχή της ανθοφορίας και δεύτερος, εάν χρειασθεί, μετά από 7-10 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2, ανά 7-10 ημέρες.
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ - ΦΥΣΤΙΚΙΑ. Φυλλοδέτες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές: 25 γρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενεάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό με τη χρήση φερομονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσμού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2, με την εμφάνιση της νέας γενιάς.
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ. Φυλλοδέτες: 25 γρ. ΜΗΛΙΑ. Φυλλοδέτες: 25 γρ. ΑΧΛΑΔΙΑ. Φυλλοδέτες, Φυλλοφάγες κάμπιες: 25 γρ. ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ. Ανάσας, Φυλλοδέτες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές: 25 γρ. ΚΕΡΑΣΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ. Φυλλοδέτες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές: 25 γρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενεάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό με τη χρήση φερομονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσμού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2, με την εμφάνιση της νέας γενιάς.
ΑΜΠΕΛΙ. Ευδεμίδα, Κογγυλίδα, Προνύμφες φυλλώματος: 30-50 γρ. Ψεκασμοί με βάση τις γεωργικές προειδοποιήσεις της περιοχής, οπότε συνιστάται ένας ψεκασμός μία εβδομάδα μετά την έναρξη πτήσης της κάθε γενιάς του εντόμου. Σε περίπτωση απουσίας γεωργικών προειδοποιήσεων συνιστάται η εφαρμογή ψεκασμών με βάση τα φαινολογικά στάδια της καλλιέργειας και συγκεκριμένα: α) Λίγο πριν την άνθηση, β) Κατά την γονιμοποίηση των ανθών. γ) Όταν οι ράγες έχουν μέγεθος μπιζελιού και δ) Με την αλλαγή χρώματος των ραγών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 ανά 7-10 ημέρες ή με βάση τα φαινολογικά χαρακτηριστικά.
ΕΛΙΑ. Πυρηνοτρήτης (ανθόβια γενιά): 25 γρ. Οι ψεκασμοί να ακολουθούν τις συστάσεις των τοπικών γεωργικών προειδοποιήσεων. Εάν δεν υπάρχουν, να διενεργηθούν οι ακόλουθοι ψεκασμοί: Ψεκασμός όταν το 5-25% των ανθών έχει ανοίξει. Ψεκάσουμε μόλις εμφανιστούν τα πρώτα ανοικτά άνθη. Επανάληψη εφαρμογής μετά 7-10 ημέρες, εάν υπάρχει μεγάλος πληθυσμός εντόμων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με βάση τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή τα φαινολογικά χαρακτηριστικά.
ΤΟΜΑΤΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ. Πράσινο σκουλήκι: 40-50 γρ. ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ. Προνύμφες φυλλώματος, Πράσινο σκουλήκι: 40-50 γρ. ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ-ΛΑΧΑΝΟ. Πιερίδα, Σκόρος των λαχανικών: 40-50 γρ. ΑΓΚΙΝΑΡΑ-ΜΑΡΟΥΛΙ-ΜΠΑΜΙΑ-ΠΡΑΣΑ. Προνύμφες φυλλώματος: 40-50 γρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 ανά 7-10 ημέρες.
ΒΑΜΒΑΚΙ. Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι: 30-50 γρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: Τρεις (3) ανά 7-10 ημέρες (εφόσον υπάρχει προσβολή).
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ. Πυραλίδα, Πράσινο σκουλήκι, Σεξάμια: 40-50 γρ. ΚΑΠΝΟΣ. Πράσινο σκουλήκι: 30-50 γρ. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ. Φυλλοφάγες και ανθοφάγες προνύμφες: 30-50 γρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: Δύο (2) ανά 7-10 ημέρες (εφόσον υπάρχει προσβολή).
ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ. Πεύκο, Βελανιδιά. Φυλλοφάγες προνύμφες (πιτυοκάμπη): 25 γρ. Ψεκασμός φυλλώματος τον Σεπτέμβριο. Λυμάντρια: 25 γρ. Ψεκασμός φυλλώματος τον Μάιο - Ιούνιο. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ. Εφέςια: 50 γρ. Ψεκασμός των εσωτερικών επιφανειών της κενής αποθήκης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.
ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (Λίτρα/στρέμμα): ΓΚΡΕΪΠ ΦΡΟΥΤ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΚΙΤΡΙΑ: 200-400. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΦΥΣΤΙΚΙΑ, ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ: 150-250. ΑΜΠΕΛΙ: 50-150. ΕΛΙΑ: 150-300. ΤΟΜΑΤΑ: 50-150. ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΜΠΑΜΙΑ: 50-100. ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΛΑΧΑΝΟ, ΑΓΚΙΝΑΡΑ: 100. ΜΑΡΟΥΛΙ: 60-80. ΠΡΑΣΑ: 50-80. ΒΑΜΒΑΚΙ: 50-80. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ: 50-100. ΚΑΠΝΟΣ: 50-150. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: 200-300. ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ: 300-500.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Ψεκάστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες και παρατηρηθούν οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε κατά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός. Χρειάζεται καλό λούσιμο όλης της φυλλικής επιφάνειας γιατί οι προνύμφες πρέπει να καταπιούν το σκεύασμα. Μετά την κατάποση οι κάμπιες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.
2. Μην ψεκάσετε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει (σε διάστημα 7-10 ημερών) μετά από ψεκασμό, τότε αυτός πρέπει να επαναληφθεί. Έχει διαπιστωθεί ότι τα έντομα αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνεχώς για την καταπολέμηση τους.
3. Για να αποφευχθεί τέτοιου είδους ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται εναλλαγή δραστικών συστατικών με διαφορετικό τρόπο δράσης.
4. Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

Μην εισπνέετε την σκόνη και το ψεκαστικό υγρό.

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών προσώπου.

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

Μην εισέρχεστε σε ψεκασμένη περιοχή μέχρι να στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία σταματήστε αμέσως την εργασία και καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:

Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά σκευασμάς του.



Hybrid Hellas

AMCOBAC 6,4 WP

B. Thuriensis var. Kurstaki 6,4%
(Βάκιλλος Θουριγκίας ποικ. κουρστάκι 6,4%)

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση: δ-endotoxin. Ενεργός πρωτεΐνη υπό μορφή κρυστάλλων του B.thuriensis var Kurstaki 6,4 % β/β ή 32000 IU/mg. Αδρανείς και βοηθητικές ουσίες: 93,6% β/β
Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: 14177/10- 4- 2007

Εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων

Δρά δια καταπόσεως, μετά την οποία οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

Χι



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΑΝ
ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ
ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Καθαρό Βάρος
500 gr.

Παρασκευαστής – Κάτοχος της έγκρισης – Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: **ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ**
Φιλική Εταιρεία 3, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος: **PROBELTE S.A.**, Murcia, Ισπανία



Hybrid Hellas

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος. Ειδικά για την ευδεμίδα και κογγυλίδα στο αμπέλι, ο ψεκασμός να γίνεται στη ζώνη των τσαμπιών.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε λίγο νερό. Προσθέτουμε το πυκνό διάλυμα στο μισογεμάτο με νερό ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνουμε με νερό υπό συνεχή ανάδευση. Ψεκάζουμε με το ψεκαστικό υγρό μέσα σε λίγες ώρες. Σε περίπτωση ανάμιξης με άλλο σκεύασμα διαλύουμε πρώτα το **AMCOBAC** και μετά προσθέτουμε το άλλο σκεύασμα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό), καταστρέφονται μαζί με τα κουτιά με σκίσιμο, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, και εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο καλά αεριζόμενο ξηρό, και δροσερό (με θερμοκρασίες έως 35°C), προστατευμένο από έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Καθαρό Βάρος: 500 gr.
(2 x 250 gr.)

Αρ. Παρτίδας (Lot No.):
Ημ. Παραγωγής (Production Date):
(βλέπε επί της συσκευασίας)



Hybrid Hellas