

AMCODIM 40 EC 1 L

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ:

● Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ● Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. ● Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. ● Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. ● Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ● Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελητία δεδομένων ασφαλείας. ● Να φοράτε κατάλληλη μάσκα (FFP2) κατά την διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής. ● Να φοράτε κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή. ● Η εφαρμογή σε οπωρώνες θα πρέπει να γίνεται μόνο με τρακτέρ εφοδιασμένο με κλειστή καμπίνα. ● Οι εργάτες δεν πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό να έχει στεγνώσει. ● Να περιμένετε 5 και 21 ημέρες μετά την εφαρμογή προκειμένου να εισέλθετε σε οπωρώνες εσπεριδοειδών για έλεγχο της καλλιέργειας και συντήρηση, αντίστοιχα. ● Να περιμένετε 2 και 14 ημέρες μετά την εφαρμογή προκειμένου να εισέλθετε στον ελαιώνα για έλεγχο της καλλιέργειας και συντήρηση, αντίστοιχα. ● Να περιμένετε 5 ημέρες μετά την εφαρμογή προκειμένου να εισέλθετε στην καλλιέργεια με καλλωπιστικά για έλεγχο της καλλιέργειας και συγκομιδή. ● Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). **Σε περίπτωση εισπνοής:** μεταφέρετε το θύμα σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ξεπλύνετε το στόμα του θύματος αμέσως και δώστε 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός και αν σας πουν να κάνετε κάτι τέτοιο από το κέντρο δηλητηριάσεων ή ο γιατρός. Ποτέ μη προκαλείτε εμετό ή δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που είναι ανείσθητο ή έχει σπασμούς. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια και πλύνετε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν εμφανισθούν συμπτώματα. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας τα βλεφάρια ανοικτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν εμφανισθούν συμπτώματα. **Οδηγίες για το γιατρό:** το Dimethoate είναι αναστολέας της χολινεστεράσης που επηρεάζει το κεντρικό και περιφερειακό νευρικό σύστημα προκαλώντας ανανευρωτική κατάσταση. Μεταχείριση της αναστολής χολινεστεράσης: απαιτείται διαδοχικά αποθιμωτοποίηση όπως πλύση όλου του σώματος, πλύση στομάχου και χορήγηση ενεργού άνθρακα.

Αντίδοτο: αν υπάρχουν συμπτώματα, χορηγήστε atropine sulphate σε μεγάλες δόσεις. 2 έως 4 mg ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά το συντομότερο δυνατόν. Επανάλαβε ανά 5-10 λεπτά έως τα συμπτώματα ατροφισμού να εμφανισθούν και διατηρήστε τον πλήρη ατροφισμό έως ότου όλο το οργανοφωσφορικό μεταβολισθεί. Συμπληρωματικά μπορεί να χορηγηθεί Obidoxime chloride (Toxogonin) ή εναλλακτικά pralidoxime-2-chloride (2-PAM). Όχι όμως σαν αντικαταστάς του atropine sulphate. Η χορήγηση με oxime μπορεί να συνεχισθεί όσο χορηγείται atropine sulphate. Στα πρώτα συμπτώματα πνευμονικού οιδήματος, στον ασθενή πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο και να μεταχειρισθεί συμπτωματικά. Για να αποφευχθεί πιθανή υποτροπή, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται για τουλάχιστον 48 ώρες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της δηλητηρίασης.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

● Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. ● Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αβέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** για όλες τις καλλιέργειες. ● Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μίαν αβέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** για τους οπωρώνες. ● Επικινδύνια για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδύνιας μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε όλα τα είδη ανθοφόρων φυτών (συμπεριλαμβανομένων των καλλιέργειών, ζιζανίων ή ανθοφόρων φυτών σε φυτοφράκτες). Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι πρέπει να ενημερωθούν για τις επικείμενες εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση οι μελισσοκόμοι της περιοχής θα πρέπει να ειδοποιηθούν πριν την εφαρμογή. ● Για την εφαρμογή σε ελαιώνες θα πρέπει να τηρείται αβέκαστη ζώνη τουλάχιστον **5 μέτρων**.

Τρόπος εφαρμογής: **α)** Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος μέχρι απορροής **β)** Δολωματικοί ψεκασμοί μικρού όγκου από εδάφους.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: **α)** για τους ψεκασμούς φυλλώματος: γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **β)** για τους **δολωματικούς ψεκασμούς:** πλέον των ανωτέρω προσθέτουμε και την ελκυστική ουσία στο μισογεμισμένο με νερό δοχείο του ψεκαστικού, αφού προηγουμένως τη διαλύσουμε σε λίγο νερό. Στην περίπτωση αυτή η ανάδευση πρέπει να είναι εντονότερη.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύντε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με καθαρό νερό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με βορδιγιάλαιο ποττό και αλκαλικά σκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν θειάφι.

Προφυλάξεις για τους χειριστές--κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και προστατευτικό προσωπί. --**κατά την εφαρμογή με ψεκαστική βόμβα:** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και ανθεκτικά παπούτσια. --**κατά την εφαρμογή με νεφελοψεκαστήρα:** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια, ανθεκτικά παπούτσια και σε περίπτωση οχημάτων χωρίς καμπίνα, επιπρόσθετα κάλυμμα κεφαλής και προσώπου και ανανεωτική συσκευή με φίλτρο κατακράτησης αωματιδίων. Η επανείσοδος στον ψεκασμένο χώρο να γίνεται αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Αποφύγετε την έκθεση του σώματος και φοράτε φόρμα εργασίας και γάντια --**κατά την εφαρμογή με ψεκαστικό αυλό:** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια, ανθεκτικά παπούτσια, πλάτυγγο καπέλο και ανανεωτική συσκευή με φίλτρο κατακράτησης αωματιδίων.

Αριθμός Παρτίδας (Lot Number) – Ημερομηνία Παραγωγής (Production Date) (Βλέπε επί της συσκευασίας) 

Amcodim®

40 EC

Dimethoate (Ντιμεθοεϊτ) 40 %

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη Σύνθεση: Dimethoate 40 % β/ο (Χημική ομάδα οργανοθειοφωσφορικοί εστέρες)
Βοηθητικές ουσίες 61,1 % β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14412/8-2-2013

Οργανοφωσφορικό διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

● Εύφλεκτο ● Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. ● Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. ● Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. ● Τοξικό για τις μέλισσες ● Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Κάτοχος της έγκρισης:
CHEMINOVA DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG.
Stader Elbstrasse, D-21683 STADE GERMANY
Παρασκευαστής σκευάσματος: CHEMINOVA A/S, Δανία



Hybrid Hellas

Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά:

ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ABEE

Φιλικής Εταιρείας 3, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής.
Τηλ.: 210 2836440, Fax: 210 2836240

 CHEMINOVA

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ AMCODIM 40 EC

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος – Δόσεις σκευάσματος – Τρόπος και χρόνος εφαρμογής – Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργνητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέϊν-φρουτ). **Αφίδες:** 100-120 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 120-144 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ.υγρού: 120 λίτρα/στρέμμα. 1^{ος} ψεκασμός στο τέλος της άνοιξης και ο 2^{ος} στο 40% του τελικού μεγέθους του καρπού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργνητική περίοδο: 2.

ΕΛΙΑ. **Δάκος:** **α)** 625 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 12,5 κ.εκ./στρέμμα (200 ml ψεκαστικού υγρού ανά δένδρο/σε 10 δένδρα/στρέμμα). Όγκος ψεκ.υγρού: 2 λίτρα/στρέμμα. Δολωματικοί ψεκασμοί με υδρολυμένη πρωτεΐνη (0,65 L/100 L ψεκαστικού υγρού). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργνητική περίοδο: 1.

Μπορεί να συνδυαστεί με ένα ψεκασμό καλύψεως με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 10 ημέρες μεταξύ των εφαρμογών. β) 80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού ή 96-120 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ.υγρού: 120 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί καλύψεως που αρχίζουν με την έναρξη της προσβολής και επαναλαμβάνονται όταν διαπιστωθεί ενεργός προσβολή. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργνητική περίοδο: 2 ανά 14 ημέρες.

ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΟ, ΑΣΚΑΛΩΝΑ (εσάβοτ). **Θρίπες:** 167-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού ή 50-60 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ.υγρού: 30 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργνητική περίοδο: 2 ανά 10-14 ημέρες.

ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υγαιθρού). **Αφίδες:** 167-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού ή 50-60 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ.υγρού: 30 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργνητική περίοδο: 2 ανά 14 ημέρες.

ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ. **Αφίδες:** 167-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού ή 50-60 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ.υγρού: 30 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής και πριν την άνθιση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργνητική περίοδο: 2 ανά 10-14 ημέρες.

ΚΑΡΟΤΟ, ΠΑΣΤΙΝΑΚΗ, ΡΙΖΕΣ ΜΑΙΝΤΑΝΟΥ. **Μύγα του καρότου:** 167-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-60 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ.υγρού: 30 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργνητική περίοδο: 3 ανά 7 ημέρες.

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ, ΓΟΥΓΥΛΙΑ. **Αφίδες:** 250-300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού ή 50-60 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ.υγρού: 20 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργνητική περίοδο: 2 ανά 21 ημέρες.

ΣΙΤΗΡΑ (σιτάρι, σικάλη, τριτικάλη, σκληρό σιτάρι). **Αφίδες:** 250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού ή 50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ.υγρού: 20 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργνητική περίοδο: 1.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υγαιθρού και θερμοκνήου). **Αφίδες:** 50-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-60 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ.υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργνητική περίοδο: 2 ανά 14 ημέρες.

Παρατηρήσεις: **1)** Το εύρος των δόσεων στις παραπάνω καλλιέργειες εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών. **2)** Η αύξηση της συγκέντρωσης πρέπει να αποφεύγεται στις τομάτες. **3)** Προκαλεί φυτοτοξικότητα στη Λιανολιά Κερκύρας. **4)** Αυξημένες δόσεις σε ψεκασμούς καλύψεως προκαλούν φυτοτοξικότητα στην κονσερβολιά. **5)** Δολωματικοί ψεκασμοί μικρού όγκου (LV) από το έδαφος. Αρχίζουν συνήθως τέλη Ιουνίου-αρχές Ιουλίου και επαναλαμβάνονται βάσει των ενδείξεων των δακοναγίδων, των καταρριπών ακμαίων και των αποτελεσματών των δειγματοληψιών ελαιοκάρπου. Ποσότητα δολωματος 2 λίτρα/στρέμμα. **6)** Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά την ανθοφορία των καλλιεργειών. **7)** Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν οι πληθυσμοί των αφίδων μπορούν να παράγουν μελίττωμα. **8)** Μην εφαρμόζετε το προϊόν πριν από άρδευση. **9)** Μην εφαρμόζετε το προϊόν, όταν αναμένονται τις επόμενες ημέρες βροχοπτώσεις. **10)** Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά το πέρας της πτήσης των μελισσών, αργά το απόγευμα. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμυνηθούν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ελιά: **28** ημέρες. Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέϊν φρουτ): **1^{ος} ψεκασμός στο τέλος της άνοιξης** και ο **2^{ος} στο 40% του τελικού μεγέθους του καρπού**. Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνα (εσάβοτ): **14** ημέρες. Τομάτα, Μελιτζάνα: **21** ημέρες. Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα: **Πριν την άνθιση**. Καρότο, Παστινάκη, ρίζες Μαϊντανού: **35** ημέρες. Ζαχαρότευτλα, Παντζάρια, Γουγγύλια: **28** ημέρες. Σιτήρα: **Τέλος άνοιξης**. Καλλωπιστικά: **Δεν έχει εφαρμογή**.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους. Είναι δυνατόν να εμφανιστούν φυτοτοξικά συμπτώματα σε ορισμένες ποικιλίες τομάτας. Να αποφεύγεται η αύξηση της συγκέντρωσης στην τομάτα. Προκαλεί φυτοτοξικότητα στην ποικιλία ελιάς "Λιανολιά Κερκύρας". Αυξημένες δόσεις σε ψεκασμούς πλήρους καλύψεως φυλλώματος προκαλούν φυτοτοξικότητα στην ποικιλία ελιάς "Κονσερβολιά". Να μη χρησιμοποιείται στα καλλωπιστικά: *Adiantum*, *Aralia Sieboldii*, *Asparagus plumosus*, *Begonia multiflora*, *Coleus hybridus*, *Calceolaria rugosa*, *Chrysanthemum indicum*, *Cissus antarctica*, *Ficus pandurata*, *Nephrolepis*, *Sanchezia*, *Sinningia speciosa*, *Gloxinia*, *Pteris (tremula, ensiformis, evergemensis)*, *Salvia splendens*. Να μη χρησιμοποιείται στα καλλωπιστικά του γένους *PRUNUS*, στα χρυσάνθεμα και στην αζαλέα. Μπορεί να προκαλέσει ακωρύχρωση σε μερικά καλλωπιστικά. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο πευκο-κουκουναριό. Πριν τη χρήση του στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα. Να μην εφαρμόζεται σε φυτά που υποφέρουν από στρες (έλλειψη νερού, πάγο ή ζημία από ζιζανιοκτόνα). Να μην εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτοκομικής ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλείσει: **1.** Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλες οι καλλιεργνητικές τεχνικές καθώς επίσης οι φυσικές ή βιολογικές μέθοδοι προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός και έτσι να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των επεμβάσεων στον ελάχιστο απαιτούμενο για αποτελεσματικό έλεγχο. **2.** Το σκεύασμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και χρόνο εφαρμογής και με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος. **3.** Να ψεκάζεται μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο με βάση το κατώφλι επικινδυνότητας (εάν υπάρχει) και με τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για τους ωφέλιμους οργανισμούς. **4.** Να γίνεται επισκόπηση της ευαισθησίας των πληθυσμών. Να αποφεύγεται την επακόλουθη χρήση σκευασμάτων που περιέχουν dimethoate και να εφαρμόζεται το σκεύασμα σε εναλλήλ με εντομοκτόνα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης και ομάδες με διασταυρωτή ανθεκτικότητα (οι πυρεθρίνες και τα καρβαμικά σκευάσματα έχουν δείξει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με τα οργανοφωσφορικά) όπως τα οργανοφωσφορικά. Το σκεύασμα δεν πρέπει να αναμειγνύεται με βορδιγιάλιο, Ποττό, αλκαλικά σκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν θειάφι.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μακριά από θερμοκρασίες παγετού και θερμοκρασίες που να μην υπερβούν τους 25 °C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.