



Antracol®

70 WP

Καθ. βάρος 1κιλό 

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγ. σύνθεση: propineb 70% β/β

Βοηθ. ουσίες: 23,08% β/β

Μυκητοκτόνο

ευρέως φάσματος, επαφής, με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

- Επιδιπλαβές όταν εισπνέεται.
- Επιδιπλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

ΛΕΥΚΟ

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
6174/16.03.2009

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Antracol®

70 WP

Το Antracol 70 WP είναι ένα ευρέως φάσματος μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Η δραστική ουσία propineb ανήκει στην ομάδα των διθειοκαρβαμιδικών μυκητοκτόνων και συγκεκριμένα στα μονοαλκυλδιθειοκαρβαμιδικά. Δρα σε περισσότερες από μια θέσεις στο υποκυτταρικό επίπεδο των μυκήτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως μετά την παρασκευή του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας εφελώνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκόμμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνονται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Μηλιά: Φουζοκλάδιο (*Venturia inaequalis*, *Venturia pyrina*). Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος πριν από την άνθηση και ένας μετά την άνθηση.

Δόση: 150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 80-150 λίτρα/στρέμμα. (120-225 γρ. σκευάσματος/στρέμμα)

Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Περονόσπορος (*Plasmopara viticola*). Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος πριν και δύο μετά την άνθηση*. **Δόση:** 200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-100 λίτρα/στρέμμα. (120-200 γρ. σκευάσματος/στρέμμα)

Τομάτα (υπαίθρου): Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*), Αλτερναρίωση (*Alternaria solani*). Κλαδοσπορίωση (*Cladosporium* spp.). Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. **Δόση:** 200-250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-100 λίτρα/στρέμμα. (120-250 γρ. σκευάσματος/στρέμμα)

Τομάτα (θερμοκηπίου): Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*), Αλτερναρίωση (*Alternaria solani*). Κλαδοσπορίωση (*Cladosporium* spp.). Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. **Δόση:** 200-250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-120 λίτρα/στρέμμα. (120-300 γρ. σκευάσματος/στρέμμα)

Αγγούρι (θερμοκηπίου): Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. **Δόση:** 200-250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.

Όγκος ψεκ. υγρού: 100-120** λίτρα/στρέμμα. (200-250 γρ. σκευάσματος/στρέμμα)

Πατάτα: Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*), Αλτερναρίωση (*Alternaria solani*). Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. **Δόση:** 200-250 γρ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα.

Πεπόνι, Καρπούζι: Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. **Δόση:** 200-250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. (200-250 γρ. σκευάσματος/στρέμμα)

Καπνός: Περονόσπορος (*Perozonospora tabacina*). Σπορεία: Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος στα σπορεία. **Δόση:** 200 γρ./στρέμμα.

Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. (200 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού). Μετά τη μεταφύτευση: Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος μετά τη μεταφύτευση.

Δόση: 200 γρ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 80-240 λίτρα/στρέμμα.

Καλλωπιστικά: Περονόσπορος (*Perozonospora* spp.), Σκωρίαση (*Uromyces* spp.). Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. **Δόση:** 200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.

Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. (200 γρ. σκευάσματος/στρέμμα).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο**

Μηλιά: Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-21 ημέρες.

Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.

Τομάτα (υπαίθρου), Τομάτα (θερμοκηπίου), Αγγούρι (θερμοκηπίου): Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερες.

Πατάτα: Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερες.

Πεπόνι, Καρπούζι: Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημερες.

Καπνός (σπορεία): Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερες.

Καπνός (μετά τη μεταφύτευση): + 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερες.

Παρατηρήσεις:

• *Στο αμπέλι το διάστημα μεταξύ του τελευταίου ψεκασμού πριν την άνθηση και του πρώτου μετά την άνθηση να είναι 30 ημέρες. • **Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προϊοδοποιήσεων στις περιοχές που αυτές εφαρμόζονται.

• ***Στο αγγούρι ο μέγιστος όγκος νερού στο στρέμμα να εφαρμόζεται με τη μικρότερη δόση 200 γρ./100 λίτρα νερό, ώστε να μην ξεπρνείται η μέγιστη δόση 250 γρ./στρέμμα.

• Σε περίπτωση εφαρμογής με τρακτέρ σε χαμηλές καλλιέργειες η δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 γρ. σκευάσματος στο στρέμμα. • Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπέλωνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Antracol 70 WP.

• Η εφαρμογή του σκευάσματος Antracol 70 WP δεν θα πρέπει να γίνεται στις προαναμενόμενες καλλιέργειες κάτω από ευνοϊκές συνθήκες (δηλαδή σε αμυγώδη εδάφη και σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση).

• Να μην εφαρμόζεται κατά τις πολύ θερμές ώρες τις μέρες.



Αντρακόλ

70 WP

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Αμπέλι: 60 ημέρες

Τομάτα (υπαίθρου), Πατάτα: 14 ημέρες

Τομάτα (θερμοκηπίου): 28 ημέρες

Αγγούρι (θερμοκηπίου): 3 ημέρες

Πεπόνι (υπαίθρου), Καρπούζι (υπαίθρου): 7 ημέρες

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια ταυλάχονταν όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αερίζομενο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. • Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα, μάσκα και προσωπίδα κατά την ανάμιξη/φόρτωση ή ψεκασμό. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Να αποφεύγετε την κατανάλωση αλκοόλ πριν και μετά την εφαρμογή. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Απομακρύνετε τον πάσχοντα από την περιοχή κινδύνου. Εάν υπάρχει κίνδυνος να χάσει τις αισθήσεις του μετακινήστε τον σε σταθερή πλευρική θέση.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, για αρκετά λεπτά και συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρυνθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ξεπλυνμένο. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε τη συσκευασία (σκαούλα).

Πληροφορίες για το γιατρό: Συμπτωματική θεραπεία: Γλύση στομάχου, και στη συνέχεια χορήγηση άνθρακα και θειικού νατρίου. Ταυτόχρονη έκθεση στο οινόπνευμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το propineb έχει δράση διασολιφράνης.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει αντιδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΠΟΛΥΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και 10 μέτρων για τις υπόλοιπες καλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα.



Bayer CropScience

Διανομέας:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100



52003091893036

N 07 0456 10