

Artist®
41,5 WG

Άρτιστ
41,5 WG

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ζιζανιοκτόνο. Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για προφυτωρική καταπολέμηση επιβιόνων ζιζανίων στην καλλιέργεια της πατάτας. Το flufenacet παρεμποδίζει τη διάρρεση και την αύξηση των μερισματικών κυττάρων με αποτέλεσμα να σταματά η αύξηση του ρίζικου συστήματος των ζιζανίων. Το metribuzin παρεμποδίζει τη φωτοαύθηση στα φυτοσύστηματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το ARTIST εφαρμόζεται με ψεκασμό εδήρους μετά την σπόρα μέχρι και λίγο πριν το φύτρωμα των πατατούντων και όντας ζιζανία είναι στο ευαίσθητο στάδιο της ανάπτυξής τους. Συνιστάται μία εφαρμογή για σάθιση καλλιέργητη περίοδο. Προκεκμένου το πρώιμο να δείξει την άριστη δράση του, είναι απαραίτητη η υπαρξη επαρκούς εδαφικής υγρασίας. Εάν δεν υπάρχει, συστήνεται ελαφρύ πότασμα εντός 5-6 ημερών μετά την εφαρμογή.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Πατάτα
ΣΤΟΧΟΣ: Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Πλαγιαστό βλήτο (*Amaranthus blitoides*), Κολυτράδα (*Galium spurium*, *G. ararne*) Αυμβούδια (*Chenopodium album*), Αγριοσίνατο (*Sisyrinchium arvensis*) Πολύγυρο (*Bidens pilosula*), Αγριομετάντανα (*Xanthium strumarium*), Τσουκνίδα (*Urtica urens*), Στελλάρια (*Stellaria media*), Αντράκλα (*Potentilla olereacea*), Αγριομαργαρίτα (*Chrysanthemum spp.*).

Μέτρα ευαισθητής είναι τα ζιζάνια Αγριοντομάτα (*Solanum nigrum*) και Μουχτίτσα (*Echinocloa crus-galli*).

ΔΟΣΕΙΣ:
 - 200 γρ. σκευασμάτος /στρέμμα σε εδάφη αμμώδη, πηλοαμμώδη, όλαφρά
 - 250 γρ. σκευασμάτος /στρέμμα σε εδάφη αμμοπηλώδη, πηλοαργιλώδη μετριαία και σε εδάφη αργιλώδη, χομάδα, βραχί ογκος ΦΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ: 30-50 ltr./στρέμμα.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Προφυτωρική εφαρμογή μετά τη σπόρα μέχρι και λίγο πριν το φύτρωμα των πατατοφύτων, και όντας ζιζανία είναι στο ευαίσθητο στάδιο της ανάπτυξής τους.

Διανομέας:
 Bayer Ελλάς ABEE
 Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
 Τηλ: 210 6166000
 Fax: 210 6109100

 Bayer CropScience



Άρτιστ
41,5 WG

Artist®
41,5 WG

Artist®
41,5 WG

Καθ. βάρος 1 Κιλό E

Εναιωρηματοποιήσμοι κόκκοι (WG)

Εγγ. σύνθεση: flufenacet 24% β/β
 metribuzin 17,5% β/β
 Βοηθητικές ουσίες: 55,5% β/β

Εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο

για προφυτωρική καταπολέμηση επήισιων ζιζανίων στην καλλιέργεια της πατάτας.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

- Επιβιλαβής σε περιπτωτική κατάποση.

• Επιβιλαβής: Κινδύνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



Κάτοχος της έγκρισης, υπεύθυνος για την τελική ουσιευσία και σήμανση:
 Bayer Ελλάς ABEE.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.
 Y.A.A.T.:
 7691 / 7.2.2007



ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτηριάδες. Μην τρώετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Να φοράτε καπάλια γάντια. Φοράτε ολόσωμη φόρμα και μακριά παπούτσια πεζοπόδια. Ουλόκαπιτο προβλέπεται του να θεωρηθούν κατά τη διάσηση τους ως επικαύνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελεύθερη ώρα του περιβάλλοντος. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες δελτίο δεδομένων συφάλειας. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμεσώς ιατρική συμβούλου και δείξτε στον ταχείστο πινακίδα.

ΠΡΩΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΣ: Μέτρα σε περίπτωση ουσίας που ανθρώπου από σύμβουλο: Μετακινήστε τον ασθενή μακριά από την περιοχή στην οποία εργάζεστε τα λεμφάνεα ρούχο και πλένετε καλά τα προσβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σπόνδι. Σε περίπτωση εισονήσεως μετρητών παρακαμπτήστε τον παθόντα σε καθόρ. αέρα. Συμβουλεύετε γιατρό. Σε περίπτωση εποχής με δέρμα πλήντες αμεσώς καλά τα προσβλημένα μέρη του σώματος με αφθονό νερό και σπόνδι. Σε περίπτωση εποχής με τα μάτια ξεπλύνετε τα μάτια αμεσώς με αφθονό νερό για αρκετά λεπτά. Αν ο ερεθίσμας επιμένει συμβουλεύετε οιαφάλιατρο. Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε οιαφάλιατρο.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρο Αλητηριασμάτων 210 793777.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΟΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.
 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΗΝ ΡΥΠΑΝΤΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΤΤ ΣΥΖΕΥΓΑΣΤΗ.

Παναντροπατεψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μια αμέσως ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ίδιατα για τη πατάτα.
 Για να προστατεύετε την πατάτα σας αφήστε μια αμέσως ζώνη προστασίας 10 μέτρων μέχρι μηγεργάτη για για τη πατάτα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόδοση του φυτοπροστατικού προϊόντος κατηγορίας ουσιευσίας: Η απόδοση /καταστροφή του Αρτιστ, πρέπει να θέτεται εντατικά μεταξύ των συκεύασμάτων. Τα κενά υλικά συκεύασμάτων έρχονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό έργιλμα (τα νερά του έργιλματος τα ρίχνουμε στο φεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφότον προηγουμένως με σχήμα, για τη διασφάλιση της μη περιετέρω χρήσης, επανοπλίζεται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανακτήση ενέργειας.