

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αρχίστε το καθάρισμα του μηχανήματος αμέσως στο χωράφι. Ελέγξτε και καθαρίστε τα ακροφύσια και τα φίλτρα. Πολύ σημαντικό είναι να καθαριστεί το πρώτο φίλτρο μετά το δοχείο του ψεκαστικού, αλλά και τα υπόλοιπα φίλτρα του μηχανήματος. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού στο 10% της χωρητικότητας του με καθαρό νερό και καθαρίστε τα εσωτερικά τοιχώματα και τους σωλήνες πολύ καλά. Ψεκάστε τα απόνερα σε αψέκαστο σημείο του χωραφιού. Επαναλάβετε το τελευταίο βήμα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με σχίσμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Όλες οι καλλιέργειες 90 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι τοξικό στην καλλιέργεια όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε θερμοκρασίες 20 ± 5 °C, διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τροφίμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας. • Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην εισέρχονται οι εργάτες στην ψεκασμένη περιοχή για 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Μην εισέρχεστε σε ψεκασμένες περιοχές πριν στεγνώσουν εντελώς. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:** Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν μολυνθεί από το προϊόν. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός του δέρματος συμβουλευθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και συμβουλευθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό. Συμπτώματα: Τοπικοί ερεθισμοί. **Θεραπεία:** Συμπτωματική και υποστηρικτική. Εάν έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα (μεγαλύτερη μιας μπουκιάς), τα ακόλουθα μέτρα πρέπει να ληφθούν: πλύση στομάχου ακολουθούμενη από ενεργό (φαρμακευτικό) άνθρακα και θεϊκό νάτριο. Παρακολούθηση της λειτουργίας των νεφρών και του ήπατος και μέτρηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Εξουδετέρωση με αιμοκάθαρση (Dialysis: forced alkaline diuresis). **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΙΑ ΑΨΕΚΑΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5m ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ.

N 12 0473 10

GR 06090876 B



ATLANTIS[®] WG

500 γρ. e

Αριθ. Έγκ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
7891/30.10.2008

Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)

α. Mesosulfuron - methyl 3% β/β (ισοδύναμο σε mesosulfuron 2,9% β/β)
β. Iodosulfuron - methyl - sodium 0,6% β/β (ισοδύναμο σε Iodosulfuron 0,56% β/β). Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: Mefenpyr - diethyl 9% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 86,4% β/β

Εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο

για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σκληρό και μαλακό σιτάρι, σίκαλη και τριτσίκαλε.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

• Ερεθίζει το δέρμα.

• Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάτοχος της έγκρισης,
Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σκληρό και μαλακό σιτάρι, σίκαλη και τριτσίκαλε. Είναι διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονουριών. Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξεγαλακτικού. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Μερικές μέρες μετά τον ψεκασμό η ανάπτυξη των καταπολεμούμενων ζιζανίων έχει ήδη σταματήσει και τα πρώτα συμπτώματα αρχίζουν να εμφανίζονται. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Σιτάρι (σκληρό και μαλακό), Σίκαλη, Τριτσίκαλε:

• **Αγρωστώδη:** Αγριοβρώμη (*Avena sp.*), Ήρα (*Lolium sp.*), Φάλαρη (*Phalaris paradoxa*), Πόα κοινή (*Poa annua*), Τραχεία Λιβαδοτόα (*Poa trivialis*), Ανεμόχορτο (*Apera spica-venti*), Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*), Βρόμος (*Bromus sp.*)

• **Πλατύφυλλα:** Χαμομήλι (*Matricaria sp.*), Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), Άγριο Σινάπι (*Sinapis arvensis*), Στελλάρια (*Stellaria media*).

• **Μέτρια ευαίσθητα: Πλατύφυλλα:** Παπαρούνα (*Papaver sp.*), Πανοές (*Viola sp.*), Βερονίκη (*Veronica sp.*)

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός της φυλλικής επιφάνειας με ακροφύσια τύπου σκούπας. Μία (1) εφαρμογή από το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων έως το σχηματισμό του δευτέρου κόμβου.

Δόση: 50 γρ./στρέμμα με προσθήκη 0,2% Biopower.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 λίτρα/στρέμμα.

• Τα ζιζάνια Ανεμόχορτο, Πόα κοινή, Τραχεία Λιβαδοτόα, Αλεπονουρά καταπολεμούνται με τη χαμηλότερη δόση των 30 γρ./στρ.

Παρατήρηση: • Η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα δράσης του σκευάσματος αυξάνεται όταν εφαρμόζεται σε νεαρά ζιζάνια κατά την περίοδο έντονης ανάπτυξης τους. • Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από οποιοδήποτε είδους καταπόνηση, όπως π.χ. ξηρασία, θερμός αέρας κ.λπ. • Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν περιβαλλοντικές συνθήκες μη ευνοϊκές για την ανάπτυξη της καλλιέργειας όπως χαμηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένες βροχοπτώσεις ή εναλλαγές νυχτερινού παγετού με υψηλές θερμοκρασίες ημέρας. • Να αποφεύγεται ο ψεκασμός φυτών που είναι υγρά λόγω βροχής ή ατμοσφαιρικής υγρασίας. • Η αποτελεσματικότητα του Atlantis δεν επηρεάζεται αν ακολουθηθεί βροχή 2-4 ώρες μετά τον ψεκασμό. • Κατά τον ψεκασμό προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε να μη μεταφέρονται σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες πλατύφυλλες καλλιέργειες.

• Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορεί να ξανασπαρεί μετά από 6 εβδομάδες:

-Χωρίς όργανο: μαλακό σιτάρι

-Μετά από όργανο: μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, σόργο, πατάτα, αραβόσπορος.

• Σε κανονικό σύστημα αμειψισποράς, για ένα χρόνο μπορούν να σπαρθούν όλες οι πιθανές καλλιέργειες με την προϋπόθεση να προηγηθεί άρρωση του εδάφους.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά. Στο τέλος προστίθεται η απαιτούμενη ποσότητα biopower.

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100



Bayer CropScience



5200309181010