

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δελτίο ή την ετικέτα του.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρήστε ήρεμο τον ασθενή, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Θεραπεύστε ανάλογα με τα συμπτώματα, δεν υφίσταται ενδοεγγεγμένο αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Για την πρόληψη κινδύνων για υδρόβιους οργανισμούς, το διάστημα παραμονής του νερού στο κτήμα που ψεκάστηκε θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 ημέρες.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση της Μουχρίτσας στο ρύζι. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και δευτερευόντως από τη ρίζα, μεταφερόμενο σε όλα τα υπό ανάπτυξη φυτικά μέρη, προκαλώντας την καταστροφή των μεριστωματικών ιστών του βλαστού και των ριζών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως των ζιζανίων σε συνδυασμό με DASH HC ή ACTIPRON.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Εφαρμόζεται κατά της Μουχρίτσας και των βιότυπων της με ψεκαστικό όγκο 20 – 40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα. Οι παρακάτω δόσεις αναφέρονται σε κ.εκ. ανά στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανα καλλιεργητική περίοδο: 1

1. Για ρύζι ποικιλών ινδικού τύπου (Thaibonnet), συστήνεται μία εφαρμογή από το τέταρτο φύλλο της καλλιεργείας ως την αρχή του αδελφώματος με 50 – 75 κ.εκ. σκευάσματος + 100 κ.εκ. DASH HC ή μία εφαρμογή από την αρχή ως το μέσον του αδελφώματος με 75-100 κ.εκ. σκευάσματος + 100 κ.εκ. DASH HC.
2. Για ρύζι ποικιλών ιαπωνικού τύπου (Japonica), συστήνεται μία εφαρμογή από το τέταρτο φύλλο της καλλιεργείας ως την αρχή του αδελφώματος, με 50 – 75 κ.εκ. σκευάσματος + 200 κ.εκ. ACTIPRON EC, ή μία εφαρμογή από την αρχή ως το μέσον του αδελφώματος είτε με 75 – 100 κ.εκ. σκευάσματος + 200 κ.εκ. ACTIPRON EC είτε με 50 κ.εκ. σκευάσματος + 100 κ.εκ. DASH HC.



Aura® 20 EC

Profoxydim (προφόξιντιμ)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Profoxydim 20% β/ο,
Βοηθητικές ουσίες 78.2% β/β

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση της Μουχρίτσας στο ρύζι.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Ερεθίζει τα μάτια.
- Ερεθίζει το δέρμα.
- Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
- Ύποπτο καρκινογένεσης.
- Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: **1** λίτρο

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 7827/07-06-2007

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BASF SE, Γερμανία

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449,
15343 Αγία Παρασκευή, τηλ: 210 6860130,
www.basf-agro.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF SE, Γερμανία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Χρησιμοποιήστε τον ελάχιστο, δυνατό όγκο ψεκαστικού διαλύματος, ανάλογα με το στάδιο της καλλιεργείας, ώστε να επιτυγχάνεται κάλυψη των ζιζανίων χωρίς αυξημένη απορρόφηση.
- Χρησιμοποιείται πάντοτε με την προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας, είτε DASH HC με δόση 100 κ.εκ./στρέμμα είτε ACTIPRON EC με δόση 200 κ.εκ./στρέμμα.
- Διαχείριση νερού: 2 – 3 ημέρες πριν από την εφαρμογή αδειάζονται τα τηγάνια έτσι ώστε τουλάχιστον τα 2/3 της επιφάνειας των ζιζανίων να βρίσκεται εκτεθειμένη στο ψεκαστικό διάλυμα. Τα τηγάνια συμπληρώνονται κανονικά με νερό 2 – 4 ημέρες μετά την εφαρμογή.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:-

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και μετά το DASH HC ή το ACTIPRON υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε το βυτίο με το υπόλοιπο νερό και συνεχίστε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Είναι δυνατόν να εμφανιστούν συμπτώματα φυτοτοξικότητας μετά την εφαρμογή του AURA (χλώρωση νεύρωσης ελάσματος κατωτέρων φύλλων). Τα συμπτώματα είναι δυνατόν να παραμεινουν 2 – 4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή και σχετίζονται με τη δόση εφαρμογής και την ποικιλία (οι ποικιλίες Ιαπωνικού τύπου – βραχυκόκκες - είναι πιο ευαίσθητες). Τα συμπτώματα αυτά δεν έχουν καμία επίδραση στη διάρκεια ανάπτυξης και την απόδοση, ποιότητα της καλλιεργείας. Το φυτό του ρυζιού απορρίπτει φυσιολογικά τα κατώτερα φύλλα μετά το αδελφώση. Στις Ιαπωνικού τύπου ποικιλίες ακολουθήστε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης και δόσης των συνιστώμενων επιφανειοδραστικών για καλύτερη αντοχή της καλλιεργείας στο σκευάσμα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Να μην συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα, εκτός από τις συνιστώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

- **ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:** Σε περίπτωση αποτυχίας της εφαρμογής, σπορά ή φύτευση της επόμενης καλλιεργείας συστήνεται 7 ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.
- **ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Αν παραστεί ανάγκη, η επανείσοδος συστήνεται μόλις στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό και με την προϋπόθεση ότι ο εργάτης φέρει την κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορριπτικτικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι συσκευασίες ξεπλένονται με τριπλό ξέλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριπτάκι, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αποθηκευμένο στην αρχική του απαρabaσστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

