

BactoSpeine® WG

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

Καθ. Βάρος: 500γρ

Αριθμ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:
14116/08-02-2006

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Bacillus Thuringiensis subsp. Kurstaki
strain ABTS -357 (Βάκιλος της θουριγγίας
υποείδους Κουρστάκι) 6,4 %

εγγ. ζύνθεση: *Bacillus Thuringiensis subsp. Kurstaki* strain

ABTS-351 6,4 % β/β (32000 IU/mg), βοηθ.ουσίες μέχρι 100% β/β Περιέχει *Bacillus thuringiensis subsp kurstaki*. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών των λεπιδοπτέρων. Δρα δια κατάποσης μετά την οποία οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές μέρες .

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ(γρμ./ 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού)-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εσπεριδοειδή (Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Κιτριά): Ανθορτήρες με δόση 25 γρ/100 λίτρα και 200-400 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, συνιστάται ένας ψεκασμός στην αρχή της ανθοφορίας και δεύτερος, εάν χρειασθεί, μετά από 7-10 ημέρες. **Αμυγδαλιά, Φυστική:** Φυλλοδέστες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές. **Φουντουκιά, Μηλιά:** Φυλλοδέστες. **Αχλαδιά:** Φυλλοδέστες, Φυλλοφάγες κάμπιες. **Βερικοκιά, Ροδακινιά:** Ανάσσια, Φυλλοδέστες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές. **Κερασιά, Δαμασκηλιά:** Φυλλοδέστες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές. Για αμυγδαλιά, φυστική, φουντουκιά, μηλιά, αχλαδιά, βερικοκιά, ροδακινιά, κερασιά, δαμασκηλιά ψεκασμός με δόση 25 γρ/100 λίτρα με 150-250 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενεάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό με τη χρήση φερονιμονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσμού. **Αμπέλι:** Ευδεμίδα, Κογχυλίδα. Προνύμφες φυλλώματος με δόση 30-50 γρ/100 λίτρα και 50-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί με βάση τις γεωργικές προειδοποιήσεις της περιοχής οπότε συνιστάται ένας ψεκασμός μία εβδομάδα μετά την έναρξη πτήσης της κάθε γενεάς του εντόμου. 4 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες ή με βάση τα φαινολογικά χαρακτηριστικά (όπως αναφέρονται κατωτέρω). Σε περίπτωση αποτυχίας γεωργικών προειδοποιήσεων συνιστάται η εφαρμογή ψεκασμών με βάση τα φαινολογικά στάδια της καλλιέργειας και συγκεκριμένα: α) λίγο πριν την άνθηση, β) Κατά την γονιμοποίηση των ανθέων. γ) Όταν οι ράγες έχουν μέγεθος μπιζελιού και δ) Με την αλλαγή χρώματος των ραγών. **Ελιά:** Πυρηνοτήρες (ανθόβια γενιά) με δόση 25 γρ/100 λίτρα και 150-300 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Έως 3 εφαρμογές με βάση τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εάν δεν υπάρχουν συνιστάται η εφαρμογή ψεκασμών με βάση τα φαινολογικά στάδια της καλλιέργειας και συγκεκριμένα: ψεκασμός όταν το 5-25% των ανθέων έχει ανοίξει. Ψεκάσουμε μόλις εμφανιστούν τα πρώτα ανοικτά άνθη. Επανάληψη μετά 7-10 ημέρες εάν υπάρχει μεγάλος πληθυσμός εντόμων. **Τομάτα** (θερμοκηπίου και υπαίθρου): α) Πράσινο σκουλήκι με δόση 40-50 γρ/100 λίτρα και 50-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί αρχίζοντας με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και επανάληψη μετά 7-10 ημέρες. β) Φυλλορύκτης της τομάτας (Tuta absoluta) με δόση 100-200 γρ/100 λίτρα και 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εναρξη εφαρμογών κατά την εκκόλληση των πρώτων προνυμφών (L1). Επανάληψη ανά 7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος: 8 εφαρμογές, με 3 εφαρμογές ανά γενεά μίστου. Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται σε υψηλή πίεση πληθυσμού και όταν υπάρχουν προνύμφες μεγαλύτερων σταδίων. **Πιπεριά:** Πράσινο σκουλήκι με δόση 40-50 γρ/100 λίτρα και 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί αρχίζοντας με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και επανάληψη μετά 7-10 μέρες. **Μελιτζάνα:** Προνύμφες φυλλώματος, Πράσινο σκουλήκι με δόση 40-50 γρ/100 λίτρα και 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί αρχίζοντας με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και επανάληψη μετά 7-10 μέρες. **Κουνουπιδιά, Λάχανο:** Περίδα, Σκόρος των λαχανικών με δόση 40-50 γρ/100 λίτρα και 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί αρχίζοντας με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και επανάληψη ανά 7-10 μέρες. **Αγκινάρα, Μαρούλι, Μπρόκολο:** Προνύμφες φυλλώματος με δόση 40-50 γρ/100 λίτρα, όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα) 100 (αγκινάρα), 60-80 (μαρούλι) 50-100 (μπρόκολο), 50-80 (πράσο). 2 ψεκασμοί αρχίζοντας με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και επανάληψη μετά 7-10 μέρες. **Βαμβάκι:** Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι με δόση 30-50 γρ/100 λίτρα και 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και επανάληψη ανά 7-10 μέρες (εφόσον υπάρχει προσβολή). **Καλαμποκί:** Πυραλίδα, Πράσινο σκουλήκι, Σεζάμια με δόση 40-50 γρ/100 λίτρα και 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και επανάληψη ανά 7-10 μέρες (εφόσον υπάρχει προσβολή). **Καλλιτοπικά:** Φυλλοφάγες, Ανθοφάγες προνύμφες με δόση 30-50 γρ/100 λίτρα με 200-300 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί αρχίζοντας με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών και επανάληψη μετά 7-10 μέρες (εφόσον υπάρχει προσβολή). **Πεύκο, Βελανιδιά:** Φυλλοφάγες προνύμφες: Πιτυοκάμπη, ψεκασμός φυλλώματος Σεπτέμβριο, Λυμάντρια, ψεκασμός Απρίλιο/Μαίο. Υφάντρια, Μαλακόσωμα, ψεκασμός φυλλώματος Μαίο/Ιούνιο. Έως 3 εφαρμογές με δόση 25 γρ/100 λίτρα και 300-500 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. **Αποθηκευμένα προϊόντα:** Εφέςοτα. Ψεκασμός των εσωτερικών επιφανειών της αποθήκης με 50 γρ/100 λίτρο. **Παρατηρήσεις:** α. Ψεκάστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες και παρατηρηθούν οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε κατά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός. Χρειάζεται καλό λούσιμο όλης της φυλλικής επιφάνειας επειδή οι προνύμφες πρέπει να καταπιούν το σκεύασμα. Μετά την κατάποση οι κάμπιες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες. β. Μην ψεκάσετε εάν ανανεώνεται βροχή. Εάν βρέξει (σε διάστημα 7-10 ημερών) μετά από ψεκάσμα, τότε αυτός πρέπει να επαναληφθεί. γ. Έχει διαπιστωθεί ότι τα έντομα αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνεχώς για την καταπολέμησή τους. Για να αποφευχθεί ανάπτυξη τέτοιου είδους ανθεκτικότητας συνιστάται εναλλαγή δραστικών συστατικών με διαφορετικό τρόπο δράσης. **Τρόποι εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού υγρού με το μισό απαιτούμενο νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση. Καθαρισμός Ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το βυτίο εφαρμογής και ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους. **Ειδικές Συνθήκες γεωργικές, φυτογεινικές ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Το BACTOSPEINE WG δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν όξινη ή αλκαλική αντίδραση όπως οξυγλυκρινικούς χαλκούς ή διαφυλλικά λιπάσματα. **Φυτοτοξικότητα:** Το σκεύασμα BACTOSPEINE WG όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστάμενες δόσεις, χρήσεις και οδηγίες εφαρμογής, δεν παρουσιάζει προβλήματα φυτοτοξικότητας. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μην εισέρχεστε σε ψεκασμένη περιοχή μέχρι να στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. **Περιορισμοί για την προστασία του καταναλωτή- Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** 0 ημέρες (σε όλες τις καλλιέργειες, εκτός της τομάτας για την καταπολέμηση του Tuta absoluta), 2 ημέρες (τομάτα για την καταπολέμηση του Tuta absoluta). **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα πλαστικά σακιά ή σακούλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και μαζί με τους χάρτινους φακέλους και τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:** Αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο σκοτεινό, ξηρό και σε θερμοκρασία μέχρι + 32 °C. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

Κατάλογος της έγκρισης: SUMITOMO CHEMICAL AGRO
EUROPE SAS, 2 Rue Claude Chappe, 69771 Saint-
Didier-au-Mont-d'Or, Γαλλία

® Έγκριση εμπορικό σήμα
Valent Biosciences Corporation, USA

Υπεύθυνος επικοινωνίας -
Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
κ.ε.λαφαριμ
Αθήνα: Θέσση 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΒΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σύνδεσ. τηλ. 2510.797.907
e-mail: info@helladamm.gr

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: -Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. -Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. -Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια - Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά το ψεκάσμα. * **Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.** - **Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτα:** Σε περίπτωση κατάποσης, σταματήστε την εργασία και καλέστε γιατρό. Προκαλέστε εμετό ενεργοίοντα στο βάθος του φάρυγγα με μη αιχμηρό αντικείμενο. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777

Αρ. Παράβατος - Ημ. Παρασκευής - Ημ.Λήξης. Βάλετε επί της συσκευασίας

01/13