



NitroFarm SA

BAIA CU 4,2 /39,75 WP

cymoxanil 4.2 % β/β / copper oxychloride, σε Cu 39.75 % β/β

Βρέξιμη σκόνη (WP)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ

Μείγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός τοπικά διασυστηματικού (cymoxanil) και ενός επαφής (οξυχλωριούχου χαλκού) με προληπτική και θεραπευτική δράση κατά του περονόσπορου, σε καλλιέργειες αμπελιού, τομάτας και πατάτας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

-Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη περονόσπορου ή σύμφωνα με τις γεωργικές Προειδοποιήσεις.

-Το BAIA Cu 4,2-39,75 WP δεν πρέπει να εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός ή όταν τα φυτά είναι σοκαρισμένα. Αν βρέξει σε λιγότερο από δύο ώρες από την εφαρμογή, η αποτελεσματικότητα του Σκευάσματος μπορεί να μειωθεί και συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής.

-Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε στρες λόγω έλλειψης ή περίσσειας νερού, Χαμηλών θερμοκρασιών, εντομολογικών προσβολών, τροφοπενιών ή άλλων παραγόντων οι οποίοι μειώνουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπέλι, Τομάτα υπαίθρου, Πατάτα: 21 ημέρες,
Τομάτα θερμοκηπίου: 7 ημέρες

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Περιέχει δραστικές ουσίες που ανήκουν σε διαφορετική χημική Ομάδα.

-Είναι χαμηλής τοξικότητας (3 κατηγορία τοξικότητας), οπότε δεν απαγορεύεται η χρήση του σε κατοικημένες Περιοχές

- Ευρύ φάσμα δράσης (χρήση και σε δενδρώδεις και σε εκτατικές καλλιέργειες (βλ. Ετικέτα).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 500gr
- 1250gr
- 2500gr

****Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.**

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΦΡΑΓΚΩΝ 13, 546 26

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 2310-553354-7, Φαξ. 2310-545235