

L156553 GREC/1P



48 SL

The Syngenta logo, which consists of a stylized green leaf shape with the word "syngenta" in lowercase letters inside it.

Dicamba (ντικάμπα)
(χημική ομάδα βενζοϊκά παράγωγα)

Πυκνό διάλυμα (SL)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Dicamba 48% β/ο
σε μορφή άλατος διμεθυλαμίνης
Βοηθητικές ουσίες 52,55% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Γεωργ.: 7512/10-11-97
Ημ. λήξης Έγκρ.: 31-12-2013

**Ζιζανιοκτόνο για την
καταπολέμηση πλάτυφυλλων
ζιζανίων στην καλλιέργεια
του αραβοσίτου.**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

**Προορίζεται μόνο για
επαγγελματίες χρήστες**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Crop Protection AG,
Basel, Switzerland

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: Βί.ΠΕ. Θ. Σινδός, Τηλ.: 231 0796940-3

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

ISTROCHEM a.s., Σλοβακία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.

Οινόφυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 2262 051600

Product names marked ® or ™, the ALLRICE FORME
the SYNGENTA Logo and the PAPERBEE LOGO
are Trademarks of a Syngenta Group Company

500 ml



L156553 GREC/1P**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

- Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

- Σε περίπτωση εισπνοής, μετακινήστε τον ασθενή σε καθαρό περιβάλλον και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα, εάν ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του.


ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

*Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ:

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκα - στικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εδάφη με υδροφόρο ορίζοντα μικρότερο των 10 μέτρων.
- Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- Σε περίπτωση ρύπανσης των νερών άρδευσης να μην χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση.
- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm.
- Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.
- Μετά τον ψεκασμό πλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με πολύ νερό.



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Αραβόσιτος για την καταπολέμηση ετήσιων πηλατύφυλλων ζιζανίων και τον περιορισμό της ανάπτυξης των πολυετών πηλατύφυλλων ζιζανίων. Δόση: 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού 30-60 λίτ/στρ. Καθοδικός ψεκασμός του εδάφους μεταφυτρωτικά και πριν τα φυτά του αραβοσίτου ξεπεράσουν το στάδιο των 6 φύλλων.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1.

Ευαίσθητα ζιζάνια: Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Τάτουλας (*Datura stramonium*), Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*).

Περιορισμός της ανάπτυξης των πολυετών πηλατύφυλλων: Περικοκλιάδα (*Convolvulus arvensis*), Κίρσιο (*Cirsium arvense*), Λάπαθο (*Rumex spp*).


Τα αποτελέσματα στα πολυετή ζιζάνια είναι καλύτερα όταν αυτά έχουν αναπτύξει αρκετό φύλλωμα κατά την εφαρμογή. Κηλίδες των ζιζανίων αυτών, μπορούν να καταπολεμηθούν με κατευθυνόμενο ψεκασμό (χωρίς να βρέχονται τα φυτά του αραβοσίτου) αφού τα φυτά του αραβοσίτου αποκτήσουν ύψος 40 εκ. και πριν βγάλουν «φούντα» και εφόσον δεν υπάρχουν σε μικρή απόσταση ευαίσθητες πηλατύφυλλες καλλιέργειες.

Τρόπος δράσης:

Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό.

Τρόπος εφαρμογής:

Μεταφυτρωτικά με ψεκαστήρα υψηλού όγκου, μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη από 3 Atm και ποσότητα ψεκάστικού υγρού 30-60 λίτρα το στρέμμα.



Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και απογεμίζουμε το δοχείο. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται 3 φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Οι καλλιέργειες των δικοτυλήδων φυτών είναι ευαίσθητες, γι' αυτό πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του ψεκαστικού υγρού με βαμβάκι, σόγια, μηδική κλη καθώς και με αμπέλια, οπωροφόρα και καλλωπιστικά.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με λάδι και υγρά λιπάσματα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αραβόσιτος: 40 ημέρες εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ζωτοτροφή (χλωρά νομή και ενσίρωση).

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον εάν διατηρηθεί σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης 40°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Η απόσυρση / καταστροφή του BANVEL 48 SL πρέπει να γίνεται σε υψικάμινο που έχει κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

