

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καννίζετε. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Φοράτε κατάλληλα γάντια. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλες μπότες, εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Αποδοθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Αληθιπρίσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Ο ψεκάσμος πρέπει να αποφεύγεται: • Όταν η καλλιέργεια πρόκειται να αρδεύει ή υπάρχει πιθανότητα βροχής μέχρι και 6 ώρες μετά τον ψεκασμό. • Σε καλλιέργειες ερσοθενημένες από χαλάζι, έντομα ή επηρεασμένες από προφυτωτικό ζιζανιοκτόνο. • Όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 25°C, όταν υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια, όταν παρατηρούνται νυχτερινό παγετό σε καλλιέργειες που δεν έχουν σκληρυνθεί και όταν έχουμε περιόδους χαμηλών θερμοκρασιών, που ακολουθούνται από ξαφνική αύξηση θερμοκρασίας. Κατά τη διάρκεια θερμών ημερών, ο ψεκάσμος πρέπει να γίνεται αργά το απόγευμα. • Όταν φυσάει αέρας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Το σκεύασμα αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Beetup[®] Compact SC

Phenmedipham (Φενμεντιφάμ) 8%
Desmedipham (Ντεσμεντιφάμ) 8%
Πυκνό εναιώρημα

Εγγυημένη σύνθεση: **Phenmedipham 8% β/ο**
Desmedipham 8% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 83,7% β/β

A.A.D.A.: 70006/11.12.2012

**Μεταφυτωτικό ζιζανιοκτόνο κατά ετήσιων
ηλιατόφυλλων ζιζανίων στα τεύτλα**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ
ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Κάτοχος της έγκρισης:

United Phosphorus Ltd.,
Ηνωμένο Βασίλειο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην
αγορά-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559

Θεσσα/νίκ: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάννα

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΜΠΙΤΑΙ ΚΟΜΠΑΚΤ:

Μεταφυτωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων ηλιατόφυλλων ζιζανίων στα τεύτλα. Δρα με απορρόφηση από το φύλλωμα των ζιζανίων, όταν βρίσκονται στο στάδιο των κοτυληδόνων, μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων. Σε βιοχημικό επίπεδο, παρεμποδίζεται η λειτουργία του φωτοσυστήματος II της φωτοσύνθεσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοιόμορφος ψεκάσμος σε όλη την επιφάνεια του εδάφους με 20-30 λίτρα νερό/στρ. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm (45 psi). Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου ακούλας. Να αποφεύγεται η υπερβολική διαβροχή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε τη συνιστάμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται απόλυτα καθαρός ψεκαστήρας, το δε ψεκαστικό υγρό να χρησιμοποιείται εντός τεσσάρων (4) ωρών από την παρασκευή του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Μετά τον ψεκασμό, ξεπλύνετε δύο φορές τα ψεκαστικά μέσα με νερό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΤΕΥΤΛΑ: Ετήσια ηλιατόφυλλα ζιζάνια*. Δόση: α) 600 κ.εκ. σκ./στρ. για εφαρμογή μεταφυτωτικά, από το στάδιο των δύο (2) φύλλων των τευτλών και μέχρι το στάδιο των τεσσάρων (4) φύλλων των ζιζανίων, ή β) 200 κ.εκ. σκ./στρ. για 3 εφαρμογές. Η 1η εφαρμογή μπορεί να γίνει όταν τα μικρότερα Ζαχαρότευτλα/κτηνοτροφικά τεύτλα βρίσκονται στο στάδιο των κοτυληδόνων, η 2η και 3η εφαρμογή μπορούν να γίνουν όταν τα νέα ζιζάνια φτάσουν στο στάδιο των κοτυληδόνων (γενικά 5-14 ημέρες μετά την προηγούμενη εφαρμογή).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-30 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:

Μία (1) εφαρμογή, για την δόση των 600 κ.εκ. σκ./στρ.

Τρεις (3) εφαρμογές για την δόση των 200 κ.εκ. σκ./στρ.

Παρατηρήσεις: • **Ευαίσθητα ζιζάνια:** α) Μέχρι το στάδιο των κοτυληδόνων: Χαμομήλι, β) Μέχρι το στάδιο των 2 φύλλων: Αtripλήσι ή Στριγγόχορτο, Καφέληλα, Τάτουλας, Παπαρούνα κοινή, Αναρριχώμενο Πολύγαμο, Αγριονοτιά ή Στύρακος, Καπνόχορτο, γ) Μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων: Βήριτα, Λουβουδί, Αγριο σινδι, Στεφάνηρα, Βερόνικα. • **Μεταξύ ευαίσθητα ζιζάνια:** Πολυκάμυ (μέχρι το στάδιο των κοτυληδόνων). • **Ανεθεκτικά ζιζάνια:** Πατάτα, Σωχός, Αγριομαργαρίτα και όλα τα αγρωστώδη ζιζάνια.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Τεύτλα: 90 ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορούν να σπαρουν εκ νέου Ζαχαρότευτλα οποτεδήποτε μετά την εφαρμογή του Beetup Compact® SC. Άλλες καλλιέργειες μπορούν να σπαρουν 3 μήνες μετά την εφαρμογή του, αφού προηγηθεί βαθιά άροση (15-20 εκ.).

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του. Σε περίπτωση εφαρμογής, όταν επικρατεί υψηλή θερμοκρασία, πιθανόν να προκαλέσει περιφερειακό κάψιμο ή χλωρίωση των φυτών, που όμως θα εξαφανισθούν σε 10 περίπου ημέρες. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε ερσοθενημένες καλλιέργειες και όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Συνδυάζεται με το σκεύασμα Ethofumesate Αλφα 500SC και Goltix® 700SC (metamitron).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξεπλύματα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μέρος του

