

32000 WP
Belthirul

Belthirul 32000 WP

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ (γραμ. Belthirul/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού)-
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ :

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπ φρουτ, λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά, κитριά). **Ανθοτρήτης** : 25 γρ. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, συνιστάται ένας ψεκασμός στην αρχή της ανθοφορίας και δεύτερος, εάν χρειασθεί, μετά από 7-10 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών : 2, ανά 7-10 ημέρες.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ – ΦΥΣΤΙΚΙΑ. Φυλλοδέστες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές : 25 γρ. **ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ**. Φυλλοδέστες : 25 γρ. **ΜΗΛΙΑ**. Φυλλοδέστες : 25 γρ. **ΑΧΛΑΔΙΑ**. Φυλλοδέστες, Φυλλοφάγες κάμπιες : 25 γρ. **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ**. Ανάρσια, Φυλλοδέστες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές : 25 γρ. **ΚΕΡΑΣΙΑ – ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ**. Φυλλοδέστες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές : 25 γρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενεάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό με τη χρήση φερομονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσμού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών : 2, ανά όποτε εμφανίζεται η νέα γενιά.

ΑΜΠΕΛΙ. **Ευδεμίδα, Κογχυλίδα, Προνύμφες φυλλώματος** : 30-50 γρ. Ψεκασμοί με βάση τις γεωργικές προειδοποιήσεις της περιοχής οπότε συνιστάται ένας ψεκασμός μία εβδομάδα μετά την έναρξη πτήσης της κάθε γενεάς του εντόμου. Σε περίπτωση απουσίας γεωργικών προειδοποιήσεων συνιστάται η εφαρμογή ψεκασμών με βάση τα φαινολογικά στάδια της καλλιέργειας και συγκεκριμένα: α) Λίγο πριν την άνθηση. β) Κατά την γονιμοποίηση των ανθέων. γ) Όταν οι ράγες έχουν μέγεθος μπιζελιού και δ) Με την αλλαγή χρώματος των ραγών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4, ανά 7-10 ημέρες ή με βάση τα φαινολογικά χαρακτηριστικά.

ΕΛΙΑ. **Πυρηνотρήτης (ανθόβια γενιά)** : 25 γρ. Οι ψεκασμοί να ακολουθούν τις συστάσεις των τοπικών γεωργικών προειδοποιήσεων. Εάν δεν υπάρχουν, να διενεργηθούν οι ακόλουθοι ψεκασμοί: Ψεκασμός όταν το 5-25% των ανθέων έχει ανοίξει. Ψεκάζουμε μόλις εμφανιστούν τα πρώτα ανοικτά άνθη. Επανάληψη μετά 7-10 ημέρες, εάν υπάρχει μεγάλος πληθυσμός εντόμων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3, με βάση τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή τα φαινολογικά χαρακτηριστικά.

ΤΟΜΑΤΑ – ΠΙΠΕΡΙΑ. **Πράσινο σκουλήκι** : 40-50 γρ. **ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ**. **Προνύμφες φυλλώματος, Πράσινο σκουλήκι**: 40-50 γρ. **ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ – ΛΑΧΑΝΟ**. **Πιερίδα, Σκόρος των λαχανικών**: 40-50 γρ. **ΑΓΚΙΝΑΡΑ – ΜΑΡΟΥΛΙ – ΜΠΑΜΙΑ – ΠΡΑΣΑ**. **Προνύμφες φυλλώματος**: 40-50 γρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών : 2, ανά 7-10 ημέρες.

ΒΑΜΒΑΚΙ. **Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι** : 30-50 γρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών : 3, ανά 7-10 ημέρες (εφόσον υπάρχει προσβολή).

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ. **Πυραλίδα, Πράσινο σκουλήκι, Σεζάμια** : 40-50 γρ. **ΚΑΠΝΟΣ**. **Πράσινο σκουλήκι**: 30-50 γρ. **ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ**. Φυλλοφάγες και ανθοφάγες προνύμφες: 30-50 γρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών : 2 στο καλαμπόκι, 2 στα καλλωπιστικά και 3 στον καπνό, ανά 7-10 ημέρες (εφόσον υπάρχει προσβολή).

ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ (Πεύκο, βελανιδιά). Φυλλοφάγες προνύμφες (πιτυοκάμπη): 25 γρ. Ψεκασμός φυλλώματος τον Σεπτέμβριο. **Λυμάντρια** : 25 γρ. Ψεκασμός φυλλώματος τον Απρίλιο-Μάιο. **Υφάντρια, Μαλακόσσωμα**: 25 γρ. Ψεκασμός φυλλώματος τον Μάιο - Ιούνιο. Μέγ. αρ. εφαρμογών: 3.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ. **Εφέστια** : 50 γρ. Ψεκασμός των εσωτερικών επιφανειών της κενής αποθήκης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών : 1.

ΌΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (λίτρα/στρέμμα): Εσπεριδοειδή 200 - 400. Αμυγδαλιά, φυστική, φουντουκιά, μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά, βερικοκιά, κερασιά, δαμασκηνιά: 150 - 250. Αμπέλι 50 - 150. Ελιά 150 - 300. Τομάτα 50 - 150. Πιπεριά, μελιτζάνα, μπάμια: 50 - 100. Κουνουπίδι, λάχανο, αγκινάρα: 100. Μαρούλι 60-80. Πράσα 50 - 80. Βαμβάκι 50 - 80. Καλαμπόκι 50-100. Καπνός 50 - 150. Καλλωπιστικά 200 - 300. Δασικά δένδρα 300 - 500.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψως φυλλώματος. Ειδικά για την ευδεμίδα και κογχυλίδα στο αμπέλι, ο ψεκασμός να γίνεται στη ζώνη των τσαμπιών.

Belthirul 32000 WP

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Ψεκάστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες και παρατηρηθούν οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε κατά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός. Χρειάζεται καλό λούσιμο όλης της φυλλικής επιφάνειας γιατί οι προνύμφες πρέπει να καταπιούν το σκεύασμα. Μετά την κατάπιση οι κάμπιες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες. **2)** Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει (σε διάστημα 7-10 ημερών) μετά από ψεκασμό, τότε αυτός πρέπει να επαναληφθεί. **3)** Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής. **4)** Έχει διαπιστωθεί ότι τα έντομα αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνεχώς για την καταπολέμησή τους. Για να αποφευχθεί τέτοιου είδους ανάπτυξη ανθεκτικότητας, συνιστάται εναλλαγή δραστικών συστατικών με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε λίγο νερό. Προσθέτουμε το πυκνό διάλυμα στο μισογεμάτο με νερό ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνουμε με νερό υπό συνεχή ανάδευση. Ψεκάζουμε με το ψεκαστικό υγρό μέσα σε λίγες ώρες. Σε περίπτωση ανάμιξης με άλλο σκεύασμα, διαλύουμε πρώτα το BELTHIRUL και μετά προσθέτουμε το άλλο σκεύασμα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Διατηρείται στην αρχική του παραβίαστη συσκευασία, σε χώρο καλά αεριζόμενο, ξηρό και δροσερό (με θερμοκρασίες έως 35°C), προστατευμένο από έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



Belthirul

Belthirul 32000 WP

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki
(Βάκιλλος Θουριγγίας υποείδος Κουρστάκι) 6,4%

Βρέξιμη σκόνη

Εγγυημένη σύνθεση

δ-endotoxin / Ενεργός πρωτεΐνη υπό μορφή κρυστάλλων του Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 6,4% β/β ή 32000 IU/mg
Αδρανείς και βοηθητικές ουσίες 93,6% β/β

Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δρά δια καταπόσεως, μετά την οποία οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 14253/5-5-08

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΧΙ



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 500 ΓΡΑΜ.

Κάτοχος της έγκρισης - Παρασκευαστής - Εργοστάσιο παρασκευής: **PROBELTE S.A., Ισπανία.**

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση - Εργοστάσιο συσκευασίας - Διάθεση:



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΒΕΕ
Εθν. Αντιστάσεως 84, 152 31 Αθήνα
Τηλ.:210 6717794, Fax: 210 6722310
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Belthirul 32000 WP

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Μην εισπνέετε τη σκόνη. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του. Μην εισέρχεστε σε ψεκασμένη περιοχή μέχρι να στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, σταματήστε αμέσως την εργασία και καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. **Αντίδοτο**: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ.

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες), ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό), καταστρέφονται μαζί με τα κουτιά με σκίσιμο, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης και εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



Μέλος του

