Φάσμα δράσης:
ΕΠΙΡΡΑΣΤΕΙΑΣ: *Γκρέπ Φρουτ:* Για παράταση του κάρπου συγκομιδών 2.5-3.75 γρ.ακ./100 λίτρα νερό ή 5-15 γρ.ακ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-400 λίτρα/στρέμμα. Όταν οι καρποί στην περιφέρεια του δένδρου εμφανίσουν τα πρώτα συμπτώματα καγκώματος. 1 εφαρμογή. **Λεμόνι:** Για συντήρηση του κάρπου συγκομιδών σε ισοβάθμιες ποικίλίες, για καθυστέρηση της συγκομιδής σε δένδρα εκ φύσεως ή και σε συδέση του εμπορίου. Ψεκάστε τα δένδρα με 1.25-2.5 γρ.ακ./100 λίτρα νερό ή 2.5-7.5 γρ.ακ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-300 λίτρα/στρέμμα. Όταν οι περισσότεροι καρποί έχουν χρωμό από βαθύ πράσινο έως λίγο πάνω κίτρινο. 1 εφαρμογή. **Κλημεντίνες:** Η: Για αύξηση της καρπόδεσης και της παραγωγής σε δένδρα με ελαττία παραγωγικότητα 2.5-6.25 γρ.ακ./100 λίτρα νερό ή 5-18.75 γρ.ακ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-300 λίτρα/στρέμμα. Ψεκάστε τα δένδρα όταν τα πέταλα τους πέσουν κατά 50% και τα καρπόδεσμα φανούν. Ιδ: Ενισχυτικό 5 συνεπόμενες φάσεις σε διαστήματα 15-20 ημερών μεταξύ τους. Ψεκάστε τα δένδρα με 0.625-1.25 γρ.ακ./100 λίτρα νερό ή 1.875-3.75 γρ.ακ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-300 λίτρα/στρέμμα. Χρήση συγκολλητικού: Ψεκάστε τους καρπούς, οι οποίοι βρίσκονται στην περιφέρεια του δένδρου και οι οποίοι κρυμμένοι νωρίς. 1 εφαρμογή. **Πορτοκαλί ωκάς ποικιλίες Valencia:** Η Για παράταση του κάρπου συγκομιδών και για βελτίωση της ανθοφόρας του, ιδίως του καρπού κοντά του παραγωγού από δένδρα 2.5 γρ.ακ./100 λίτρα νερό ή 7.5-30 γρ.ακ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 300-400 λίτρα/στρέμμα. Για κάλυψη αποτελέσματα ψεκάστε μόλις το κρυώσει του καρπού αρκίσει να αλλάζει από πράσινο σε κιτρινωπό. Εάν δεν επιδιώκετε μεγάλη καθυστέρηση της συγκομιδής, ψεκάστε αφού οι καρποί πάρουν το ζητούμενο χρώμα τους. 1 εφαρμογή. Ζ: Για συμφόρηση των ωοειδών του ακαθίστατα σε συνδυασμό η ανεύρεσιμο του ανθού κατά την εποχή συγκομιδής 3.5-5 γρ.ακ./100 λίτρα νερό ή 10.5-15 γρ.ακ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 300-400 λίτρα/στρέμμα. Ψ: Η εφαρμόζετε πριν από τη πλήρη ανάπτυξη των ανθέων. **Μανταρίνι Ανθεύν:** Η: Για αύξηση καρπόδεσης και καρπόδεσμα σε ποικίλίες που δεν καρποδένουν 1.25 γρ.ακ./100 λίτρα νερό ή 1.25 γρ.ακ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκάστε τα δένδρα με τα πέταλα τους σχεδόν πεσμένα. 1 εφαρμογή. Ζ: Για καρποσύρσιμο καρπόδεση μετά την καρποσύρσιμο τα ανθέων από σαρκί 1.75-6.25 γρ.ακ./100 λίτρα νερό ή 3.5-6.25 γρ.ακ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Στην αρχή της ανθόπτωσης. 1 εφαρμογή. **ΑΜΠΕΛΙ:** Σουλτανίνα για επιτραπέζια κρίση: Η: Αύξηση του ποσοστού καρπόδεσης σε ποικίλίες που δεν δένουν 5-10 γρ.ακ./100 λίτρα νερό ή 5-10 γρ.ακ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Σε δόσεις ίσες στη πλήρη ανθέση (όταν δηλαδή το 70% των πλήλλων έχει πέσει) και μόλις δούν οι ρόγες αποκτήσουν μέγεθος 3mm τουλιγιστό (2). 2 εφαρμογές. Σουλτανίνα για παραγωγή σταφίδας: Η: Αύξηση της παραγωγής και του μεγέθους της ρόγας, ιδίως εάν ακολουθεί του ψεκασμού 0.5 γρ.ακ./100 λίτρα νερό ή 1.25 γρ.ακ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκάστε τα δένδρα σε δόσεις ίσες στη πλήρη ανθέση (όταν δηλαδή το 70% των πλήλλων έχει πέσει) και μόλις δούν οι ρόγες. 2 εφαρμογές. **Μαύρη Κορινθιακή σταφίδα:** Για βελτίωση της ποιότητας και ανοιχτού του ανοίγματος ρόγας 0.25-1.25 γρ.ακ./100 λίτρα νερό ή 0.25-1.25 γρ.ακ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκάστε τουλιγιστό μα τα σκεύασμα, όταν έχουν πέσει όλα τα πήλλα. 1 εφαρμογή. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ:** Αγκινάρες: Για πρώιμη της συγκομιδής και για βελτίωση της ποιότητας και για αύξηση της παραγωγής 0.625-1.25 γρ.ακ. σε 15 λίτρα νερό ή 2.272-2.95 γρ.ακ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-50 λίτρα/στρέμμα. Όταν ξεφυτρώνουν 6-8 φύλλα ή 6-12 φύλλα για φυτά ενός έτους. 3 εφαρμογές. **Λαχανάκι:** Για ομαλοποίηση και πιστοποίηση και για αύξηση της παραγωγής 2.5 γρ.ακ. σε 600 λίτρα νερό. Βυθίστε τους κόκκαλους στο κομμένους σέτε δεν γκ 4 λεπτά σε διάλυμα του σκευάσματος. 1 εφαρμογή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Το σκεύασμα πρέπει να εφαρμόζεται με προσέκτικη προσκολλήτικού σε δίπες τις κοπίθλιγκες εκτός από τα πτωκινά. Ακολουθείστε τις οδηγίες του προσκολλήτικού. (1) Πρέπει να προσέξετε ώστε να μην συμβεί υπερδόσική καρπόδεση.
(2) Προσέξτε ώστε να βρεχούν καθε τα εσωτερικά. Για καλύτερα αποτελέσματα, ψεκάστε δύο φορές: α) όταν το 70% των πήλλων έχουν πέσει (στην πήλιη ανθέση) και β) κατά την καρπόδεση, ανάλογα με τις ανοιξιόγενες συνθήκες της περιοχής, ανάλογα με τις ανοιξιόγενες συνθήκες της περιοχής.
(3) Συνιστώνται 5 συνεπόμενα φυσιόγυρα σε διαστήματα 15-20 ημερών μεταξύ τους. Πρέπει να αυξάνεί συγκρόνως η πίεσκνση κατά 50% και να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ρόδιουση. Το νερό πρέπει να είναι καταλλήλλο για ρόδιουση. Εάν είναι αδύνατο, πρέπει να αποφεύγεται η πολύ πρώιμη χρήση του σκευάσματος.

Συνδυαστικότητα: Το BIRELEX 40 SC συνδυάζεται με τα περισσότερα ψεκαστικά διαλύματα αλλά δεν πρέπει να συνδυάζεται με αλκαλικές αντάδρασης ψεκαστικά υγρά (βορδιάτος, θείο κτλ.).

Φυτοτοξικότητα:
Το BIRELEX 40 SC δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις και τις οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στην ετικέτα.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Στην αρχική και κλειστή συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό, σκοτεινό μέρος, μακριά από φυσιο ηλιακό φως, πηγές θερμότητας και ανάφλεξης, παραμένει σταθερό μέχρι και τρία (3) χρόνια.

Αρ. Παρτίδας:
Ημ/νία Παραγωγής:

L162329 GREC/11P

Bereles® 4056
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΟΓΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΙΤΡΟΥ ΕΠΗ

syngenta

Gibberellic acid (γιββερελλίνικο οξύ)
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Γεωργ.: 8182/2-6-2008
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Gibberellic acid 40% β/β
Βοηθητικές ουσίες 52,95% β/β
Φυτορυθμιστική ουσία η οποία επηρεάζει την ποσότητα, την ποιότητα και το χρόνο συγκομιδής, ανάλογα με την καλλιέργεια.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΠΩΡΙΔΕ: **SCAE Valent BioSciences Italy S.r.l.**, Ιταλία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: **Syngenta Hellas A.E.B.E.**, Λιβάδεια, Λιτανής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ.ΝΗ. ΒΙ.ΤΕ. Ε.Σκάος, Τηλ.: 231 0796940-3
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: **Syngenta Hellas A.E.B.E.**, Ανθούσα Βοιωτίας, Τηλ.: 2262 051600

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης Ελληνικού Δημοσίου και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΚΕΑ ΕΠ-ΕΚΕΣ

10x2,5 gr

TM

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Φυλάσσετέ το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, μη πίνετε ή μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μη φορείτε καταλλήλλο ιόνεκα. • Πλύνετε τα κέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης: Μη μην προκαλέσετε εμετός. Ξπλύνετε αμέσως κατρκκά τη στόμα και δώστε στο πλικτίο του πρόσκτος, όπου είναι δυνατό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον ασθενή από την έκθεση στο σύμμικτο, πρόσεχτε τον σε ανοιχτό σε ζεστό περιβάλλον. Πα δίνουμε ασφαλείας κρίσεις ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση επαφής με τα δέρματα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως με άφθονο κρύο νερό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό. Ζητείστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Ανάλογα με ιατρικές ενδείξεις: Εφαρμόζετε συμπτωματική θεραπεία.
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπάνετε τα νερά άδειασης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλλιέργειας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζτωμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκεύασματος. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχιζόντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να αναδευτεί καθε πριν αρχίσει ο ψεκασμός.

Οδηγίες για την σωστή απόχρση της συσκευασίας: Το κενό μέτρο συσκευασίας, ξεπλυμένο τρεις φορές με τριπλό ξέπλυμα πριν νερό στην ξεπλύματα τα νερά στην ψεκαστικό μηχ. Ξεπλυμένο στο ψεκαστικό μηχ. και αφού καταστραφούν πρόσπαθείας μη χρήσιμο, για τη διαθεσιμότητα της μη παραπέρω χρήσης, ελαχιστοποίηση σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.