

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν το χρησιμοποιείτε. • Φοράτε κατάλληλα γάντια και σκευαστή προστασίας ματιών/προσώπου.
 • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/θετικό δεδομένων ασφαλείας. • Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε αμμώδη εδάφη με περικοτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη ή ίση με 1%. • Προκειμένου να μην αναπτυχθεί ανεπιθύηλτα μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει metalaxyl-M περισσότερο από 3 φορές.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από σπύλια:
 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
 Σε περίπτωση κατάποσης: Χρησιμοποιήστε ιατρικό ενεργό άνθρακα, διαλυμένο σε νερό. Προσπαθήστε να μην προκαλέσετε εμετό σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του.
 Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Επιβαρύνει για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Το δραστικό συστατικό acibenzolar-S-methyl (ισομόδια βενζοθειαδιαζολικά) είναι διασυστηματικός ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας του φυτού, προλαμβάνεται γρήγορα από όλα τα μέρη του φυτού αλλά και από τις ρίζες και με το μεταβολίτη του μετακινείται άκρο και βασίπεδικά σε όλα τα φυτικά μέρη. Το metalaxyl-M (ισομόδια φανυλαμίδιο) απορροφάται ταχέως από το φύλλωμα και κινείται μέσα στο φυτό με ανοδική ακροπτελική κίνηση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμός φυλλώματος, σε προληπτικούς ψεκασμούς κατά την περίοδο της έντονης ανάπτυξης.

Αριθμ. Παράδοχ: Βλέπετε στο επάνω τμήμα
 Ημ/νία Παρασκευής: της συσκευασίας
 Ημ/νία Λήξης:



L136335 GRECI7L



BION MX[®]
44 WG

Metalaxyl-M + acibenzolar-S-methyl
 (μεταλαξύλ-M 37,526% +
 σσιμινεζολάρ-S-μεθύλ 4%)

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:
 Metalaxyl-M 37,526% β/β
 acibenzolar-S-methyl 4% β/β
 βοηθητικές ουσίες 54,64% β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο κατά του περονόσπορου σε καπνό.
Ενεργοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας του φυτού.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: **Syngenta Hellas A.E.B.E.**
 Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 666612-13
 ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ: **Syngenta Hellas A.E.B.E.**
 Οινόφυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 2262 051600

Product names marked ® or ™, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

50 γρ. e

Αρ. Οριστ. Έγκρ. Κυβλ.
 Υπ. Γεωργίας:
 6889/10-10-2005
 Ημερ. λήξης: 10-10-2015

Xη - XI



ΕΠΙΒΑΡΕΣ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

• Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης

syngenta®

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Βάζουμε στο ψεκαστικό το μισό του απαιτούμενου νερού και με συνεχή ανάδευση ρίχνουμε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί στην έκταση που θα ψεκάσει. Ξεπλύνουμε 3 φορές τα κενά συσκευασίας. Ρίχνουμε το νερό στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό και ψεκάζουμε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Καπνός (ισχυρός και απορείο) 20-30 γρ. σκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού με 50-125 λίτ ψεκ. υγρού/στρέμμα ή 10-37,5 γρ. σκευάσματος/στρέμμα κατά του περονόσπορου μέχρι 3 εφαρμογές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Εφαρμόστε τη συνιστώμενη δόση ώστε να καλυφθεί πλήρως το φύλλωμα του φυτού. Οι μεγαλύτερες δόσεις αναφέρονται σε μεγάλη πίεση προσβολής, ενώ οι χαμηλές δόσεις σε μικρότερη πίεση προσβολής. Εφαρμογή μόνο σε προληπτικούς ψεκασμούς κατά την περίοδο της έντονης ανάπτυξης και όχι σε θεραπευτικούς ή εξοντωτικούς ψεκασμούς. Οι εφαρμογές γίνονται με ψεκασμούς μόνο στο υπέργειο τμήμα των φυτών. Στα καπνοσπορεία οι ψεκασμοί αρχίζουν από το "σταύρωμα" των φυταρίων. Στο χωράφι η πρώτη εφαρμογή πρέπει να είναι προστατευτική και να γίνεται 7-14 ημέρες μετά την μεταφύτευση ή σύμφωνα με την τοπική εμπειρία, όταν αναμένεται εκδήλωση της ασθένειας.

Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Τα διαστήματα εφαρμογών να μην υπερβαίνουν τις 14 ημέρες ενώ σε περίπτωση που οι συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας οι εφαρμογές γίνονται ανά 10 ημέρες.

Σε περίπτωση αλλοιγής με άλλο μυκητοκτόνο (όχι φανυλαμίδιο) πρέπει να τηρείται το μεσοδιάστημα του άλλου μυκητοκτόνου.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ -**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:**

Το Bion MX 44 WG παραμένει σταθερό για 2 χρόνια, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ήλιο και υγρασία και σε θερμοκρασία από -10 °C έως 20 °C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΝΤΟΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Η απόσυρση/καταστροφή του Bion MX πρέπει να γίνεται σε ψυκαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό, για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Είναι πιθανόν να προκληθεί παροδικό κίτρινοσμα ή αποχρωματισμός στην ποικιλία Μπρέβου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ : Καπνός: 7 ημέρες.

