



BONALAN* 18 EC

Benfluralin (Μπενφλουραλίνη) 18%

Υγρό Γαλακτωματοποίησιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Benfluralin: 18% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 81% β/β

Διαλύτης: Ξυλένιο

Εκλεκτικό προφυτρωτικό, ενσωματούμενο ζιζανιοκτόνο, που καταπολεμά τα ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια στη μηδική, τριφύλλι, και φιστίκι (αραχίδα).

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

Ερεθιστικό για το δέρμα.

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

Επιβλαβές: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

ΕΥΦΛΕΚΤΟ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ.Εγκρ.Κυκλ: 7086/26.2.1980 έως 28.2.2013

Περιεχόμενο: 10 Λίτρα

Κάτοχος της έγκρισης -

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση -

Παρασκευαστής σκευάσματος: Dow AgroSciences, FRANCE

Εργοστάσιο παρασκευής: Dow AgroSciences, ITALIA

Εργοστάσιο συσκευασίας: Dow AgroSciences, FRANCE

*Προϊόν και Σήμα κατατεθέν της Dow AgroSciences

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.,

Μεσογειών 335, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



1211

BONALAN* 18 EC

Φάσμα δράσης:

Καλλιέργειες: Αραχίδα, μηδική, τριφύλλι. Για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. **Δόση 650** κ.εκ./ στρέμμα (ελαφρά- μέσα εδάφη), **850** κ.εκ./στρέμμα (βαριά εδάφη). **Όγκος ψεκ.υγρού:** 20-40 λίτρα/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Προσπαρτικά, προφυτρωτικά, με ένσωματωση. **Μεγ αριθμός εφαρμογών ανά κ.π.:1**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ζιζάνια που καταπολεμούνται:

Αγρωστώδη: Αγριοκεχρί (*Cenchrus spp.*), Δακτυλοκτένι (*Dactyloctenium aegyptium*), Νεραργιάδα (*Digitaria spp.*), Μουχρίτσα (*Echinochloa colonum*), Ελευσίνη Ινδική (*Eleusine*), Ήρα (*Lolium Multiflorum*), Πάνικο (*Panicum texanum*), Πόα (*Poa annua*), Σετάρια (*Setaria spp.*), Βέλουρας (*Sorghum halepense*) (από σπόρο).

Πλατύφυλλα: Βλήτα (*Amaranthus palpen*), Βλήτα (*Amaranthus spp.*), Καλαντρίνα (*Calandrina caulescens*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Μολούγκο (*Mollugo verticillata*), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), Αντράκλα (*Portulaca oleraea*), Ριχάρντια (*Richardia scabra*), Στελάρια (*Stellaria media*)

1. Η σπορά ή μεταφύτευση γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή έως 6 εβδομάδες αργότερα.
2. Δεν εφαρμόζεται μετά τη σπορά ή τη μεταφύτευση.
3. Το σκευάσμα πρέπει να ενσωματωθεί το αργότερο 8 ώρες μετά τον ψεκασμό για να μην χάσει σημαντικό μέρος από τη δραστηριότητά του. Αν είναι δυνατό ο ψεκασμός και η ενσωμάτωση πρέπει να γίνονται συγχρόνως. Με την ενσωμάτωση θα πρέπει να σπάνε οι σβώλοι και να αναμειγνύεται το σκευάσμα πολύ καλά με το χώμα. Ομοιομορφία και αποτελεσματική ενσωμάτωση μπορεί να επιτευχθεί με φρέζα ή δισκοσβάρνα περνώντας 2 σταυρωτά περάσματα σε ορθή γωνία. Η ενσωμάτωση θα πρέπει να γίνεται σε βάθος 5-10 εκ.
4. Τα ενσωματωτικά μηχανήματα θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη ταχύτητα (6 έως 10 χλμ/ώρα) για να γίνεται καλό ανακάτεμα του σκευάσματος με το χώμα.
5. Καταπολεμά μεγάλο αριθμό ζιζανίων εμποδίζοντας τη βλάστηση των σπόρων. Δεν καταπολεμά τα αναπτυσσόμενα ζιζάνια.
6. Προστίθεται η πρόπυα δόση χρησιμοποιώντας ψεκαστικό μηχανήματα που να εξασφαλίζει ομοιομορφία κατανόμής του ψεκαστικού υγρού στην επιφάνεια του εδάφους.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός και ενσωμάτωση

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Πλένουμε το αδειο δοχείο ή το μετρητή του φαρμάκου πολλές φορές ρίχνοντας τα νερά ξεπλύματος στο ψεκαστικό δοχείο. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρσιμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε τα μηχανήματα εξωτερικά με νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου του ψεκαστικού με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό το ένα τρίτο του όγκου του ψεκαστικού δοχείου. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ αναδέψτε και αδειάστε τελείως. Επαναλάβετε τη διαδικασία. Φίλτρα και μετεκκία αφαιρούνται και καθαρίζονται ξεχωριστά με καθαρό νερό. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστάμενες δοσολογίες και οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνονται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανακτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές. Μην αποθηκεύετε κοντά σε πηγή θερμάνσεως ή φλόγας. Αποφύγετε το πάγωμα του φαρμάκου. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία πάνω από 5° C. Αποθηκεύστε τα αρχικά δοχεία συσκευασίας καλά κλεισμένα σε ασφαλές μέρος. Μην τρώτε ή πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο. Φοράτε προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβλήμα για να αποφευχθεί ρύπανση περιβάλλοντος. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

« Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης ».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Συμπτώματα: Ναυτία, εμετός. Τοποθετήστε τον ασθενή σε τέτοια θέση ώστε να αποφευχθεί αναρρόφηση. Αν έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν έρθει σε επαφή με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Το ξηκό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ: Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. Χρησιμοποιείστε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη και άλλα σιτηρά πριν περάσουν 10 μήνες από την εφαρμογή. Επίσης σόργο, καλαμπόκι, βρώμη, κοκκινόγυαλα, ζαχαρότευτλα και σπανάκι δε θα πρέπει να φυτευτούν για ένα χρόνο μετά την εφαρμογή. Αποφύγετε τη χρήση του σε εδάφη με περισσότερη από 5% ενεργό ουσία ή σε πολύ ελαφρά εδάφη (αμύδι). Μη ρυπάνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. Ψεκάζετε με πίεση μικρότερη από 2 atm. Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας. Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται και σε καλαμπόκι που προορίζεται για χλωρά νομή. Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορροπαντικό.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό και σκιερό. Αποφύγετε το πάγωμα του φαρμάκου. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία πάνω από 5° C. Σ' αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

HM/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε φιάλη



1211