

# BORDOPHYT 20 WP

## Μυκητοκτόνο

### Βρέξιμη σκόνη (WP)

Bordeaux mixture (μεταλλικός χαλκός σε μορφή βορδιγάλειου πολτού)

Εγγυημένη σύνθεση: Μεταλλικός χαλκός 20 % β/β (σε μορφή βορδιγάλειου πολτού)  
Βοηθητικές ουσίες: 21,57 % β/β

## Ανόργανο μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση

- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
- Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

#### ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

• Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε τη σκόνη ή το ψεκαστικό υγρό. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικινδύνους απόβλητα. • Αποφύγετε τη διάθεση του στο περιβάλλον. • Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. • Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. **Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:** Σε περίπτωση κατάποσης: χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγίων και περαιτέρω αντιμετώπιση. **Αντίδοτο:** Πενικιλλαμίνη. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777



#### Καλλιέργειες - Ασθένειες - Δόσεις - Χρόνος εφαρμογής

**ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΔΗ** (Γκρέιτ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Κιτριά, Νεραντζιά, Φράπα): **Δόση: 400 γρ.** / 100 λίτρα ψεκ. υγρό. **Κορυφοξήρα** με προληπτικές εφαρμογές φθινοπώρου εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, **Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών** με εφαρμογή μετά από χαλάζι ή παγετό. **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ:** **Δόση: 400 γρ.** / 100 λίτρα ψεκ. υγρό. **Κορύνεο** με μία εφαρμογή το φθινόπωρο όταν έχει πέσει το 75% των φύλλων και μία το χειμώνα λίγο πριν την έκπτυξη των ξυλοφόρων οφθαλμών. Με την έναρξη άλλες βλάστησης γίνονται άλλες 1-2 εφαρμογές εφ' όσον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. **ΚΑΡΥΔΙΑ:** **Δόση: 400 γρ.** / 100 λίτρα ψεκ. υγρό. **Ανθράκνωση:** Συνιστώνται 3-4 εφαρμογές που αρχίζουν πριν βγουν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. Να αποφεύγονται οι εφαρμογές στην άνθηση. **ΜΗΛΙΑ:** **Δόση: 550-625 γρ.** / 100 λίτρα ψεκ. υγρό. **Φουζικλάδιο:** Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων συνιστώνται εφαρμογές στα στάδια της πράσινης και ροδίτης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Δαμασκηνιά): **Δόση: 425 γρ.** / 100 λίτρα ψεκ. υγρό. **Εξώσκακος, Κορύνεο, Φαία σήψη:** Προληπτικές εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάτια. **ΑΜΠΕΛΙ:** (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): **Δόση: 550-650 γρ.** / 100 λίτρα ψεκ. υγρό. **Περωνόσπορος, Ανθράκνωση:** Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων προληπτικές εφαρμογές που αρχίζουν την άνοιξη όταν υπάρχουν οι κατάλληλες για την προσβολή συνθήκες και συνεχίζονται ανάλογα με την εξέλιξη των τοπικών συνθηκών. **ΕΛΙΑ:** **Δόση: 600-650 γρ.** / 100 λίτρα ψεκ. υγρό. **Κυκλοκόνια:** Δύο εφαρμογές: η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ., **Γλοιοσπίριο:** Δύο εφαρμογές: Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. **Καρκίνωση:** Εφαρμογές μετά από χαλάζι ή παγετό. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ** (Κρεμμύδι, Πιπεριά, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Σέλινο, Φασόλι): **Δόση: 350 γρ.** / 100 λίτρα ψεκ. υγρό. **Περωνόσπορος:** Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σπορόφυτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες. **Ανθράκνωση:** Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά. **Βακτηριώσεις:** Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σπορόφυτων και σταματούν στην καρπώδη. **ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ):** **Δόση: 550-625 γρ.** / 100 λίτρα ψεκ. υγρό. **Περωνόσπορος:** Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **Βακτηριακή κηλίδωση:** Εφαρμογές με την εκδήλωση της ασθένειας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση της. **ΠΑΤΑΤΑ:** **Δόση: 275-612,5 γρ.** / στρ. (βαριά προσβολή) & **175-275 γρ.** / στρ. (ελαφρά προσβολή). **Περωνόσπορος:** Εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας οι εφαρμογές ξεκινούν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επαναλαμβάνονται ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:** **Δόση: 250-275 γρ.** / στρ. **Κερκοσπορίωση:** Εφαρμογές που αρχίζουν με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΚΑΛΛΟΠΙΣΤΙΚΑ:** **Δόση: 550-650 γρ.** / 100 λίτρα ψεκ. υγρό. **Περωνόσπορος, Σειπτορίωση:** Εφαρμογές που αρχίζουν με την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων. **Φυτόφθορα:** Εφαρμογή στα νεαρά φυτά στο σπορείο ή μετά τη μεταφύτευσή.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΔΗ - ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ - ΚΑΡΥΔΙΑ - ΑΜΠΕΛΙ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: 4, ΜΗΛΙΑ - ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ - ΕΛΙΑ: 2, ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ) - ΠΑΤΑΤΑ - ΚΑΛΛΟΠΙΣΤΙΚΑ: 6

**Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα):** ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΔΗ: 200-250, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ - ΚΑΡΥΔΙΑ: 100-150, ΜΗΛΙΑ: 100-200, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 100-120, ΑΜΠΕΛΙ: 50-100, ΕΛΙΑ: 150-300, ΛΑΧΑΝΙΚΑ: 50-80, ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ): 50-100, ΠΑΤΑΤΑ: 50-100, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: 40, ΚΑΛΛΟΠΙΣΤΙΚΑ: 50-100.

#### Παρατηρήσεις:

1) Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τη μηλιά και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.

2) Στις καλλιέργειες: αμπέλι, εσπεριδοειδή, μηλιά, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

**Τρόπος εφαρμογής:** ψεκασμός φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και αφού το περάσετε από φίλτρο. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας καλά (με επιστροφή 10-20 λίτρα νερό το λεπτό). **Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με οργανοφωσφορικά και καρβαμικά εντομοκτόνα καθώς και με maneb, mancozeb, folpet, captan και thiram. Επίσης δεν συνδυάζεται με ελαιούχα σκευάσματα όταν ο ψεκασμός γίνεται εκτός της εποχής του ληθάργου των δένδρων.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκoi) μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηνιά αφού φουσκώσουν τα μάτια. Επίσης μπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή κάτω από ορισμένες συνθήκες (υψηλή υγρασία). Φυτοτοξικότητα παρουσιάζει επίσης σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς. Στη μηλιά να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Εσπεριδοειδή: 21 ημέρες, Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά): 28 ημέρες, Μηλιά, Πυρηνόκαρπα: Μη Εφαρμοσίμο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της Καλλιέργειας κατά την εφαρμογή), Αμπέλι (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): 21 ημέρες, Ελιά: 21 ημέρες, Λαχανικά (Υ+Θ): 7 ημέρες, Τομάτα Υπαίθρου: 10 ημέρες, Τομάτα Θερμοκηπίου: 7 ημέρες, Πατάτα, Ζαχαρότευτλα: 21 ημέρες

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

#### Αποκλειστικοί Διανομείς:

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.  
Δ. Γληνού 32, Βούλαργη, Θεσσαλονίκη, 542 49  
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378  
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com  
www.ypsilon-agro.com

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: Αρ. Εγκρ. Κυκλ.: 6858/17-5-2002

Κάτοχος της έγκρισης: HIDROGLOBAL TECNOLOGIA DEL AGUA, S.A., Ισπανία.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε., Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα.

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία & σήμανση - Παρασκευαστής - Εργοστάσιο παρασκευής & συσκευασίας: INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A., Ισπανία.

Ημερ. παραγωγής (Prod. date):

Αριθ. παρτίδας (Lot No):



**Καθαρό Βάρος 20 κιλά**