

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ● Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ● Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. ● Φοράτε κατάλληλα γάντια. ● Σε περίπτωση που ο εργάτης εισέρχεται στον αγρό μετά τον ψεκασμό πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης
Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο: Αν πάσει στα ρούχα ή το δέρμα: βγάλτε τα ρούχα και πλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό και σαπούνι το δέρμα που ήλθε σε επαφή με το σκεύασμα ή το ψεκαστικό υγρό. Τα ρούχα να μην ξαναφορεθούν πριν πλυθούν καλά. **Αν πάσει στα μάτια:** ρίξτε αμέσως άφθονο νερό. **Αν καταποθεί:** ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77.93.777

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μην ρυπνίζετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία ασφάλιστη ζώνη προστασίας:

-5 μ μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για καλλιέργειες

Βαμβακιά, τομάτες, μελιτζάνες, πεπονίου και καρπούζι αγρού.

-10 μ μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για καλλιέργεια **αμπέλου**

-20 μ μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για καλλιέργειες **εσπεριδοειδών, μηλοειδών, πυρηνόκαρπων**

Για να προστατέψετε τα μη στοχευμένα αρθρόποδα να αφήσετε μια ασφάλιστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και αρχίστε την ανάδευση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεκίζοντας την ανάδευση και κατά τον ψεκασμό

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής: -Εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα: 14 μέρες, -Μηλοειδή, σταφύλια: 28 μέρες, -Τομάτα και μελιτζάνα (θερμοκηπίου και υπαίθρου), καρπούζι και πεπόνι (υπαίθρου): 3 μέρες, φράουλες: 3 μέρες, -Βαμβάκι: 35 μέρες

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός πλήρους κάλυψης του φυλλώματος με καλή κάλυψη της επιφάνειας των φύλλων. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τριήχημα, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαρτισμένη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασία κάτω από 0 °C

Μη. Παρασκευής, Ημ. λήξης, Αρ. Παρτίδος: Βλέπε επί της συσκευασίας

BORNEO 11SC

ΕΤΟΧΑΖΟΛΕ (ΕΤΟΞΑΖΟΛ) 11% ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΕΝΑΙΩΗΜΑ (SC)

Εγγ. Σύνθεση: etoxazole 11% β/ο,
Βοηθ. Ουσίες 88,84% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 2108 / 18-10-2005

Ακαρεοκτόνο επαφής. Παρεμποδίζει την εξέλιξη των αυγών και των άλλων ατελών μορφών των ακάρεων καθώς και τη γονιμότητα των θηλυκών ατόμων

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ν



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλον

Περιεχόμενο: 500 κ.εκ

Παρασκευαστής - Κάτοχος της έγκρισης- Υπευθύνος για την τελική συσκευασία και σήμηση:

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.,
T.K. 69370 Saint Didier au Mont D'Or, Γαλλία

Εργοστάσιο παρασκευής: SBM Formulation, Γαλλία

Εργοστάσιο συσκευασίας- Διανομέας - Υπευθύνος επικοινωνίας:



κελλαφορμ-ε

ΑΘΗΝΑ: Φιλέγγυ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΒΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.Π.Ε.Θ. 57022 Σόδας, τηλ 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Σπυλίδι Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις ml/ στρέμμα	Δόσεις ml/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού*	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	Τρόπος και χρόνος** εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά,)	Τετράνυχος κίτρινος (<i>Tetranychus urticae</i>), Κόκκινος (<i>Panonychus ulmi</i>)	50 max	25-30	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της εκκλάσης των κινούμενων μορφών από τα χειμερινά αυγά	1 εφαρμογή
			35-50	100		
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i>)	50 max	25-30	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της εκκλάσης των κινούμενων μορφών από τα χειμερινά αυγά	1 εφαρμογή
			35-50	100		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά, γκρέιφ φρουτ,φράπα)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citri</i>)	50 max	15	200-300	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών	1 εφαρμογή
			20	200-250		
			25	200		
Αμπέλι (οινοποτήσιμα και επιτραπέζια)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i>)	25 max	25	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Τέλος Άνοιξης - μέσα Ιουνίου με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών	1 εφαρμογή
			30-50	50		
Τομάτα, Μελιτζάνα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 max	25-35	50-100 (υπαίθρου)	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών	1 εφαρμογή
			25-30	50-150 (θερμοκηπίου)		
			35	50-100(θερμοκηπίου)		
Καρπούζι, Πεπόνι (υπαίθρου)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	30- 35	35-50	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών	1 εφαρμογή
Φρούαλα υπαίθρου και υπό κάλυψη	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	40- 50	50	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών	1 εφαρμογή
Βαμβάκι	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	30- 37,5	-	50-80	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Πριν από το άνοιγμα των καρπιδίων, με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών	1 εφαρμογή
Τριανταφυλλιά (θερμοκηπίου)	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 max	25-50	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών	1 εφαρμογή

*Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού.

** Σύμφωνα με τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις των τοπικών γραφείων φυτοπροστασίας. Αν η εφαρμογή καθυστερήσει και είναι παρών μεγάλος αριθμός ενήλικων πρέπει να εφαρμοστεί ακαρεοκτόνο με δράση σε ενήλικα. Διάρκεια προστασίας 45-60 ημέρες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή της ανάπτυξης ανθεκτικότητας να γίνεται μια εφαρμογή κατά έτος.

Αυτοτοξικότητα: Τα σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό για τις προτεινόμενες καλλιεργειές και οδηγίες χρήσης.