

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια. • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα. • Μετά την επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. • Φοράτε κατάλληλες μπότες. • Χρησιμοποιείτε κατάλληλους περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεήτριο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό και καλέστε αμέσως γιατρό.
• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και πλύνετε πολύ καλά τα μέρη του σώματος με νερό πρώτα και με σαπούνι και νερό στη συνέχεια. Τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί πρέπει να πλυθούν καλά και να σιδερωθούν πριν ξαναφορεθούν.
• Σε περίπτωση αναπνοής: Απομακρύνετε το άτομο από την επικίνδυνη περιοχή σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατέψτε το από την υποθερμία. Για προληπτικούς λόγους καλέστε γιατρό.
• Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το γιατρό και δείξτε του αυτό το δοχείο ή την ετικέτα, μην προκαλέσετε έμετο.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Να μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Κρατείστε αψέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρα από τις υδάτινες επιφάνειες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Φυτοτοξικότητα: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Συνδυαστικότητα: Στο σιτάρι και στο κριθάρι το BOXER 800 EC (δόση: 300 κ.εκ./στρ.) μπορεί να συνδυαστεί με το LOGRAN 20 WG.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Δεν ορίζεται, λόγω ενωρίς χρόνου εφαρμογής για όλες τις καλλιέργειες.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του απαρτία συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια.



L153648 GREC/10N



syngenta.

Prosulfofcarb 80% (προσουλφοκάρμπ)
Γαλακτωματοποιημένο υγρό (EC)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Prosulfofcarb 80% β/ο
βοηθητικές ουσίες 19,15% β/β

Αρ. Οριστ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Γεωργίας:
7693/19-12-07

**Θειοκαρβαμικό ζιζανιοκτόνο
για την καταπολέμηση ετήσιων
αγρωστωδών και ηλιατόφυλλων
ζιζανίων σε καλλιέργειες
χειμερινών σιτηρών (σιτάρι,
κριθάρι) και σε πατάτα.**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

**Απαγορεύεται η πώλησή του
σε ερασιτέχνες**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Ltd, Ayyia
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΜΙΑΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε.Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3
ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΣ: Syngenta Chemicals, Βέλγιο
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Οινόφυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 2262 051600

Product name marked on the logo, the ALLIANCE FRAME,
the SYNGENTA Logo and the PROPOSE ICON,
are trademarks of a Syngenta Group Company

1 lt e

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

• Ερεθίζει το δέρμα
• Μπορεί να προκαλέσει
ευαισθητοποίηση σε
επαφή με το δέρμα

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

• Πολύ τοξικό για τους
υδρόβιους οργανισμούς,
μπορεί να προκαλέσει
μακροχρόνιες δυσμενείς
εππτώσεις στο υδάτινο
περιβάλλον.

Τρόπος εφαρμογής:

Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους με ψεκαστήρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό 30-40 λίτρα/στρέμμα για σιτάρι, κριθάρι και πατάτες. Πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm (45 PSI) και μικρό τύπου σκούπας. Ψεκασμός υπό συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Βάζουμε στο ψεκαστικό δοχείο τη μισή της απαιτούμενης ποσότητας νερού και υπό συνεχή ανάδευση ρίχνουμε το Boxer 800 EC. Υπό συνεχή ανάδευση συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του, αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση. Τα κενά υλικά συσκευασίας να ξεπλένονται πολλές φορές και τα νερά να ρίχνονται στο ψεκαστικό διάλυμα.

Αριθμός εφαρμογών: Μία για όλες τις καλλιέργειες.

Φάσμα δράσης:

Σιτάρι - Κριθάρι - Πατάτα: Κατά των ετήσιων, αγρωστωδών και ηλιατόφυλλων ζιζανίων με 400-500 κ.εκ./στρ. Στο σιτάρι και κριθάρι να γίνεται καθολικός ψεκασμός του εδάφους προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά μέχρι τα δύο φύλλα της καλλιέργειας και των ζιζανίων. Στη πατάτα να γίνεται καθολικός ψεκασμός του εδάφους προφυτρωτικά μέχρι το φυτόωμα.

Παρατηρήσεις:**1. Ευαίσθητα ζιζάνια:**

• **Αγρωστώδη:** Alopecurus myosuroides (Αιθενουρά), Lolium spp (Ηρά), Echinochloa crus-galli (Μουχρίτσι), Setaria spp (Σετάρι).
• **Ηλιατόφυλλα:** Chenopodium album (Λουβουδιό), Fumaria officinalis (Καννιχορτό), Galium spp (Κολλητσίδα), Stellaria media (Στελλιάρια), Veronica spp (Βερνίκια), Polygonum lapathifolium (Λαπάτσι), Polygonum persicaria (Αγριοπιπεριά), Portulaca oleracea (Γλυστρίδα), Anthemis spp (Ανθέμιδα).

2. Να εφαρμόζεται με καθολικό ψεκασμό σε 30-40 λίτρα νερού/στρέμμα.

3. Να μην εφαρμόζεται όταν η οπόρα έχει πραγματοποιηθεί υπό δυσμενείς συνθήκες ή όταν οι οπόροι είναι πολύ επιφανειακοί.

4. Σε περίπτωση επανασποράς μετά από αποτυχία της καλλιέργειας:

• Στην πατάτα επιτρέπεται να επανασπαρουν οι καλλιέργειες: αραβόσιτος, λάχανο και πατάτα ενώ δε συνιστώνται φασόλια και Lolium.
• Στο σιτάρι μπορούν να επανασπαρουν οι καλλιέργειες: σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, ραφανίδα, ηλιάνθος, σόργο και σόγια, ενώ δεν συνιστώνται τα φασόλια.

Αναλυτικά σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορούν να επανασπαρουν την άνοιξη οι ακόλουθες καλλιέργειες:

Χωρίς όργωμα: ηλιάνθος - καλαμπόκι - ηλιάνθι - ανοιξιάτικο μιζέλι - ανοιξιάτικο ελαιοκράμβη - οπόροι σόγιας - βαμβάκι.

Με όργωμα: μαρούλι - ζαχαρότευτλα - πατάτες - κρεμμύδια - καρότα.

Δεν συνιστώνται: φασόλια ξηρά και χλωρά.

Αριθμ. παρτίδας: Βλέπε φιάλη

Ημ. παραγωγής: Βλέπε φιάλη