

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ● Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές ● Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε ● Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. ● Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. ● Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια.

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση κατάποσης: να μην προκληθεί εμετός. Μεταφέρετε αμέσως τον ασθενή στο νοσοκομείο και δείξτε την ετικέτα. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

● Φυλάξτε το χωριστά από άλλα γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπórους ● Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. ● Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες (σιτηρά). ● Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. ● Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών ● Μην αυξάνετε τις δόσεις ● Μην ψεκάζετε στο ίδιο χωράφι πάνω από μια φορά το χρόνο ● Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm (45 psi) ● Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται ● Μετά τον ψεκάσμο ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με άφθονο νερό και απορρυπαντικό.

Χρονικό διάστημα ασφάλειας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των επόμενων καλλιεργειών: Μην σπέρνετε στο ίδιο χωράφι μηδική, σιτηρά, σόργο, καλαμπόκι, μαρούλια και ζαχαρότευτλα πριν περάσουν δώδεκα (12) μήνες από την εφαρμογή του σκευάσματος

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αποφεύγετε σε ειδικές οδηγίες / δελτία δεδομένου ασφαλείας Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για δυο μήνες

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική καλά κλεισμένη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό και ξηρό. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δυο χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΗΜ. ΛΗΞΗΣ - ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε άνω μέρος φιάλης

BRIMAN 45SC

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

Εγγυημένη σύνθεση :narporamide 45 % β/ο (χημ.ομάδα: αμίδια)
βοηθ. ουσίες 55.85 % β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.:
7736/17-01-05

ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ ΖΙΖΑΝΙΑ

**Απορροφάται από τις ρίζες και μεταφέρεται ακροπεταλίως.
Αναστέλλει την ανάπτυξη των ριζών και των φυτών γενικότερα.**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Χι



Ερεθίζει τα μάτια

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

**Περιεχόμενο:
1 λίτρο**

Κάτοχος της έγκρισης:
AGRODAN APS
Ramskovvej 11, 7550 Sorvad, Denmark
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία
και σήμανση:
UNITED PHOSPHORUS LIMITED
Chadwick House, Birchwood Park,
Warrington, WA3 6AE, United Kingdom
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
ANORGKAXHM A.E.
Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ



ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900-9
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
e-mail: info@hellafarm.gr

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ -ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ/στρέμμα)-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά, βυσσινιά, αμπέλι (επιτραπέζιο & οиноποιήσιμο): 800-900.α) Προφυτευτικά: Ψεκασμός του εδάφους μετά την προετοιμασία του. Ενσωμάτωση σε βάθος 5 εκ. μέσα σε 5 μέρες από την εφαρμογή (οι γυμνές ρίζες να μην έρχονται σε επαφή με το ψεκασμένο έδαφος). β) Επιφανειακή εφαρμογή μετά το φύτεμα ή σε εγκατεστημένα φυτά. Ψεκασμός της γυμνής επιφάνειας του εδάφους (εάν υπάρχουν πολλά φυτρωμένα ζιζάνια εφαρμόστε το σε ανάμειξη με ζιζανιοκτόνο επαφής). Χρησιμοποιείστε αρκετό νερό για να περνά τα υπάρχοντα ζιζάνια και να φτάνει στην εδαφική επιφάνεια. Αν δεν βρέξει μέσα σε 7 ημέρες, εφαρμογή τεχνητής βροχής 1-2.5 χιλιοστών.

Φράουλα μεταφυτευόμενη και ήδη εγκατεστημένη: 600-900. α) Την άνοιξη, ψεκάζεται στην επιφάνεια του εδάφους. Εάν δεν βρέξει μέσα σε μια βδομάδα πρέπει να γίνει ενσωμάτωση με τεχνητή βροχή ή να ενσωματωθεί σε βάθος 2.5-5 εκ. β) Τέλη ανοίξεως και το καλοκαίρι ψεκάζεται στην επιφάνεια του εδάφους. Εάν δεν βρέξει μέσα σε 24 ώρες πρέπει να ενσωματωθεί με τεχνητή βροχή. Οι μικρές δόσεις είναι για ελαφρά και οι μεγάλες για βαριά εδάφη. Να μην ψεκάζεται από την άνθηση μέχρι τη συγκομιδή

Τομάτα, πιπεριά, καπνός: 225-400. α) Ομοιόμορφος ψεκασμός εδάφους πριν τη μεταφύτευση και ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 2.5-5 εκ μέσα σε 2 ημέρες

από την εφαρμογή. β) Προφυτευτικά: Επιφανειακός ψεκασμός αμέσως μετά τη σπορά ακολουθούμενος από τεχνητή βροχή 1-2.5 χιλιοστών (αν δεν βρέξει μέσα σε 2 μέρες).

Σπορεία (τομάτας, πιπεριάς, καπνού): 500-800. Εφαρμόζεται στην επιφάνεια του σπορείου μετά την σπορά και πάντοτε πάνω στο στρώμα κοπριάς ή άμμου που προστίθεται πάνω από το σπόρο. Μπορεί να γίνει ψεκασμός με χειροκίνητο ψεκαστήρα πλάτης και να ενσωματωθεί με πιστιπήρι.

Στόχοι: Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1 εφαρμογή (για όλες τις καλλιέργειες)

Παρατηρήσεις

1. Ανθεκτικά ζιζάνια: Αγριοπανσές, Ραπανίδα, Δωδεκάνθη, Σινάπια, Κίρσιο, Στύμφος. 2. Αν εφαρμοστεί νωρίς την άνοιξη καταπολεμά και τα ριζώματα της αγριάδας, του βελιούρα και της κύπερης. 3. Να μη χρησιμοποιείται σε εδάφη με οργανική ουσία πάνω από 10%, όπως επίσης και σε πολύ ξηρικά και αμμώδη εδάφη.

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους. Αν δεν βρέξει σε λίγες μέρες πρέπει να εφαρμόζεται τεχνητή βροχή ή ενσωμάτωση σε βάθος 2.5-5 εκατ. (βλέπε ανωτέρω κατά καλλιέργεια). Εφαρμογή 30-50 λίτρων ψεκαστικού υγρού στο στρέμμα. Το ψεκαστικό να λειτουργεί υπό συνεχή ανάδευση και πίεση που να μην ξεπερνά τις 3 atm (45 psi).

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού
ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αραιώστε τη δόση του σκευάσματος σε λίγο νερό σε ξεχωριστό δοχείο. Γεμίστε το ψεκαστικό κατά το 1/3 και προσθέστε τη προδιάλυση του φαρμάκου. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε και το υπόλοιπο νερό.

Φυτοτοξικότητα: Το προϊόν είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά. Το BRIMAN 45 SC όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις και οδηγίες εφαρμογής δεν παρουσιάζει προβλήματα φυτοτοξικότητας.