

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση εισπνοής, μετακινήστε τον ασθενή σε καθαρό περιβάλλον και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάποσης,** μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα εάν ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

•Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. •Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. •Μην το χρησιμοποιείτε σε εδάφη με υδροφόρο ορίζοντα μικρότερο των 10 μέτρων. •Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. •Σε περίπτωση ρύπανσης αρδευτικού νερού, να μη χρησιμοποιηθεί άμεσα για άρδευση. •Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. •Μην διπλοψεκάζετε τα όκρα των ζωνών. •Μην αυξάνετε τις δόσεις. •Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm (45 psi). •Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου ακούπας. •Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε συνιστάται. •Μετά τον ψεκασμό, πλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με απορρυπαντικά και ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



02/2009-7



Broadex®

48SL

Dicamba (Ντικάμπα) 48%
Πυκνό διάλυμα

Εγγυημένη σύνθεση: **Dicamba** 48% β/ο - άλλας διμεθυλαμίνης

Βοηθητικές ουσίες: 52,55% β/β

Αρ. Έγκρ.Κυκλ.οφ.: 7793/22.8.2006

Ημερ. Λήξης.: 31.12.2013

Ζιζανιοκτόνο αραβοσίτου εναντίον ηλατύφυλλων ζιζανίων

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559

Θεσσα/νικη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

ΜΠΡΟΑΝΤΕΣ:

Καταπολέμηση ηλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του αραβοσίτου. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Μεταφυτρωτικά με ψεκαστήρα υψηλού όγκου, μπεκ τύπου ακούπας και πίεση μικρότερη από 3 atm και ποσότητα ψεκαστικού υγρού 30-60 λίτρα το στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και απογεμίζουμε το δοχείο. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται 3 φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: Ετήσια ηλατύφυλλα ζιζάνια⁽¹⁾. Περιορίζει την ανάπτυξη των πολυετών ηλατύφυλλων ζιζανίων⁽²⁾. Δόση: **60 κ.εκ./στρέμμα**. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-60 λίτρα/στρέμμα. Καθοδικός ψεκασμός στο εδάφους μεταφυτρωτικά και πριν τα φυτά του αραβοσίτου ξεπεράσουν το στάδιο των έξι (6) φύλλων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

Παρατηρήσεις:

1) Ευαίσθητα ζιζάνια: Τραχύ βλήτο, Λουβουδιά, Αγριοτοματιά, Αντράκλα, Τάτουλας, Αγριοβαμβάκι, Αγριοεπιτζάνα.

2) Περιορίζει την ανάπτυξη των πολυετών ηλατύφυλλων: Περιπλοκάδα, Κίραιο, Λάπαθα. Τα αποτελέσματα στα πολυετή ζιζάνια είναι καλύτερα όταν αυτά έχουν αναπτύξει αρκετό φύλλωμα κατά την εφαρμογή. Κηλίδες των ζιζανίων αυτών μπορούν να καταπολεμηθούν με κατευθυνόμενο ψεκασμό (χωρίς να βρέχονται τα φυτά του αραβοσίτου) αφού τα φυτά του αραβοσίτου αποκτήσουν ύψος 40 εκ. και πριν βγάλουν "φρούντα" και εφόσον δεν υπάρχουν σε μικρή απόσταση ευαίσθητες ηλατύφυλλες καλλιέργειες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

40 ημέρες, εφόσον ο αραβόσιτος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ζωοτροφή (χωρίς νομή και ενσίρρωση).

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Οι καλλιέργειες των δικτυοκλήδων φυτών είναι ευαίσθητες, γι'αυτά πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του ψεκαστικού υγρού με βαμβάκι, σόγια, μηδική, κ.λπ., καθώς και με αμπέλια, οπωροφόρα και καλλιπωστικά.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δε συνδυάζεται με λάδι και υγρά λιπάσματα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό και δροσερό, με μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης 40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

Μέλος του

