

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.
- Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. **Σε περίπτωση εισπνοής,** μεταφέρατε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αν εμφανισθεί ερεθισμός, συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** ξεπλύνετε τις περιοχές του δέρματος, στις οποίες έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό, με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. Πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΝΥ ΠΛΗΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. ΠΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΚΑΙ ΑΦΗΞΕΤΕ ΜΙΑΝ ΑΠΕΚΑΣΤΗ ΖΩΝΗ 20 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΟΠΩΡΩΝΕΣ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ 10 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΕΞΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΘΑΝΤΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΑ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ, ΝΑ ΑΦΗΞΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΚΑΣΤΗ ΖΩΝΗ 5 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΠΑΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ Ο ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΕ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ Η/ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ Η ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΩΔΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΛΑ ΦΕΚΑΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



06/2015-2



Bulldock®

2,5SC

Beta-cyfluthrin (Μπέτα-κυφλουθρίν) 2,5%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα

Εγγυημένη σύνθεση: **Beta-cyfluthrin** 2,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 97,55% β/β
Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Θοφ.: 14328/03.06.2009

Μη διασυστηματικό πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου εναντίον μυζητικών και μασητικών εντόμων

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΕΦΓΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559

Θεσσα/νίκ: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

ΜΠΟΥΛΑΝΤΟ: Μη διασυστηματικό πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Το beta-cyfluthrin ανήκει στην ομάδα των πυρεθρινοειδών και δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στους διαλυτές ιόντων νατρίου στις προσαρμοστικές μεμβράνες των νεύρων κυττάρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλλιεργειών φυλλώματων. Επλ. δολιματίζοντες ψεκασμοί, ψεκασμοί φυλλώματων.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος ανάλογα των συνθηκών. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνδυάζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΟΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΙΑ: Καρποκόκο, Φυλλορράκτες (Νάρκες). Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκοχλήσεων, σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **ΑΧΛΑΔΙΑ:** Καρποκόκο, Φυλλορράκτες (Νάρκες), Ψύλλοι. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκοχλήσεων, σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **ΡΟΣΑΚΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΑ-ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΙΝΙΑ:** Ανάσκι, Καρποκόκο. Δόση: 50-70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Μεγάλη δόση: 70 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκοχλήσεων, σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **ΑΜΠΕΛΙ:** Ευθεμία, Τζιζάνια. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμοί καλλιεργειών, σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις, κατά την εκκοχήση των προνυμφών της 2ης και 3ης γενιάς της ενδελεστικής. **ΕΛΙΑ:** Δόση: 350 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Δολιματίζοντες ψεκασμοί από εδάφους με 300 κ.εκ. ανά εκκοχλήσιμο δένδρο σύμφωνα με τα πρόγραμματα δολιματισμού. Από την έναρξη της νέας του κυκλώ του ελαίου και σύμφωνα με τις οδηγίες των αγροτών στις παρυλές. Πυρηνολήπτης. α. Δόση: 15 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμοί καλλιεργειών εναντίον της ανδροβίας γενιάς λίγο πριν την πλήρη άνθηση και εφόσον υπάρχει μεγάλος πληθυσμός του εντόμου. β. Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εναντίον της καρποβίας γενιάς, αμέσως μετά την έναρξη της περιόδου ωρίμανσης. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων εφόσον υπάρχουν. **ΠΕΠΙΡΑ (υπαίθριος & θερμολογιστής):** Πράσινο ακούλη, Σπιντόπτερος, Βρίσας. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμοί καλλιεργειών με την έναρξη της προεργασίας και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη της. Για τα πεπιδόματα, ψεκασμοί κατά των εκκοχλήσιμων προνυμφών, σύμφωνα με τις οδηγίες στις φερονικές παγίδες. **ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (υπαίθριος & θερμολογιστής):** Δορυμνός, Πράσινο ακούλη. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμοί καλλιεργειών με την έναρξη της προεργασίας και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη της. Για τα πεπιδόματα, ψεκασμοί κατά των εκκοχλήσιμων προνυμφών, σύμφωνα με τις οδηγίες στις φερονικές παγίδες. **ΑΓΓΟΥΡΙ (υπαίθριος & θερμολογιστής):** Πράσινο ακούλη, Σπιντόπτερος, Αλεπούπτερος. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμοί καλλιεργειών με την έναρξη της προεργασίας και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη της. Για τα πεπιδόματα, ψεκασμοί κατά των εκκοχλήσιμων προνυμφών, σύμφωνα με τις οδηγίες στις φερονικές παγίδες. **ΚΟΨΗΝΙΟΙ-ΜΠΡΟΚΟΛΙ:** Περίοδος. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασμοί καλλιεργειών με την έναρξη της προεργασίας και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη της. **ΠΑΤΑΤΑ:** Δορυμνός. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί καλλιεργειών με την έναρξη της προεργασίας και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη της. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Πράσινο ακούλη, Ρόδινο ακούλη. Δόση: 70 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί καλλιεργειών κατά των εκκοχλήσιμων προνυμφών, σύμφωνα με τις οδηγίες στις φερονικές παγίδες και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη της προεργασίας. **ΜΗΛΙΚΗ:** Αβίδες, Ακατομύες, Τρίτοτα, Colaspidae στρίφ, Αρίον τριτότα, Βρίσας. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί καλλιεργειών με την έναρξη της προεργασίας. **ΖΑΧΑΡΩΔΕΥΤΑ:** Σπιντόπτερος, Αβίδες. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί καλλιεργειών με την έναρξη της προεργασίας και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη της.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Μήλια (80-150), Αχλάδια-Ροδάκια-Νεκταρίνια-Βερκοκία-Δορυμνός (80-140), Αμπέλι (100), Επλ. δολιματίζοντες ψεκασμοί (3, 500 κ.εκ./έκ. δένδρο & συνολικά 10 δένδρα/στρ.), Επλ.-Ψεκασμοί καλλιεργειών (80-150), Πιπερά-Μελιτζάνα-Κουνουμπιό- Μπρόκολο (50-100), Αγγούρι (50-150), Πατάτα (50-80), Βαμβάκι (50-70), Μελιχ-Ζαχαρούστα (50-60).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος - Μεσοδιάστημα ψεκασμών: Μήλια-Αχλάδια-Ροδάκια-Νεκταρίνια-Βερκοκία-Δορυμνός-Αμπέλι-Επλ. δολιματίζοντες ψεκασμοί-Επλ. (Ψεκασμοί καλλιέργειας-Πιπερά-Μελιτζάνα-Αγγούρι-Κουνουμπιό-Μπρόκολο-Πατάτα-Βαμβάκι-Ζαχαρούστα (2, 14 ημέρες, εφόσον απαιτείται), Μελιχ (1).

Παρατηρήσεις:

Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αγροποδών/φυτών στα οποία έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **Bulldock®**.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

• Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών βιολογικών μεθόδων, ώστε να περιοριστεί ο πληθυσμός των εντόμων και να μειωθεί ο αριθμός των εφαρμογών στις οποίες απαιτείται να αποτελεσματικό. • Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο. • Δόση το μέγιστο επιτρεπόμενο δόση. • Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. • Να αποφεύγονται οι διαδικασίες εφαρμογών με **Bulldock®**. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε ενυδατωμένο ή εντομοκτόνο από άλλη ουσία με διαφορετικό τρόπο δράσης. • Να διεγερθεί αυστηρά η επιλογή των πληθυσμών των εντόμων/στόχων με τη χρήση μεθόδων αντιμεταβολισμού, όπως ώστε να ενισχυθεί η γενετική ενδογενής ανθεκτικότητας. • Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας που ακολουθούν το πρόγραμμα, να εφαρμόζεται διαφορετικό σκεύασμα. • Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.

Τελειότητα ενέσιμου πριν τη συγκομιδή:

Βαμβάκι: 21 ημέρες. Αμπέλι: 14 ημέρες.

Επλ. δολιματίζοντες ψεκασμοί: 14 ημέρες. Ψεκασμοί καλλιεργειών: 56 ημέρες.

Μήλια-Αχλάδια-Ροδάκια-Νεκταρίνια-Βερκοκία-Δορυμνός-Κουνουμπιό-Μπρόκολο-Ζαχαρούστα: 7 ημέρες.

Πιπερά-Μελιτζάνα-Αγγούρι-Πατάτα-Μελιχ: 3 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συστάσεις χρήσης, δόσεις και οδηγίες εφαρμογών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Το νέο δοχείο σκευάσματος ξεπλύνεται από νερό ή γίνεται τριπλή ξέπλυση με νερό. Το νερό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία, να αποστραγγιστεί και να απορριφθεί. Να καθαριστεί το δοχείο με τριπλή ξέπλυση για τη διασφάλιση της μη επανάληψης ελαφρών, να αποστραγγιστεί και να απορριφθεί. Να καθαριστεί το δοχείο με τριπλή ξέπλυση για δύο (2) χρόνια από την αναγνώριση της μισομηνιαίας παρασκευής του.

ΑΡ. ΠΑΡΙΣΤΑΣΕΩΣ / ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Επλ. επί της συσκευασίας.

Μέλος του

