

ΜΠΑΜΠΕΡ:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των τρια-
ζολικών μυκητοκτόνων, της κατηγορίας των DMIs,
με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Δρα
παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερό-
λης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με
νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα
προϊόντος αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε στη συ-
νέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή
ανάδευση.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟ- ΓΗΣ:

ΣΙΤΑΡΙ: Ωίδιο, Σκωρίαση, Σεπτορίαση. Δόση: **50 κ.εκ./στρ.** με 20-100 λίτρα ψεκ.υγρού/στρ.
Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των
πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών. **ΣΙΚΑΛΗ:**
Ωίδιο, Σκωρίαση, Ρυχχοσπορίωση. Δόση: **50 κ.εκ./**
στρ. με 20-100 λίτρα ψεκ.υγρού/στρ. Ψεκασμός
φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων
συμπτωμάτων των ασθενειών. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ**
(Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερυκοκιά): Φαλά σήψη.
Δόση: **20-30 κ.εκ./100 λίτρα νερό** με 100-150
λίτρα ψεκ.υγρού/στρ. Εφαρμογές από το στάδιο
της ρόδινης κορυφής έως την πτώση των πετάλων
και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της
ασθένειας. **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ:** Ωίδιο. Δόση: **10-15**
κ.εκ./100 λίτρα νερό με 100 λίτρα ψεκ.υγρού/στρ.
Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων
συμπτωμάτων της ασθένειας.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καθιερωγμένη περίοδο - Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Σιτάρι-Σικάλη (2 / 10-21 ημέρες)
Πυρηνόκαρπα (3 / 10-21 ημέρες)
Τριανταφυλλιά (6 / 7-14 ημέρες).

Παρατηρήσεις:

1) Να ακολουθούνται οι οδηγίες των γεωργικών
προειδοποιήσεων, στις περιοχές όπου
εφαρμόζονται.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Ροδακινιά, Βερυκοκιά, Νεκταρινιά: **14 ημέρες.**
Σιτάρι, Σικάλη: **30 ημέρες.**

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρη-
σιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και
τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλ-
θιέργειες και στις ελληνικές κλιματολογικές
συνθήκες. Στην τριανταφυλλιά δεν πρέπει να
εφαρμόζεται σε υγρή φύλλοι καθώς και σε θερμές
ώρες της ημέρας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

• Εφαρμόστε το **Bumper® 25EC** προληπτικά στα
πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και
αποφύγετε θεραπευτικές εφαρμογές. • Εφαρμόστε
το **Bumper® 25EC** σε προγράμματα ψεκασμών, σε
εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με
διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs, με τα
οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικό-
τητα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό
πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο
ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού κατα-
στραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποθε-
θούν όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή
ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία,
σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε
αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2)
χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία πα-
ρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.

Bumper®

25EC

Propiconazole (Προπικοναζόλη) 25%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό

Εγγυημένη σύνθεση: **Propiconazole** 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 73% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλ.οφ.: 60256/24.06.2009
Ημ.Λήξης: 31.05.2014

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Μέλος του



Κάτοχος της έγκρισης-Υπευθύνος για
την τελική συσκευασία και σήμανση-
Συσκευαστής-Διανομέας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73,
15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσα/νικη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάννα
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά
και ζωοτροφές.
• Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην
πίνετε και μην καπνίζετε.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως
ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο
ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια
ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και
ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα
πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και
σαπούνι.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΨΕΚΑΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 250 κ.εκ.

