

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
- Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα.
- Να φοράτε κατάλληλα γάντια.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- „Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης“.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως και επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά τουλάχιστον, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα και συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύντε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. Καλέστε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείται θεραπεία συμπτωματική.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενων με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Το προϊόν εξουδετερώνεται με κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες για αγροχημικά. Και για τα δύο να ακολουθούνται πάντα οι υπάρχοντες εθνικοί κανονισμοί και η καλύτερη διαθέσιμη πρακτική.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού υγρού μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα του σκευάσματος. Ξεπλύντε τα άδεια δοχεία του φαρμάκου με άφθονο νερό και ρίξτε τα υπολείμματα στο ψεκαστικό υγρό. Συμπληρώστε το υπόλοιπο απαιτούμενο νερό ανακατεύοντας. Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να είναι υπό συνεχή ανάδευση κατά τη διάρκεια του ψεκασμού. Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό νερό για τον ψεκασμό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Φασόλια, Μπιζέλια (Αρακάς): 49 ημέρες. Ρύζι: 56 ημέρες.



Basagran® 48 SL

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Bentazone (μπενταζόν)

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση:

Bentazone 48% β/ο

(ως άλας νατρίου του bentazone 49,8% β/ο),

Βοηθητικές ουσίες 56,4% β/β.

Εκλεκτικό, μη διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων και κυπεροειδών στα φασόλια, μπιζέλια (αρακάς), ρύζι και γκαζόν.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 7223 / 7.11.2006

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: **1** λίτρο

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449,
15343 Αγία Παρασκευή, τηλ.: 210 6860130,
www.basf-agro.gr

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Συστήνονται ψεκασμοί καλύψεως στις εξής καλλιέργειες:

Φασόλια, Μπιζέλια (Αρακάς): Μία εφαρμογή από το δεύτερο πραγματικό φύλλο μέχρι και το πέμπτο πραγματικό φύλλο της καλλιέργειας.

Ρύζι: Μία εφαρμογή από το δεύτερο φύλλο μέχρι και το τέλος του αδελφώματος του ρυζιού. Πριν την εφαρμογή χαμηλώνουμε την στάθμη του νερού στα τηγάνια, έτσι ώστε τα ζιζάνια να είναι εκτεθειμένα στο ψεκαστικό διάλυμα. Διατηρούμε την στάθμη χαμηλά για δύο ημέρες μετά την εφαρμογή. Για καλύτερα αποτελέσματα τα ζιζάνια να βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης, τριών έως πέντε φύλλων.

Γκαζόν: Σε νέα φυτεία, μία εφαρμογή από το δεύτερο φύλλο μέχρι και το πέμπτο φύλλο της καλλιέργειας. Σε εγκατεστημένη φυτεία, μία εφαρμογή σε οποιοδήποτε στάδιο της καλλιέργειας.

Ευαίσθητα ζιζάνια:

- Οικογένεια Cyperaceae: Κίτρινη Κύπερη, Μοσχοκύπερη, Σκίρπος.
- Πλάτυφυλλα: Πεντάνευρο, Άγριο σινάπι, Βούτομο, Αγριομελιτζάνα, Τάτουλα, Σπερνούλα, Ροπανίδα, Αγριομπιμπάκια, Αντράκλα, Αναγαλλίδα, Ζωχός, Ρανούγκουλος, Λινδέρνια.

Μέτρια Ευαίσθητα ζιζάνια:

- Πλάτυφυλλα: Βλήττα, Ιπομαία, Παπαρούνα, Δωδεκάνθι, Πολυκόμψι.

Δόσεις: 250 – 300 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα, ανάλογα με το είδος και το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων. Η μεγαλύτερη δόση αντιστοιχεί στα μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια ή σε μεγαλύτερο στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 – 40 λίτρα ανά στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Για να δράσει το ζιζανιοκτόνο δεν πρέπει να βρέξει ή να ποτίσουμε με τεχνητή βροχή για 5 – 6 ώρες μετά την εφαρμογή. Καλό είναι να έχει γίνει πότισμα 2 – 3 μέρες πριν την εφαρμογή.
- Μην ψεκάσετε όταν οι καλλιέργειες είναι αδύνατες ή ταλαιπωρημένες από παγωνιές, ξηρασία, χαλαζή ή ασθένειες και έντομα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

- Κάτω από ακραίες συνθήκες μπορεί να παρατηρηθούν νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα των ψυχανθών χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στις καλλιέργειες.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείται σε ήδη δοκιμασμένες ποικιλίες φασολιών, διαφορετικά να γίνεται πρώτα δοκιμή σε μικρή έκταση.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



4 014348 666282

* Σήμα κατατεθέν BASF

81081097 GR 1103