



basta[®]

15 SL

5 Λίτρα ε

Υδατικό διάλυμα (SL)

Εγγ. σύνθεση: glufosinate - ammonium 15% β/ο
Βοηθ. ουσίες: 85,77% β/β

Zīčanvioktōvo

ΦΥΛΑΞΕΤΟ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- Βλαβερό στα εισιτήρια, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης.
- Κινδύνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να εξαθενίσει τη γονιμότητα.
- Πιθανός κινδύνος δύσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Y.A.A.T.:
7583/26.07.1999



Κάτοχος της έγκρισης,
υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE

R 02 0948 11

ΜΠΑΣΤΑ 15 SL

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστώδων ζιζανίων. Δρα υπελεκτικό, διατήρησης στα πράσινα μέρη των φυτών.

ΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΖΚΕΥΓΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

• Άμπελοι: Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου. Επήρια ζιζανία (αγρωστώδη & πλατύφυλλα): 553-667 κ.εκ. σκ./στρέμμα⁴. Πολυετή ζιζανία (αγρωστώδη & πλατύφυλλα): 667-750 κ.εκ. σκ/στρέμμα⁴. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρέμμα.

• Δενδρόδεις καλλιέργειες⁵ (Μηλιά, Αχλαδί, Ροδοκνήδι, Νεκταρινίδι, Βερικοκιά, Δαμασκηνίδι, Ελιά, Λεβονίδι, Πορτοκαλί, Μανταρινί, Γκρέιπ-Φρουτ, Κρήτη): Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου. Επήρια ζιζανία (αγρωστώδη & πλατύφυλλα): 553-667 κ.εκ./στρέμμα⁵, 667-750 κ.εκ. σκ/στρέμμα⁵. Πολυετή ζιζανία (αγρωστώδη & πλατύφυλλα): 667 κ.εκ. σκ/στρέμμα⁵. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρέμμα.

• Επίπεδες γραμμικές καλλιέργειες: βαμβάκι, ζαχαρότευτλα, αράβιστος, καπνός, ανθοκόμικα φυτά της βλαστικής περιόδου των ζιζανίων. Βιομεταρρυτικά φυτά: βιομεταρρυτικά αρτούρια, αυτιές, κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου των ζιζανίων.

Επήρια ζιζανία (αγρωστώδη & πλατύφυλλα): 553-667 κ.εκ. σκ/στρέμμα⁴, 667-750 κ.εκ. σκ/στρέμμα⁵. Πολυετή ζιζανία (αγρωστώδη & πλατύφυλλα): 667 κ.εκ. σκ/στρέμμα⁴, 667-1000 κ.εκ. σκ/στρέμμα⁵. Πολυετή ζιζανία (αγρωστώδη & πλατύφυλλα): 667 κ.εκ. σκ/στρέμμα⁵, 1334-2000 κ.εκ. σκ/στρέμμα⁵. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρέμμα.

• Μη γεωργικές επάντασης⁶: Ογκός ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρέμμα.

Επήρια ζιζανία (αγρωστώδη & πλατύφυλλα): 553-667 κ.εκ. σκ/στρέμμα⁴, 667-750 κ.εκ. σκ/στρέμμα⁵. Πολυετή ζιζανία (αγρωστώδη & πλατύφυλλα): 667 κ.εκ. σκ/στρέμμα⁴, 667-1000 κ.εκ. σκ/στρέμμα⁵. Πολυετή ζιζανία (αγρωστώδη & πλατύφυλλα): 667 κ.εκ. σκ/στρέμμα⁵, 1334-2000 κ.εκ. σκ/στρέμμα⁵. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρέμμα.

• Παραπτήρες:

1. Από το ή το ζο ή τη ηλικία τους, Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην προφύλαξη των φύλλων των καλλιέργειών των πράσινων βλαστών από τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού.

2. Γηπέδει, πεζοδρόμια, αστροδρόμικες γραμμές, άκρες δρόμων και κατά μήκος αρδευτικών ή στραγγαλικών καναλιών.

3. Η στορά δεν πρέπει να γίνεται πριν περάσουν 15 ημέρες από τον ψεκασμό.

4. Οι μεγάλες δόσεις χρησιμοποιούνται ως τατά μεγάλα πλατύμελα ζιζανία κατά αγρωστώδη.

5. Για τα ζιζανία Bromus spp. (βρώμιο), Hordeum murinum (αγριοκρίθιο), Roridula (κοινή πώλη), Datura stramonium (τάπουνο), Portulaca oleracea (αντράκια), Solanum nigrum (στρύφνος), Convolvulus canescens (κόκκινο) και Urtica urens (ποικιλίδιο μικρού).

6. Το Ranunculus spp. (ρανούνκυλος) είναι ανθεκτικό σε απέτες δόσεως.

7. Η μεγάλη δόση καταπολέμα τα ζιζανία Cirsium arvense (κύριο), Lolium perenne (ποιαστής πορ), Convolvulus arvensis (πετρόλοκάδα), Rubus spp. (βατό).

8. Για τα ζιζανία Cyperus dactylon (αγριόδερ), Cyperus spp. (κύπερο), Carex spp. (ενθέρω), Pteridium aquilinum (φτερό), Equisetum arvense (φλονγουρά), Urtica dioica (ποιαστής ποιασκιδιά). Για την κώτερη που παρουσιάζει αναβλάστηση μετά από κοπή τη ζιζανικότα του συνιστάται η επανάληψη του ψεκασμού στη δόση των 1000 κ.εκ./στρέμμα, μετά περίπου 50 ημέρες.

9. Για το Imperata cylindrica (δεματόχορτο): η δόση των 2000 κ.εκ. χρειάζεται μη αρδεύειμενα εδάφη.

10. Για το Phragmites spp. (νεροκάλαμο): η αρχή της άνθησης θεωρείται το πιο ευαίσθητο στάδιο για το ζιζανίο. Η δόση των 2000 κ.εκ. αρρώστη μη αρδεύειμενα εδάφη.

• Υψηλές θερισματικές και ηλιοφάνεια επηρέαζουν θετικά την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.

• Για καλύτερη αποτελέσματα πρέπει να μην βρέξει πριν περάσουν 6 ώρες από τον ψεκασμό.

• Το Basta 15 SL δεν επηρέαζε στα ζιζανικά φυτών που ρευματίζουν μετά την εφαρμογή του.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Για το αυτέλη και τα δενδρώδεις καλλιέργειες, καβύς και για τη μεταφρωτική εφαρμογή για τις επιθέσεις καλλιέργειας αυτηρά κατεύθυνσης ψεκασμός ώπετε ματινέρχεται σε επαφή με τα πράσινα μέρη της καλλιέργειας με 50-80 λίτρα ψεκαστικού υγρού το στρέμμα ανάλογα με τον όγκο της βλάστησης των ζιζανίων. Πίεση όχι μεγαλύτερη από 2 atm. (30 Psi) και μετεκτύπωση ακύρωτης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΖΚΕΥΓΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Συμπληρώνεται το ψεκαστικό τουλάχιστον με τα 3/4 της απαιτούμενης ποσότητας νερού. Προσθέτεται την απαιτούμενη ποσότητα του οκεύσματος αναδεινόντας το ψεκαστικό υγρό. Συμπληρώνεται το υπόλοιπο νερό συνέχη αναδεύοντας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αρπέλη: 14 ημέρες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Ψεκαστικά σταγονίδια μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα αργαλακιανά φυτά που αποτελούνται από μερικά μέρη που δεν έχουν αναπτύξει την ιδιότητα της παραπέρα σύσκεψης. Οδηγείται στην άριστη συμβολή της ψεκαστικού υγρού και στη συνέχεια της μετεπέμπτησης της σύσκεψης με την παραπέρα σύσκεψη. Επιστρέφεται στο ψεκαστικό υγρό, εντοπίζεται στα απολεπτά σταγονίδια της παραπέρα σύσκεψης και αποτελείται από μερικά μέρη που δεν έχουν αναπτύξει την ιδιότητα της παραπέρα σύσκεψης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΖΚΕΥΓΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Στην αρχή του κλειστή συσκευασία, σε μέρη: Έπριση και σε περίπτωση παραπέρα σύσκεψης, επιστρέφεται στο ψεκαστικό υγρό.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Στην αρχή του κλειστή συσκευασία, σε μέρη: Έπριση και σε περίπτωση παραπέρα σύσκεψης, επιστρέφεται στο ψεκαστικό υγρό.

Απορρύπτηση την έκθεση: εφοδιάστεται με την ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Πλένετε την έκθεση με την πάρα ποσότητα νερού που προσδιορίζεται στην ετικέτα.

Ημερ. Παρασκευής - Ημερ. Λήξης - Αρ. Παρτίδας: Βλέπε άνω μέρας φάλτη.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΙΣΣΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδιώμαντα και μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το κλειδιώμαντα και ποτά και ωραφρούς. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή πάντες.

• Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδύμαση και γάντια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πάλνετε τα μάτια με αφρόνο νερό και ζητήστε ιατρική συμβούλη.

• Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατηρείται με αφρόνο νερό και ζητήστε ιατρική συμβούλη.

• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πάλνετε τα πούλια καλά με αφρόνο νερό και ζητήστε ιατρική συμβούλη. • Σε περίπτωση κατέστασης καλέστε αιτίους γιατρό. Προκαλέστε ειστρέψαντας ο πεθανόντας έξι ποσά σιρουπούς της ειδικής οδηγίες πριν από τη χρήση.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - Αντίδοτο: Πρώτες βοήθειες: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από στούρημα: Σε περίπτωση σπήλαιος ή αν αισθανθείται δύσπνοια, ζητήστε αιτίους ιατρική συμβούλη με αφρόνο νερό και πλυσθείτε αιμάτων με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ζητήστε τα πούλια καλά με αφρόνο νερό και ζητήστε ιατρική συμβούλη. Σε περίπτωση κατέστασης καλέστε αιτίους γιατρό. Σινηματίστε μετά την πάροια της πρωτηνίας της πρωτηνίας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΚΕΥΓΑΣΜΑΤΟΣ: τρέμουλο, διαταραχή της συνείδησης, κραυγές μετά την πάροια της πρωτηνίας.

Σύντηρεται: Βασική βοήθεια, απομόνωση, θεραπεία ποταμών, χορήγηση ενεργού ανθρακού (carbo medicinalis) και θευρικού νατριού. Εάν χρειοστεί 10mg diazepam, αργά, ενδοφλεβικά. Τηλ. Κέντρο Δημητριάδας: 210 7793 777.

Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 14 ημέρες.

Bayer CropScience

Διανομέας:
Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100



R 02 0948 11



5200309801949