

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Μην τρώτε, μην πίνετε ή μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. •Φοράτε ολόσωμη φόρμα, μπότες και γάντια. •Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. •Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος. •Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. •Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

"Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης".

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα και συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



BASF
The Chemical Company

Brio® 75 EC

Φενπροπimorph (φενπροπιμόρφ)
Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Fenproprymorph 75% β/ο
(χημική ομάδα: μορφολίνες)
Βοηθητικές ουσίες 14,2% β/β
Διαλύτης: Cyclohexanone

Xn



**ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
N**



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο
με προστατευτική και
θεραπευτική δράση**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

- Ερεθίζει το δέρμα.
- Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκ. Κυκλοφορίας: 6522/3-12-1990

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: **1** λίτρο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF SE, Γερμανία
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή.
Τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr ©Σήμα κατατεθέν της BASF

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΔΟΣΕΙΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμόζεται με ψεκασμούς φυλλώματος.

Ζαχαρότευλα – Κερκοσπορίαση (*Cercospora beticola*). Δόση 100-150 κ.εκ./στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Το πρόγραμμα και η συχνότητα των ψεκασμών καθορίζονται από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος Αριθμός εφαρμογών: 3

Σιτάρι - Ωίδιο (*Erysiphe graminis*), Καστανή σκωρίωση (*Puccinia recondita*), Μαύρη σκωρίωση (*Puccinia graminis*). Δόση 100 κ.εκ./στρέμμα. Συνιστώνται 2 ψεκασμοί κατά το τέλος του αδελφώματος και με την εμφάνιση του στάχους και εφόσον εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα των ασθενειών. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-60 λίτρα/στρέμμα.

Κριθάρι - Ωίδιο (*Erysiphe graminis*), Καστανή σκωρίωση (*Puccinia spp.*). Δόση 100 κ.εκ./στρέμμα. Συνιστώνται 2 ψεκασμοί κατά το τέλος του αδελφώματος και με την εμφάνιση του στάχους και εφόσον εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα των ασθενειών. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-60 λίτρα/στρέμμα.

Παρατηρήσεις: Για λόγους αποφυγής ανθεκτικότητας, συνιστάται η εφαρμογή του να γίνεται σε μίγμα με μη διασυστηματικό, προστατευτικό μυκητοκτόνο.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Η κατάλληλη δόση του σκευάσματος προστίθεται σε επαρκή ποσότητα νερού, ανακατεύεται καλά και συμπληρώνεται με το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Ζαχαρότευλα, 7 ημέρες – Σιτάρι, Κριθάρι, 35 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργειες και δόσεις για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Στα σιτάρια δεν πρέπει να εφαρμόζεται μαζί με ορμονικό ζιζανιοκτόνο.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα υλικά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσταθίζονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.