

10WG
Caddy

Caddy
10WG

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζετε το 1/3 του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό, προσθέστε την καταλληλή δόση ή τον υδατοδιαλυτό σάκκο στο νερό, ανακατέψτε καλά και γεμίστε το ψεκαστικό με νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Μηλιά: Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis*). **Δόση:** 10-15 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Μέγιστη δόση ανά στρέμμα:** 30 γρ. σκευάσματος. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-200 λίτρα / στρέμμα. Από το στάδιο της πράσινης κορυφής και εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Στις περιοχές που εφαρμόζεται σύστημα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι σχετικές συστάσεις των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών.

Μεσοδιάστημα εφαρμογών/επεμβάσεων:- . **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4.

Ροδακινιά: Φαιά σήψη (*Sclerotinia laxa*). **Δόση:** 10-15 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Μέγιστη δόση ανά στρέμμα:** 37,5 γρ. σκευάσματος. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150-250 λίτρα / στρέμμα. Στην έκπτυξη των οφθαλμών, στη ροδίνη κορυφή και στην πλήρη άνθηση. **Μεσοδιάστημα εφαρμογών/επεμβάσεων:-** . **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

Αμπέλι: Ωίδιο (*Uncinula necator*). **Δόση:** 10-15 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Μέγιστη δόση ανά στρέμμα:** 22,5 γρ. σκευάσματος. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-150 λίτρα / στρέμμα. **Εφαρμογές:** • Όταν οι βλαστοί αποκτήσουν 3-4 φύλλα. • Άνθηση. • Λίγο μετά το δέσιμο των ραγών. **Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:-** . **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4.

Σπαράγγι: Σκωρίαση (*Puccinia asparagi*). **Δόση:** 20-30 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. **Μέγιστη δόση ανά στρέμμα:** 30 γρ. σκευάσματος. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 15 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 6.

Παρατηρήσεις: Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μηλιά, Σπαράγγι: 90 ημέρες. Ροδακινιά: 21 ημέρες. Αμπέλι: 28 ημέρες.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

ΑΘΗΝΑ: ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ ΘΕΣΗ ΠΗΛΙΧΟ, Τ.Θ. 92, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.
ΤΗΛ: 210 5578777, FAX:210 5578768
ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ: ΒΙΛΠΕΘ ΣΙΝΘΟΣ, ΤΚ: 57022, Τηλ.: 2310 795 705
ΛΑΡΙΣΑ: ΤΗΛ: 2410 627432



Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. 210 6166 000 Fax: 210 6109100

Caddy
10WG

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Πα διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας: • Οι επεμβάσεις με το σκεύασμα, πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτή. • Χρήση μόνο της εγκεκριμένης δοσολογίας. • Όρθη εφαρμογή ψεκασμών.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: - . **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και υπό τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό σε θερμοκρασία μικρότερη των 40°C (μέση ετήσια θερμοκρασία 25°C). Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Ημερ. Παρασκευής-Ημερ. Λήξης-Αριθ. παρτίδας: Βλέπε συσκευασία.

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

S 01 1509 12



Caddy
10WG

Καθ. Βάρος 150γρ. e

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγ. Σύνθεσης: Δραστική ουσία: cyproconazole 10,64% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 89,36% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
6597/09-03-1994

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

• Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ABEE

Caddy
10WG

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Πρώτες βοήθειες: • Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρυνθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε το παθόντα ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως γιατρό. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι, με polyethyleneglycol 400 - εάν είναι διαθέσιμο και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, επιπλέον και κάτω από τα βλέφαρα. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής - εάν υπάρχουν - μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα των ματιών. Εάν αναπνυχθεί/παραμείνει ο ερεθισμός συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. • Σε περίπτωση κατάποσης: Προκαλέστε εμετό μόνο εάν: 1. Ο ασθενής έχει πλήρως τις αισθήσεις του. 2. Ιατρική βοήθεια δεν είναι άμεσα διαθέσιμη. 3. Έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα - μεγαλύτερη από μία μπουκιά. 4. Ο χρόνος από την κατάποση είναι λιγότερος από μία (1) ώρα (ο εμετός δεν πρέπει να περάσει από την αναπνευστική οδό). **Πληροφορίες για το γιατρό:** Συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση κατάποσης, πλύση στομάχου συστήνεται στις περιπτώσεις όπου έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα μόνο εντός δύο (2) ωρών από την κατάποση. Συστήνεται χορήγηση ενεργού άνθρακα και sodium sulfate. Συμπτώματα δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστούν μερικές ώρες αργότερα. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 2107793777.