

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε • Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια • Να φοράτε κατάλληλα γάντια • Το υλικό και οι περιέκτες του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικινδύνους απόβλητα • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεκτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό και σαπούνι.
• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
• Σε περίπτωση κατάποσης, χορηγήστε επανειλημμένως ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού. Προσοχή μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και μην του προκαλέσετε εμετό σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του.
• Σε περίπτωση υποψίας για δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό.
Αντιδοτό: Δεν υπάρχει αντιδοτό. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Περιέχει S-metolachlor μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσεως.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συνδυαστικότητα: -----

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα: Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλό αερίζόμενο και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Φάσμα δράσης: Αραβοσίτος: Για Ευαίσθητα ζιζάνια & Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια, 200-280 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-40 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: α) Προφυτωρικά ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια, β) Νωρίς μεταφυτωτικά, στάδιο καλλιέργειας 2-3 φύλλα και τα ζιζάνια μόλις έχουν εμφανιστεί (αγρωστώδη μέχρι τα 2 φύλλα και πλατύφυλλα μέχρι τα 4 φύλλα).

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε φιάλη
Ημ/νία Παραγωγής: Βλέπε φιάλη



L168895 GREC/10Q - PPE 4017434



BRAND NAME
LOGO/MARKING
L168895 GREC/10Q - PPE 4017434

Camix®

560 SE

syngenta®

Mesotrione + S-metolachlor
(μεζοτρίον) + (S-μετολαχλώρ)

Εναιώρημα - γαλάκτωμα (SE)

Αρ. Εγκρ. κυκλ. Υπ. Αγροτ. Ανάπτ. και τροφίμων:
7909/23-12-2008

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Mesotrione: 6% β/ο +
S-metolachlor: 50% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 44,02% β/β

**Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για
την καταπολέμηση επίσης
αγρωστωδών και πλατύφυλλων
ζιζανίων στον αραβόσιτο.**

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.,
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Chemark, Ουγγαρία
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: **κελαιοφορμι**

ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, 151 23 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6800900-9
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τοκ. Θυρίδα 203, ΒΙ.Π.Ε.Θ.,
57 022 ΣΙΝΔΟΣ, Τηλ.: 231 0797907

ΕΠΙΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδας Φωκίδας 353 00 Τηλ.: 2238 022 008

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lt e



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Παρά το τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενων με τρίπηγμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Αποτέφρωση σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Η αποτέφρωση πρέπει να λαμβάνει χώρα σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις σε θερμοκρασία ανώτερη των 1200 ° C όπου ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στην υψικόμινο θα πρέπει να είναι 2 δευτερόλεπτα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών καλλιεργ. περιόδου: **3**

Ευαίσθητα ζιζάνια: Μουχρίτσες, Αμυγδαλιά, Αμυγδαλιά, Βήνη, Λουβουδιά, Πράσινη σελήνη, Αγριοπινέρια, Τατούλας, Αγριομυρτιά, Αγριομαμακά.

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Κίτρινη κύπερη.

Παρατηρήσεις: 1) Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαρεία εδάφη. 2) Στον αραβόσιτο δεν επιτρέπεται η χρήση για χλωρά ζωοτροφή αν δεν περάσουν 60 ημέρες από την εφαρμογή. 3) Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλαμπόκι που προορίζεται για την παραγωγή σπόρου. 4) Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξαναπαρεί μόνο αραβόσιτος την ίδια καλλιέργεια την περίοδο. 5) Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί το φθινόπωρο (5 μήνες μετά την εφαρμογή) να σπαρούν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι και σίκαλη) και χειμερινή ελαιοκράμβη και την επόμενη άνοιξη (12 μήνες μετά την εφαρμογή) ηλιάνθος και βαμβάκι αφού προηγηθεί βαθιά άροση. 6) Να μην σπαρούν τα χαλαρότευτα, πατζάρι, σπανάκι, αρακάς, φασόλι και σόγια πριν περάσουν 24 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

Τρόπος δράσης: Το mesotrione παρεμποδίζει την βιοσύνθεση της ηλιαστοκινόνης με δράση στο ένζυμο 4-HPPD με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των καροτινοειδών. Το S-metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιμο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: -----

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση και ψεκαστικό υγρό 30-40 λίτρα ανά στρέμμα. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, το ψεκαστικό υγρό να αναδεύεται συνεχώς.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

750ml

approx. measure

500ml

250ml