

L159160 GREC/7P



Chorus®
50 WG

syngenta®

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρούνται κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
- Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεχτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση εστιασμού, αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση εστιασμού, μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.

Σε περίπτωση επαφής με τα όπλα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλύνετε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμένει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείται.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΗΣΕΩΝ: 210 7793777

Product names marked ® or ™: The ALLEGRIE® Family
the SYNGENTA Logo and the SYNGENTA Logo
are Trademarks of a Syngenta Group Company

300 gr e

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μισή αέσκαση ζώνη προστασίας 50 μέτρων για όλες τις καλλιέργειες.
«Περιέχει cyprodinil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.»

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος δράσης:

Το cyprodinil παρουσιάζει αποθηλαστική και διεσπομιστική δράση.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και βάζουμε σε λειτουργία τον ανασπύστη. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο, ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξασθενήσουν πλήρως ο σπρώς και όλα τα ίκνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εντοπισθέντα σε σημεία ευπαθούς, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκευάσμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, όμοιο και κατά περιζώο με μικρά από όμοια πιθανά ακυρώματα.

Τελειότητα επέμβασης πριν τη συγκομιδή:

Μήλοειδη (Μήλο, Αχλάδι, Κιούδι): 21 ημέρες.
Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινο, Βερύκοκο, Νεκταρίνι, Κεράσι, Δαμάσκηνα: 7 ημέρες.

L159160 GREC/7P



Chorus®
50 WG

syngenta®

Cyprodinil 50% (αυτοαντινιψή)
(χημική ομάδα ανιθινονιπιδίνες)
**Εναιωρηματοποίησημοι
κόκκοι (WG)**

Αρ. Ορίστ. Έργο: Κιού. Υπ. Αγρ. Ανάπ. & Τροφ.: 60319/24-4-2012

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Cyprodinil 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες 49.5% β/β

**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο
με προληπτική και θεραπευτική
δράση, για την καταπολέμηση
του φυοζικλάδου των
μηλοειδών, της φαίδας σπίνης
στη ροδάκινα, νεκταρίνια,
βερίκοκα, κερασιά και
δαμάσκηνα.**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Προσρίζεται μόνο για επαγγελματίες
χρήστες

ΠΑΡΑΚΕΧΕΙΛΑΤΕ: Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία
ΚΑΤΑΧΩΡ. ΕΠΙΧΡΕΩ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Αθήνα, Αττικής, Τηλ.: 210 666612-13
www.syngenta.gr
BEE/AN-B/E-E & E/AN-B: 231 0796940-3
ΣΥΝΕΚΕΛΑΤΕ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ομόρφου Βουλιαχ, Τηλ.: 2262 051600



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

• Πολύ τοξικό για
τους υδρόβιους
οργανισμούς
μπορεί να
προκαλέσει
μακροχρόνιες
διαμενείς
επιπτώσεις
στο υδάτινο
περιβάλλον.

TM

Φάσμα δράσης:
Μήλοειδη (Μήλο, Αχλάδι, Κιούδι):
Για φυοζικλάδο (*Venturia inaequalis*, *Venturia pyrena*)
75 γρ./στρέμμα (μπαλ) ή 30-50 γρ./100 πτ. ψεκ.
υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.
Εφαρμογές από την πράσινη κορυφή μέχρι την
πτώση των πετάλων. Ψεκασμός φυλλώματος με
προληπτικές, εφαρμογές και θεραπευτικές
εφαρμογές (μέχρι 48 ώρες από την έναρξη της
μυλωνίας).
Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 6-10 ημέρες.
Ροδάκινο, Νεκταρίνι:
• Για ΦΑΙΔΑ ΣΠΙΝΗ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΩΝ
(*Monilia laxa*, *Monilia fructigena*, *Monilia fructicola*)
45 γρ./στρέμμα (μπαλ) ή 30 γρ./100 πτ. ψεκ. υγρού.
Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.
Εφαρμογές από την ανάπτυξη του παθόντος από
την έναρξη μέχρι το τέλος της ανθοπίας.
Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών.
• Για ΦΑΙΔΑ ΣΠΙΝΗ ΚΑΡΠΩΝ (*Monilia laxa*, *Monilia*
fructigena, *Monilia fructicola*) 75 γρ./στρέμμα (μπαλ)
ή 50 γρ./100 πτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού:
100-150 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές κοντά στη
συγκομιδή. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα
7-10 ημερών.

Κεράσι, Βερίκοκο, Δαμάσκηνα:
Για ΦΑΙΔΑ ΣΠΙΝΗ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΩΝ
(*Monilia laxa*, *Monilia fructigena*, *Monilia fructicola*)
75 γρ./στρέμμα (μπαλ) ή 30-50 γρ./100 πτ. ψεκ.
υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.
Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για
την ανάπτυξη του παθόντος από την έναρξη μέχρι
το τέλος της ανθοπίας.
Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών.

Παρατηρήσεις:
Για την αποφυγή της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας
συνοστάται οι εφαρμογές με CHORUS 50 WG να
γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλες
ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις
ανιθινονιπιδίνες.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιηγητική
περίοδο: 2



Αρ. Πρωτοκόπ. ΒΙΟΠΕ Φαίδας
Να μην Παρανομιεί. Βλέπε Φαίδας

Product names marked ® or ™: the ALLEGRIE® Family
the SYNGENTA Logo and the SYNGENTA Logo
are Trademarks of a Syngenta Group Company

300 gr e