

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων. •Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. •Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. •Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (ιδείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλύνετε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμένει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείτε. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (ιδείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Μην προκαλέσετε εμετό. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην μοιράνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση τουλάχιστον 50% ή να αφήνετε μια απέκαστη ζώνη τουλάχιστον **5 μέτρων**.

«Για την προστασία του ψεκαστού θα πρέπει αυτός να φοράει κατάλληλα γάντια καθώς επίσης γυαλιά και μάσκα για την προστασία των ματιών και του προσώπου»

«Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχουν στεγνώσει πλήρως τα φύλλα μετά τον ψεκασμό. Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον αγρό σύντομα μετά τον ψεκασμό, θα πρέπει να φοράνε γάντια»

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος δράσης: Το Cidely Top είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Περιέχει τα δραστικά συστατικά Difenoconazole (τριαζόλη) που κινείται διελασματικά και δρα προληπτικά και θεραπευτικά και Cyflufenamid (amidoxime) που κινείται διελασματικά, παρουσιάζει τάση ατμών και έχει προληπτική, υπολειμματική και θεραπευτική δράση. Καταπολεμά μυκητολογικές ασθένειες σε τομάτα, καρπούζι, πεπόνι, αγγούρι και κολοκύθι.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τον μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του Cidely Top και ανακινείτε. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχανήμα και ειδικά τα ακροφύσια έχουν καθαριστεί πριν τον ψεκασμό. Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να ρυθμιστούν /ελεγχθούν με ακρίβεια για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

L179730 GREG/5S



Cidely® Top

125/15 DC

syngenta®

Difenoconazole + Cyflufenamid

**Εναιωρηματοποίηση
συμπύκνωμα (DC)**

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Γεωργ.:
60419/6-5-2014

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Difenoconazole 12.5% β/ο

Cyflufenamid 1.5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 85.17% β/β

**Μυκητοκτόνο με
προστατευτική και
θεραπευτική δράση.**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση

της συσκευασίας

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες
χρήστες**

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

Syngenta Hellas A.E.B.E.

Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13

www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

500 ml e

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποθεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Προφυλάξεις για τους χειριστές: Φοράτε γάντια κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος και σε χρήση στο θερμοκήπιο φοράτε φόρμα κατά την παρασκευή και χρήση του σκευάσματος.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλίσσει: Το σκεύασμα είναι συμβατό με προγράμματα IPM. Το Cidely Top, είναι συμβατό με τα ωφέλιμα *Orius laevigatus*, *Amblyseius Swirskii*, *Encarsia formosa*, *Eretmocerus mundus* και *Nesidiocoris tenuis* που χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας (μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες και με δόση 100κ.εκ./100ήτρα ψεκαστικό υγρό με όγκο ψεκαστικού έως 100ήτρα/στρ).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.

Φυτοτοξικότητα: Το σκεύασμα Cidely Top, δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Τομάτα, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Αγγούρι: 3 ημέρες.

Φάσμα δράσης:

Τομάτα (Α): Για Αλτερναρίωση (Alternaria solani), Κλαδοσπορίωση (Fulvia fulva) 100 κ.εκ./στρέμμα (max) ή 100 κ.εκ. /100 ήτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 30-100 ήτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος BBCH 20-89. 1 εφαρμογή.

Τομάτα (Θ): Για Ωίδιο (Leveillula taurica), Erysiphe lycopersici, Oidium lycopersici, Αλτερναρίωση (Alternaria solani), Κλαδοσπορίωση (Fulvia fulva) 100 κ.εκ./στρέμμα (max) ή 100 κ.εκ. /100 ήτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 30-100 ήτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος BBCH 20-89. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες.

Πεπόνι, Καρπούζι, Αγγούρι, Κολοκύθι (Α/Θ): Για Ωίδιο (Podosphaera xanthii), Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Golovomyces cichoracearum, Αλτερναρίωση (Alternaria cucumerina), Μαύρη οήψη (Didymella bryoniae), Κλαδοσπορίωση (Cladosporium cucumerinum) 100 κ.εκ./στρέμμα (max) ή 100 κ.εκ. /100 ήτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 30-100 ήτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος BBCH 20-89. 1 εφαρμογή για τις χρήσεις αγρού και 2 για τις χρήσεις υπό κάλυψη με 10 ημέρες μεσοδιάστημα.

Παρατήρηση: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο ωίδιο, να μην ξεπερνούν σε μια καλλιεργητική περίοδο, εφαρμογές με σκευάσματα που περιέχουν το δραστικό συστατικό cyflufenamid κατά το 1/3 των προγραμμάτων φυτοπροστασίας.

Αρ. Παρτίδας:

Ημ/νία Παραγωγής:

