

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ :

- Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
 - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.
 - Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.
- Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.**
- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ**
- Εάν καταποθεί καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.
Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Συμπτωματική θεραπεία.
- Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων : 210 7793777**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- Μην σπέρνετε και μην φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 2,5 μήνες από την εφαρμογή του.
- Μην μολύνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό.
- Πάρτε αυστηρές προφυλάξεις να μη μολυνθούν γεωτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- Αν ρυπανθούν τα νερά αρδύσεως να μην χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση.
- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.
- Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες.
- Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.
- Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

ΜΕΤΡΙΑ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά.
Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού.

Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε το υπόλοιπο νερό. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύνετε τα ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό αν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Στα χαραρότευτλα συνδυάζεται με Desmedipham + Phenmedipham EC και στα σιτάρι-κριθάρι με MCPA όταν αυτό είναι σε μορφή άλατος αμίνης ή άλατος καλίου, αλλά δεν συνδυάζεται όταν το MCPA είναι σε μορφή εστέρα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 28 ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Σε καλά κλεισμένη συσκευασία και σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής.



κλιοφάρ
CLIOPHAR
100 SL

Ζιζανιοκτόνο

Υδατικό Διάλυμα SL

Clopyralid - κλοπυραλίν

Εγγυημένη Συνθεση : CLOPYRALID: 10% β/ο
υπό μορφή άλατος monoethanolamine
Βοηθ. Ουσίες: 90,19% β/β

**Εκλεκτικό δισυστηματικό
μεταφωτρωτικό
ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αριθμ. εγκρίσεως κυκλοφορίας: 7603/29-2-2000

Παρασκευαστής -
Τυποποιητής -
Συσκευαστής:

AGRIPHAR CHIMAC-AGRIPHAR S.A.

Αντιπρόσωπος - Διανομέας:



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γληνού 32, Βούλαρα, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com
www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο 500 κ.εκ.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Εκλεκτικό δισυστηματικό ζιζανιοκτόνο εναντίον πλατύφυλλων ετήσιων και πολυετών ζιζανίων που ανήκουν στις οικογένειες COMPOSITAE, POLYGONACEAE, UMBELIFERAE, LEGUMINOSAE: **100-120κ.εκ./στρ. μόνο του ή 100κ.εκ. CLIOPHAR + 600κ.εκ. Desmedipham + Phenmedipham EC (BETANAL) σε 40 λίτρα νερό / στρέμμα.** Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 2-3 φύλλων.

ΣΙΤΑΡΙ - ΚΡΙΘΑΡΙ: Εκλεκτικό δισυστηματικό ζιζανιοκτόνο εναντίον πλατύφυλλων ετήσιων και πολυετών ζιζανίων που ανήκουν στις οικογένειες COMPOSITAE, POLYGONACEAE, UMBELIFERAE, LEGUMINOSAE: **100-120κ.εκ./στρ. σκέτο ή 70κ.εκ. CLIOPHAR + 175κ.εκ. MCPA 40% 30-50 λίτρα νερό στο στρέμμα.** Στο συνδυασμό του CLIOPHAR με MCPA εφαρμόζεται το μίγμα όταν τα ζιζάνια έχουν 2-6 φύλλα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1. Πιο αποτελεσματικό όταν ψεκάζεται την περίοδο που τα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στα αρχικά στάδια ενώ η δράση του είναι αργή όταν οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν την ανάπτυξη των ζιζανίων. Εναντίον του CIRCIUM, είναι αποτελεσματικό σε οποιοδήποτε στάδιο.

2. Σε συνδυασμό με desmedipham+phenmedipham EC ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και των δύο προϊόντων

Τρόπος Εφαρμογής

Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 40 λίτρα νερό για τα χαραρότευτλα και 30-50 λίτρα νερό για τα σιτάρια στο στρέμμα

ΖΙΖΑΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ:

Ανθεμίδα	Anthemis spp
Μπιφώρα	Bifora radians
Κεντούρια	Centaurea cyanus
Κίρσιο	Cirsium arvense
Αγριομαργαρίτα	Chrysanthemum segetum
Χαμομήλι	Chamomilla spp
Πολυκόμμι	Polygonum spp
Μαρτιάκος	Senecio vulgaris
Ζωχός	Sonchus oleraceus
Αγριοτρίφυλλο	Trifolium spp
Αγριορίκος	Vicia sativa
Ασπράγκας	Xanthium spp

ΖΙΖΑΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ PHENMEDIPHAM + DESMEDIPHAM 8/8 EC

Αστροφάγι	Atriplex fatula
Λοβουδιά	Chenopodium album
Καπνόχορτο	Fumaria officinalis
Βλήτο	Amaranthus spp
Παπαρούνα	Papaver rhoeas
Στόφνος	Solanum nigrum

ΖΙΖΑΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ MCPA

Κολλητοίδα	Galium aparine
Παπαρούνα	Papaver spp
Σινάπι άγριο	Sinapis arvensis
Καπνόχορτο	Fumaria officinalis
Βερόνικα	Veronica spp
Γόγγολη	Agrostema githago

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

αναγράφεται
στο άνω μέρος της φιάλης