

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
- Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αμέσως το δοχείο, την ετικέτα ή το MSDS (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας). Να μην προκληθεί εμετός.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Τα λερωμένα ρούχα θα πρέπει να πλυθούν πριν ξαναφορεθούν.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλυθείτε με άφθονο νερό για 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Εάν η πλύση στομάχου κρίνεται απαραίτητη να αποφευχθεί η αναρρόφηση των γαστρικών υγρών. Να κριθεί εάν χρειάζεται η χορήγηση ενεργού ξυλάνθρακα και καθαρτικού.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικινδύνους απόβλητα.

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια ασέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων.

Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις καλλιέργειες αγρού οι οποίες απέχουν λιγότερο από **5 μέτρα** από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά .

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:
Δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία χωρίς να ανοιχθεί, σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος. Προφυλάξτε το σκεύασμα από το κρύο.

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: *Βλέπε φιάλη*



0313

Dow Dow AgroSciences



ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

mesotrione
(ομάδα τρικετόνες)

Εγγυημένη σύνθεση:
mesotrione: 10% β/ο
βοηθ.ουσίες 90,12% β/β

Πυκνό εναιώρημα (SC)
Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο
για την καταπολέμηση ετησίων και
πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

- Ερεθιστικό για τα μάτια.
 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
- Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον..**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάτοχος της άδειας:

syngenta

Λ. Ανθούσης - Ανθούσα Αττικής
Τ.Κ. 15349 Τηλ.: 210-6666612 Fax: 210-6665777

Αριθ. Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά (ΑΑΔΑ):
70026/ 28-1-2013

Διανομέας:



ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΗΛ.2310 568656 • FAX:2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

™ Σήμα κατατεθέν της Syngenta

Περιεχόμενο:
1 λίτρο

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.
Τα ζιζανιοκτόνα της ομάδας των τρικετόνων παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Αραβόσιτος: για ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια στη δόση 75κ.εκ./στρέμμα με 25-30 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Για Αγριοβαμβάκι (*Abutilon theophrasti*) και Αγριοτοματί (*Solanum nigrum*) μία εφαρμογή από το φύτεμα μέχρι τα 6 φύλλα των ζιζανίων. Για Βλήτο (*Amaranthus* spp) Τάτουλα (*Datura stramonium*) Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*) Λουβαδιά (*Chenopodium album*) μία εφαρμογή από το φύτεμα μέχρι τα 4 φύλλα των ζιζανίων.

Παρατήρηση: Σε υψηλότερες δόσεις (μέχρι 150κ.εκ./στρέμμα) περιορίζει την ανάπτυξη ετησίων αγρωστωδών ζιζανίων και κύπερης.

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση 2-3 Atm, υπό συνεχή ανάδευση, με τα συνήθη ψεκαστικά με 25-30 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα με μικρό τύπου σκούπας. Βεβαιωθείτε ότι τα ψεκαστικά έχουν ρυθμιστεί σωστά πριν την εφαρμογή. Συνιστάται η χρησιμοποίηση του μικρότερου όγκου νερού και στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο (όταν τα ζιζάνια θα έχουν αναπτυχθεί) να χρησιμοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος νερού.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Τα κενά συσκευασίας ξεπλύνετε τα πολλές φορές ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Πλύνετε καλά το ψεκαστικό μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του βυτίου με καθαρό νερό χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το 1/10 της περιεκτικότητας του. Βάλτε το ψεκαστικό σε λειτουργία. Αφού το αδειάσετε επαναλάβετε την διαδικασία. Ψεκάστε το νερό του καθαριστικού σε ακαλλιέργητο έδαφος μακριά από υδάτινες επιφάνειες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Αποτέφρωση σε υψηλές θερμοκρασίες. Η αποτέφρωση χωρίς να λαμβάνει χώρα σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις σε θερμοκρασία ανώτερη των 1200°C όπου ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας της αέριας φάσης θα πρέπει να είναι 2 δευτερόλεπτα.

Συνδυαστικότητα: Για διεύρυνση του φάσματος δράσης των καταπολεμούμενων ζιζανίων και ιδιαίτερα για την ταυτόχρονη καταπολέμηση και αγρωστωδών ζιζανίων το σκεύασμα μπορεί να συνδυαστεί με Milagro 4SC ή με Rush 25WG, στις συνιστώμενες αντίστοιχες δόσεις.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Όταν υπάρχει συνεχόμενη καλλιέργεια αραβόσιτου, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του Clue, για περισσότερες από 2 συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους. Συνιστάται η εναλλαγή του με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης καθώς και η εναλλαγή των καλλιεργειών.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-**σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξασπαρθεί μόνο αραβόσιτος στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

-**σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:**

-Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί το φθινόπωρο να σπαρθούν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη) και την επόμενη άνοιξη ηλιανθος, αφού προηγηθεί βαθειά άροση.

-Να μη σπέρνονται βαμβάκι πριν περάσουν τουλάχιστον 10 μήνες και χαχράτευτα, παντζάρι, σπανάκι, αρακάς, φασόλι και σόγια πριν περάσουν τουλάχιστον 20 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

-**της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Πρόσβαση των ζώων μετά από 12 ημέρες.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλαμπόκι που προορίζεται για την παραγωγή σπόρου. Πιθανή εμφάνιση λεύκανσης των φύλλων του καλαμπόκι υπό συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας ή έντονων μεταβολών της θερμοκρασίας είναι παροδικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει τις αποδόσεις.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: -Αραβόσιτος: **Δεν ορίζεται**