

Προφυλάξεις: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε μετά τον ψεκάσμό. Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να μην προκληθεί εμετός. Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:



CONFER 10 EC

Μυκητοκτόνο Κονφέ

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC) penconazole (πενκοναζόλ) 10%

Εγγυημένη σύνθεση: penconazole 10% β/ο
βοηθ. ουσίες 89,7 % β/β



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

• Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά την διάρκεια της κύησης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 60. 233 / 23-12-2008

Κάτοχος Έγκρισης:
TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.

Υπεύθυνος για την Τελική Συσκευασία και Σήμανση-Υπεύθυνος Επικοινωνίας:



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.

Δ. Γλυνού 32, Βούλα, Γεωσολογική, 542 49

Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378

e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο: 400 κ.εκ.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: Διδίο (Podospaera oxycanthae): 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 52-125 κ.εκ./στρ. Στην πτώση των πετάλων, στην απόσπαση του κάλυκα και 20 ημέρες αργότερα. **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: Διδίο** (Sphaerotheca pannosa): 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 52-125 κ.εκ./στρ. Στην πτώση των πετάλων, στην απόσπαση του κάλυκα και 20 ημέρες αργότερα. **ΑΜΠΕΛΙ: Διδίο** (Uncinula necator): 25-40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 12,5-60 κ.εκ./στρ. Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προεπιπονήσεων και εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, ψεκάσμοι όταν οι βλαστοί αποκτήσουν 2-3 φύλλα και κατά την άνθηση. Οι ψεκάσμοι μπορούν να συνεχιστούν ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: (Πεπόνι, Καρπούζι): **Διδίο** (Sphaerotheca spp.): 25-35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 12,5-35 κ.εκ./στρ. 1-3 ψεκάσμοι. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. Η μικρή δόση συνιστάται για ψεκάσμους κάθε 7-14 ημέρες και η μεγάλη κάθε 10-16 ημέρες. **ΚΑΠΝΟΣ: Διδίο** (Erysiphe cichoracearum): 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 17,5-75 κ.εκ./στρ. 2-3 ψεκάσμοι σε όλα τα στάδια με μεσοδιαστήματα 14 ημέρες. **ΚΑΛΛΙΠΙΣΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: Διδίο** (Sphaerotheca spp.): 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 17,5-50 κ.εκ./στρ. Μέχρι 5 ψεκάσμοι ανάλογα με την ένταση της προσβολής και μεσοδιαστήματα 14 ημέρες.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: Βερικοκία, Ροδακινία: 150-250 λίτρα/στρ., Αμπέλ: 50-150 λίτρα/στρ., Κολοκυνθοειδή: 50-100 λίτρα/στρ., Καπνός: 50-150 λίτρα/στρ., Καλλιπιστακά υπαίθρου: 50-100 λίτρα/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Βερικοκία, Ροδακινία: 3, Αμπέλ: 2, Κολοκυνθοειδή: 3, Καπνός: 3, Καλλιπιστακά υπαίθρου: 5.

Παρατηρήσεις: • Η μικρή δόση να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις χαμηλής πίεσης προσβολής. • Στο αμπέλι η εφαρμογή του πρέπει απαραίτητα να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα επαφής και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις δύο (2) ανά καλλιεργητική περίοδο.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμος καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: • Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. • Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις οδηγίες χρήσεως.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσπαση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ανατίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: • Βερικοκία, Ροδακινία: 21 ημέρες, • Αμπέλ: 35 ημέρες, • Πεπόνι, Καρπούζι: 3 ημέρες, • Καπνός: 21 ημέρες.

210x100