

page 01	page 02	page 03	page 04	page 05	page 06	page 07	page 08	page 09
 1 λίτρο Confidor 200 OD Εκαιώδες Εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Imidacloprid 200 g/L Βοηθητικές ουσίες: 79,98% β/β Διασυστηματικό Εντομοκτόνο επικής και στομάχου. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΑΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Κάτοχος της έγκρισης, Υπευθύνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Αρ. Έγκρ. Κυβλ. Υ.Α.Α.Τ.: 14163/13.12.2006	Κονφιντόρ 200 OD Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως ή ριζοποτισμάτα. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Δε χρειάζεται προδιάλυση. Ρίχνουμε το σκεύασμα κατ' ευθείαν στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΞΕΠΙΔΟΞΙΔΗ: (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ-φρούτ): Εριώδης Αλευρώδης (<i>Aleurothrixus floccosus</i>): Με την εμφάνιση των νυμφών του εντόμου (στάδια L1 και L2). Δόση: 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (150-300 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-400 λίτρα/στρέμμα. Φυλλοκνίστης (<i>Phyllocnistis citrella</i>): Με την έναρξη της προσβολής. Δόση: 50-75* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (100-300 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-400 λίτρα/στρέμμα.	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ-ιεργητική περίοδο: 2 ανά 20 - 30 ημέρες. ΑΧΛΑΔΙΑ: Ψύλλα αχλαδιάς (<i>Cacopsylla rho</i>): Με την έναρξη της προσβολής. Μπορεί να εφαρμοστεί στις εξής περιόδους: Προανθικά μέχρι το στάδιο έναρξης της λευκής κορυφής (BBCH: 54) και μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79). Δόση: 60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (90 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ-ιεργητική περίοδο: 1.	ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>, <i>M. nicotianae</i>): Με την έναρξη της προσβολής. Μπορεί να εφαρμοστεί στις εξής περιόδους: Προανθικά μέχρι το στάδιο έναρξης της ρόδινης κορυφής (BBCH: 54) και μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79). Δόση: 25-30* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (37,5-75 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-250 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ-ιεργητική περίοδο: 2 ανά 28 ημέρες. ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: Αφίδες (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>): Με την έναρξη της προσβολής.	Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (25-50 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ-ιεργητική περίοδο: 2 ανά 14 ημέρες. ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>): Με το νερό της άρδευσης με την έναρξη της προσβολής. Δόση: 75-125⁽⁵⁾ κ.εκ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ-ιεργητική περίοδο: 2 ανά 14 ημέρες. ΑΓΓΟΥΡΙ (θερμοκηπίου και υπαίθρου): Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>): Με	το νερό της άρδευσης με την έναρξη της προσβολής. Δόση: 75-125⁽⁵⁾ κ.εκ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ-ιεργητική περίοδο: 2 ανά 14 ημέρες. ΒΑΜΒΑΚΙ: Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i>): Με την έναρξη της προσβολής. Δόση: 50 κ.εκ./στρέμμα (62,5 - 100* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ-ιεργητική περίοδο: 2 ανά 14 ημέρες. ΠΑΤΑΤΑ: Αφίδες (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>): Με την έναρξη της προσβολής και	μέχρι 4 αφίδες ανά φύλλο. Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει μελίτωμα. Δόση: 50 κ.εκ./στρέμμα (50-100* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα / στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ-ιεργητική περίοδο: 2 ανά 14 ημέρες. ΚΑΠΝΟΣ: Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>, <i>M. nicotianae</i>): α) Με την έναρξη της προσβολής. Δόση: 25-30 κ.εκ./στρέμμα (25-60* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ-ιεργητική περίοδο: 2 ανά 20 - 30 ημέρες.	β) Με πότισμα κατά τη μεταφύτευση. Δόση: 50-100 κ.εκ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ-ιεργητική περίοδο: 1. * Το εύρος της δόσης εξαρτάται από την ένταση της προσβολής. Παρατηρήσεις: 1. Στα εσπεριδοειδή σε προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης συνιστάται να εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασώτου <i>Cales noacki</i> ωρίμων για ωστοκία. 2. Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός)

9 200307 890293