



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΕΣΤΙΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΛΗΘΕΡΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΕΣΤΙΜΩΔΕΙΑ: (Πορτοκαλιά, Μοσχοκίβι, Κεράσι, Γκρέι-φρούτα) **Εκδημή αλευριού:** (Αλευροπάτες, *Acossus*). Με την εμφάνιση των νυμφών του εντόμου (στάδιο 1 και 2), δόση 7,5 κ.κ./10 λίτρα φ.κ. υγρού, **Φυλλοκτονίες** (*Phylloxera* αειβίη). Με την εμφάνιση της προσβολής, δόση 5-7,5* κ.κ./10 λίτρα φ.κ. υγρού, **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ:** **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Myzus persicae*). Με την εμφάνιση της προσβολής, Μίγμα να εφαρμόζεται στις ετήσιες παραδόσεις. Προσβολή μέχρι το στάδιο ανάπτυξης της ροδόλης κρούρας (BBCH 5-6) και μετά την καρποποίηση έως την εμφάνιση αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79), δόση 2,5-3* κ.κ./10 λίτρα φ.κ. υγρού, **ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙ:** **Αφίδες** (*Macrosiphum euphorbiae*), **Αλευριού:** (*Trialeurodes vaporariorum*). Με την εμφάνιση της προσβολής, δόση 5 κ.κ./10 λίτρα φ.κ. υγρού, **ΑΥΤΟΥΡ:** **Αλευριού:** (*Trialeurodes vaporariorum*) **Ριζοπάθεια**, Προληπτική εφαρμογή, δόση 0,05 κ.κ. ακετοκυλικό/φυτό (7,5-12,5 κ.κ./100 τ.μ. ανάλογα με την πυκνότητα των φυτών⁽¹⁾), **ΠΑΤΑΤΑ:** **Αφίδες** (*Macrosiphum euphorbiae*), **Δασυρράφος** (*Leptodermis desmetiae*). Με την εμφάνιση της προσβολής και μέχρι 4 αφίδες ανά φύλλο. Να μην εφαρμόζεται στον υπαίθριο μελίττα, δόση 5 κ.κ./100 τ.μ.
* Το εύρος της δόσης εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.
Παρατηρήσεις: (1) Στα εσπεριδοειδή σε προγραμματισμένη ολοκληρωμένη αντιμετώπιση συνιστάται να εφαρμόζεται στον υπαίθριο μέχρις επιθυμητού ενσπίου του παρασιτίου *Celtis pumili* και υψώσιου. (2) Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προγραμματισμένης προσβολής (μικτός πληθυσμός) ο φεσκατικός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο. (3) Στα εσπεριδοειδή για την καταπολέμηση του φυλλοκτονίου (*Phylloxera* αειβίη), η μικρή δόση συνιστάται για μικρή ή μέτρια προσβολή ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη ή πολύ προσβολή. (4) Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προγραμματισμένης προσβολής εφελκυστικού αλευριού (μικτός πληθυσμός) συνιστάται η προσβολή (TAR-MQ) βενικού λαδιού ή πολτού σε δόση 100 κ.κ. (5). Στην περίπτωση εφαρμογής με ριζοπάθεια, το εύρος της δόσης εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών. (6). Να μην εφαρμόζεται το σκευασμα στον μελίττα σε ενοχλητικές κοκκινιστικές. (7) Να μην εφαρμόζεται.

Bayer Ελλάς ABBE
Ευρώπη 14-20, 151 25 München
Τηλ: 210 6166000 Φαξ: 210 6109100



Bayer CropScience

το σκευασμα κατά την περίοδο της άνθησης. (8) Να μην εφαρμόζεται το σκευασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίττα (π.χ. περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο).

Μείγματος ορθής εφαρμογής ανά καλλιεργητική περίοδο:
Εσπεριδοειδή: 2 εφαρμογές (ανά 20-30 ημέρες), Ροδάκινα: 2 εφαρμογές (ανά 20 ημέρες), Τομάτα υπαίθρου: 2 εφαρμογές (ανά 14 ημέρες), Αυγούρι: 2 εφαρμογές (ανά 14 ημέρες), Πατάτα: 2 εφαρμογές.

ΤΕΛΕΥΤΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΜΗ: Εσπεριδοειδή: 21 ημέρες, Ροδάκινα - Πατάτα: 14 ημέρες, Τομάτα υπαίθρου - Αυγούρι: 7 ημέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Χρησιμοποιήστε τη συσκευή που θέλετε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Δεν χρειάζεται προσοχή. Ρίχνουμε το σκευασμα κατ' ευθείαν στο φεσκατικό δοχείο αναδύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό ανακατεύοντας την ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της σκευασίας: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευασίας πρέπει να γίνεται σε υψώσιμους που έχουν κατάλληλα εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά υλικά σκευασίας ξεπλένονται από πίεση ή γίνεται πρώτο ξεπλύσιμο (το νερό του ξεπλύματος το ρίχνουμε στο φεσκατικό υγρό) και στη συνέχεια ορατά καταπαράγον προπαρασκευάζουμε σκόνη, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εγκαθίσταται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις αναπτυγμένες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής στις Ελληνικές εδαφολογικές συνθήκες, εφόσον πρόκειται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

ΧΡΩΡΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΒΛΕΤΣΗΣ: Δεσφύεται στην χρήση του απορριπτικού σκευασίας, καλά κλειστά, σε χώρο δροσερό. Εξοκ και καλά ασφαλίστε, χωρίς να εκτίθεται κατ' ευθείαν στο φως.

Ημερομηνία λήξης: Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.
Ημ. Παρασκευής - Ημ. Λήξης - Αρ. Παρτίδας: Βλέπε ένα μέρος του κουτιού.



Αρ. Εγκλ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
1974/11.3.03

Υγρό διάλυμα (SL)

Εγγ. σύνθεση: imidacloprid 20,6% β/β

Βοηθ. ουσίες: 82,37% β/β

Δυσσυστημικό Εντομοκτόνο

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το

περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

• Ερεθίζει τα μάτια

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΠΑΡΑΣΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Κατάλογος της έγκρισης: Bayer CropScience AG, Γερμανία
Υπεύθυνος για την τελική σκευασία στο σήμα: Bayer Ελλάς ABBE

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Πλύνετε το χέρι και το σκέλη μετά το σκάψισμα πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή. **ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Σε περίπτωση συγχύματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Απομακρυνθείτε από τη ζώνη κινδύνου. Εάν ο ασθενής αποδυναμωθεί τοποθετήστε τον σε σταθερή πλευρική θέση, θάψτε τα ροζαία που έχουν βραχεί με το σκευασμα. Σε περίπτωση εκτεταμένης μεταφοράς τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ήρεμο. Καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και σαπούνι. Καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλείτε εμετό, ξενύστετε το στόμα με νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό. Πληροφορίες για το γιατρό: **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτή. Συμπτωματική θεραπεία. Παρακολούθηση των αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών. Πίση σταφυλίου και χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα και sodium sulfate. Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793 777.

Βλαβερό για τα πουλιά.
Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Γ να να προστατεύσετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδυνότητα την χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιεργείες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο αναδύσεως των ζώων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε το ζώο πριν την ανθοφορία τους.