

Cottonex[®] 50SC

Fluometuron (Φθιουομετουρόν) 50%
Συμπυκνωμένο αιώρημα

Εγγυημένη σύνθεση: **Fluometuron 50%** β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 54,15% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. οφ.: 7460/21.3.94/04

**Προφυτρωτικό & μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο
για την καταπολέμηση μονοετών πλατύφυλλων και
αγρωστωδών ζιζανίων στην καλλιέργεια του βαμβακιού**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ



Παρασκευαστής:
Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Ισραήλ

Αντιπρόσωπος-Συσκευαστής-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Μέλος του



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 ΛΙΤΡΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. •Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. •Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβλήμα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

N



ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΔΥΣΜΕΝΙΕΣ ΕΠΙΤΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΕΤΡΙΑ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το χωριστά από άλλα γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. •Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. •Μην σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 5 μήνες από την εφαρμογή. •Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. •Αν ρυπανθούν τα νερά αρδεύσεως, να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση. •Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. •Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm. •Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας. •Μετά τον ψεκασμό, ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορριπντικό.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο ξηρό και δροσερό μακριά απ'τον ήλιο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 500 (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 ΛΙΤΡΑ

ΚΟΤΩΝΕΣ 50%: Προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση μονοετών ηλιόφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων, στην καλλιέργεια του βαμβακιού. Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα. Παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η εφαρμογή να γίνεται με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm (45 psi) και με σταθερή ταχύτητα 4 περίπου χιλιόμετρα ανά ώρα υπό συνεχή ανάδευση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινούμε καλά το φάρμακο και διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκου σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται τρεις φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό διάλυμα. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

α) Αμέσως μετά τη σπορά: Ομοιόμορφος ψεκάσμος με 30-60 λίτρα νερό/στρέμμα. Δόση: 250-500 κ.εκ./στρ. **β) Μεταφυτρωτικά:** Όταν το βαμβάκι έχει ύψος 10-15 εκ., κατευθυνόμενος ψεκάσμος στη βάση των βαμβακοφυτών με 30-60 λίτρα νερό/στρ. Δόση: 200 κ.εκ./στρ.

Παρατηρήσεις:

1) Η δόση είναι ανάλογα με τον τύπο του εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαρεία εδάφη και οι μικρές σε ελαφρά εδάφη. 2) Σε 7-10 ημέρες από την εφαρμογή του, ν'ακολουθεί βροχή ή άρδευση με 20-30 κ.μ. νερό/στρέμμα. 3) Εάν χρησιμοποιηθεί σε δόση μεγαλύτερη από 400 γρ./στρ., τότε δεν πρέπει να φυτεύονται μετά τη συγκομιδή του βάμβακος ευαίσθητες καλλιέργειες (ισιόρι, σόγια, χαχολοτεύτλη, λάχανα, κοκκινόχοιλα, αραχίδα, τομάτα και μελιτζάνα), παρά μόνο αφού περάσει ένας χρόνος. 4) **Ευαίσθητα ζώδια:** Αγριοσταυρίδι, Αιματόχορτο, Μουχράτση, Βήλιτο, Στάριες, Χαμομήλι, Λουβουδιές, Μεγαλόκαρπη καλλιτσίδα, Ήρες, Αντράκλια, Μαρτιάκος, Άγριο σιγάρι, Αγριομελιτζάνα, Λάπαθο, Αγριοπιπριά, Πολυκύμνο. **Τα πιο σπουδαία ανθεκτικά ζώδια είναι τα:** Abutilon theophrasti (Αγριοβαμβάκι), Hibiscus trionum (Αγριοβίος), Malva spp. (Μοιόχα), Convolvulus arvensis (Περικοκλάδα).

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Είναι απόλυτα εκλεκτικό για το βαμβάκι και δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοφάρμακα εκτός από τα θειοκαρβαμιδικά ζιζανιοκτόνα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ