

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καννίζετε. • Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης, να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Μην χρησιμοποιήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. **Σε περίπτωση εισπνοής,** μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αν εμφανισθεί ερεθισμός, συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** ξεπλύνετε τις περιοχές του δέρματος στις οποίες έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό με με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε το προϊόν. Πλύνετε τα πριν τα ξαποφορέσετε. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΝΤΟΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΙΑΣΗΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΩΔ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΨΕΚΑΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ

01/2012-7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



Cooyote® 5EC

**Cyfluthrin (Συφλουθρίν) 5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό**

Εγγυημένη σύνθεση: **Cyfluthrin 5% β/ο**

Βοηθητικές ουσίες: 94,57% β/β

Αρωματικός διαλύτης: Νάφθα

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Φ.φ.: 14400/21.06.2012

**Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου
για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών
εντόμων**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΞΗΡΟΤΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Ή ΣΚΑΣΙΜΟ

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ



Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2112105555, Φαξ: 2112105559

Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάνια

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Μέλος του



ΚΟΙΟΤ 5: Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων. Το Cyfluthrin ανήκει στην ομάδα των πυρεθροειδών και δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους ιόντων νατρίου στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλλιέργειας φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ: Καρποκάφη, Φυλλορρόχτες (Νάρκες), Ψύλλια αχλαδίας. Δόση: **50 κ.εκ./100** λίτρα νερό. Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολλήσεων, σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ:** Ανάρσια, Καρποκάφη, Μύγα Μεσογείου. Δόση: **50-70* κ.εκ./100** λίτρα νερό. Μέγιστη δόση: 70 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολλήσεων, σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **ΠΙΠΕΡΙΑ (υπαίθρου):** Πρόσνο ακουήκη, Σποντόπτερα. Δόση: **50 κ.εκ./100** λίτρα νερό. Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση προνυμφών-προσβολής. **ΠΙΠΕΡΙΑ (θερμοκηπίου):** Πρόσνο ακουήκη, Σποντόπτερα, Θρίπες. Δόση: **50 κ.εκ./100** λίτρα νερό. Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση προνυμφών-προσβολής. **ΑΓΓΟΥΡΙ (υπαίθρου & θερμοκηπίου):** Πρόσνο ακουήκη, Σποντόπτερα. Δόση: **50 κ.εκ./100** λίτρα νερό. Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση προνυμφών-προσβολής. **ΜΠΡΟΚΟΛΙ:** Πιερίδα. Δόση: **50 κ.εκ./100** λίτρα νερό. Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση προνυμφών-προσβολής. **ΣΤΑΡΤΙ:** Αρίδες. Δόση: **30 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση προνυμφών-προσβολής. **ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ:** Πιρηνίδα, Σελήδια. Δόση: **80 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:** *Noctuidae* (Μομίστρα, Πήλωση, Σποντόπτερα), Αρίδες, *Scrobipalpa ocellatella*. Δόση: **50 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση προνυμφών-προσβολής. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Πρόσνο ακουήκη, Ρόδινο ακουήκη. Δόση: **35 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμοί καλύψεως κατά των εκκολλήσεων προνυμφών, σύμφωνα με τις συλλήψεις στις φερόμονικές παγίδες και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη της προσβολής.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): Μηλιά-Αχλαδιά (80-140), Ροδακινιά-Νεκταρινιά (80-140)*, Πιπεριά υπαίθρου & θερμοκηπίου (50-120), Αγγούρι υπαίθρου & θερμοκηπίου (50-140), Μπρόκολο (40-100), Σταρτί (20-40), Καλαμπόκι (20-60), Ζαχαρότευτλα (30-60), Βαμβάκι (50-70).

*Στη Ροδακινιά-Νεκταρινιά, το εύρος της δόσης σχετίζεται με το εύρος του όγκου του ψεκαστικού υγρού: ανά στρέμμα, όταν ο όγκος του ψεκαστικού υγρού υπερβαίνει τα 100 λίτρα/στρ., να χρησιμοποιείται η δόση 50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλιεργητική περίοδος - Μεσοδιάστημα ψεκασμών: Μηλιά-Αχλαδιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά (1), Πιπεριά υπαίθρου & θερμοκηπίου-Αγγούρι υπαίθρου & θερμοκηπίου-Μπρόκολο-Βαμβάκι (2, 14 ημέρες, εφόσον απαιτείται), Καλαμπόκι-Ζαχαρότευτλα (2, 14 ημέρες), Σταρτί (2).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Χρήση καλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιοηολικών μεθόδων, ώστε να περιοριστεί ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απαιτούμενες απαιτήσεις για αποπληρωματικό έλεγχο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Πιπεριά-Αγγούρι-Καλαμπόκι: **3 ημέρες**

Μηλιά-Αχλαδιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Μπρόκολο-Ζαχαρότευτλα: **7 ημέρες**

Σταρτί-Βαμβάκι: **21 ημέρες**

ΦΥΤΟΣΥΝΕΚΙΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστάμενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (τα νερά του ξεπλέμματος ρίχνονται στο σφραγισμένο δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενος με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλήψεως για διαχείρισή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΗΚΕΣ ΑΠΟΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Αποθηκεύεται σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, προστατευμένο από τον παγετό, σε θερμοκρασίες <40°C. Σε αυτές τις συνθήκες, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.