

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές • Μην τρώτε, μην πίνετε ή μη καννίζετε όταν το χρησιμοποιείτε • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα • Φοράτε μάσκα με φίλτρο κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής • Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους ως επικινδύνους απόβλητα. Αποφύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες (δείτε δεδομένων ασφαλείας).

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:

Γενικά: Μετακινείτε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από υποθερμία. Αν υποψιάζεστε δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα βρωμένα ρούχα και πλύνετε πολύ καλά τα μέρη του σώματος που ήρθαν σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό, με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγείτε ιατρικό ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Προσοχή μην χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό, σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση εμφάνισης αλλεργικής αντίδρασης: (αλλεργικού σοκ) απαιτείται ΑΜΕΣΗ ιατρική αντιμετώπιση.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα οι επενδεδυμένοι με το προϊόν σπόροι/κονδυλίοι πρέπει να καθαφθούν πλήρως από το έδαφος.

Βεβαιωθείτε πως οι επενδεδυμένοι με το προϊόν σπόροι/κονδυλίοι έχουν καθαφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.

Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα μαζέψτε όσους επενδεδυμένους με το προϊόν σπόρους/κονδυλίου έχουν κυθεί κατά λάθος.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Τοξικό για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιάστε μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν οι γειτονικές καλλιέργειες είναι στο στάδιο της ανθοφορίας ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

Φυτοτοξικότητα: Το CRUISER 350 FS δεν είναι φυτοτοξικό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες και τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από τον ήλιο και υγρασία και σε θερμοκρασία από -10° C έως 35° C.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αραβόσπο, Βαμβάκι, Πατάτα: Δεν έχει εφαρμογή.

Αριθμ. παρτίδας: βλέπε φιάλη

Η/μια παρασκευής: βλέπε φιάλη

L160909 GREC/9P



Thiamethoxam, (θειαμεθοξάμ)
(ομάδα νεονικωτινοειδών)

Πυκνό εναιώρημα για επένδυση σπόρων (FS)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Thiamethoxam: 35% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 69,48% β/β

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των νεονικωτινοειδών για επένδυση σπόρων. Καταπολέμα έντομα εδάφους και φυλλώματος στα πρώτα στάδια ανάπτυξης στις καλλιέργειες αραβόσπο, βαμβάκιου και πατάτας.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Λ.Ανθούσης, 153 49 Ανθούσια, Αττική, Τηλ.: 210 666612-13
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3
www.syngenta.gr
SYNKEYAΓHTH: Syngenta Agro SA, Porrino Spain

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME and the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 ltr

Αρ. Ορίστ. Έγκρ. κυκλ. Υπ. Αγροτ.
Ανάπτ: 14138/24-08-2009
Ημερ. λήξης έγκρισης κυκλ.:
31-1-2017



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια δυσμενείς επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλον.

Φάσμα δράσης: Αραβόσποτος: Σίδηροσκοκλήνης (Agrimotes spp), Αφίδες (Aphis fabae, Mysus persicae). Με 600-900 gr σκευάσματος/100 κιλά σπόρου (όγκος νερού 1000 ml/100 kg σπόρου) Επένδυση σπόρων με τη μέθοδο slurry.
Βαμβάκι: Σίδηροσκοκλήνη (Agrimotes spp), Αφίδες (Aphis gossypii), Θρίπες (Thrips tabaci). Με 600-900 gr σκευάσματος/100 κιλά σπόρου (όγκος νερού 1000 ml/100 kg σπόρου). Επένδυση σπόρων με τη μέθοδο slurry.
Πατάτα: Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata) Με 14,20-30 gr σκευάσματος/100 κιλά σπόρου (όγκος νερού 1000 ml/100 kg σπόρου). Επένδυση κονδυλίων με εμφύσηση και ψεκασμό.

Μέγιστος αριθμ. εφαρμογών/ καλλιέργ. περίοδο για όλες τις καλλιέργειες: 1

Παρατηρήσεις: 1) Το εύρος της δράσης είναι ανάλογο της αναμενόμενης προσβολής και της διάρκειας προστασίας. 2) Η όποια των επενδεδυμένων σπόρων/κονδυλίων με το σκεύασμα CRUISER 350 FS δεν θα πρέπει να γίνεται κάτω από ευαίσθητες συνθήκες (δηλαδή σε αμμώδη εδάφη και σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση). 3) Κατά την όποια να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την αποφυγή της αερομεταφοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της τοξικότητας στα παρακείμενα μελίσσια. 4) Το σκεύασμα περιέχει κόκκινη χρωστική ουσία ώστε να ξεχωρίζουν οι επενδεδυμένοι σπόροι. 5) Γενικά η επένδυση σπόρων βαμβάκιου και καλαμποκιού να γίνεται σε επαγγελματική βάση από απορροπαγωγικούς οίκους ή "επενδυτές" σπόρων που διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η επένδυση γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή των επενδυτικών μηχανημάτων και με την ενδεδειγμένη διαδικασία (οδηγίες) ποιότητας επένδυσης. Έτσι διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποιότητα της επένδυσης του σπόρου. 6) Οι επενδεδυμένοι σπόροι πρέπει να ελέγχονται για την αντοχή στην τριβή. Για το βαμβάκι και τον αραβόσποτο ίσχυουν τα κάτωθι όρια σκόνης (υποήλοισης με τη μέθοδο Heubach). Αραβόσποτος: κατά Heubach: 1.0 g/ 100.000 σπόρους. Βαμβάκι: Όριο σκόνης κατά Heubach: 8 g/ 100 kg σπόρου.

Τρόπος δράσης: Καταπολέμα έντομα εδάφους και φυλλώματος στα πρώτα στάδια ανάπτυξης στις καλλιέργειες αραβόσποτος, βαμβάκιου και πατάτας. Αντιδρά με την πρωτεΐνη των νικωτινικών υποδοχέων της ακετυλοχολινης που υπάρχουν στις νευρικές συνάψεις του κεντρικού νευρικού συστήματος των εντόμων.

Τρόπος εφαρμογής: Το CRUISER 350 FS εφαρμόζεται στους σπόρους του αραβόσποτου και του βαμβάκιου διαλυμένο σε νερό με τη μέθοδο της υγρής εφαρμογής χρησιμοποιώντας όγκο νερού 1000 κ.ε. νερού/100 kg σπόρου αραβόσποτου και βαμβάκιου. Η επένδυση των σπόρων μπορεί να γίνει με ειδικά μηχανήματα επένδυσης μεγάλων ποσοτήτων σπόρων με συνεχή λειτουργία με την χρήση ενός πυκνού ποττού (shurry). Σε αυτά τα μηχανήματα ο ποττός εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω στο σπόρο με τα μηχανήματα συνεχούς ροής (flow seed treaters) μέσω ψεκαστικών μπεκ. Στον πατάτοσπορο η εφαρμογή γίνεται με εμφύσηση σπόρου ή ψεκασμό του σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε επίπεδο παραγωγή όταν υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμός. Ο όγκος του ποττού για την επένδυση σπόρου πρέπει να είναι 1 l/100kg σπόρου.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών ή βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων.

Διάρκεια δράσης: 45-60 ημέρες. Στην περίπτωση που μετά την πάροδο εν εν λόγω διαστήματος από τη σπορά απαιτείται ψεκασμός φυλλώματος για τα έντομα-στόχους, αυτός να γίνεται με εντομοκτόνο άλλης ομάδας από τα νεονικωτινοειδή.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό ξεπλυστικό ή γίνεται τριπλή ξεπλύση (τα νερά του ξεπλυσματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τριπλή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

