

ΚΟΥΠΡΟΦΙΞ ΟΥΛΤΡΑ: Ανόργανο μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Υπό συνεχή ανάδευση, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση καθόλη τη διάρκεια της εφαρμογής.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπ φρουτ-Λεμονιά-Μανταρινιά-Πορτοκαλιά-Φράπα-Κιτριά): Κορυφοξήρα, Φυτόφθορα καρπών, Σεπτορίωση, Προσβολή κηαδίσκων, φύλλων και καρπών. Δόση: **190 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Συνιστώνται 3 ψεκασμοί σε μηνιαία διαστήματα ξεκινώντας από το τέλος Οκτωβρίου. **ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά-Φουντουκιά-Φυστικιά-Καρυδιά):** Εξώασκος, Σεπτορίωση, Ποθυστίγμωση, Σκωρίαση, Ανθράκνωση. Δόση: **200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Ψεκασμοί φθινοπώρου-χειμώνα, την περίοδο του ληθάργου. **ΑΧΛΑΔΙΑ:** Φουζικλήδιο, Σεπτορίωση, Φαιά σήψη, Βακτηριώσεις. Δόση: **260 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Χειμερινοί ψεκασμοί μέχρι και το στάδιο της πράσινης κορυφής. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερυκοκιά-Κερασιά-Ροδακινιά-Δαμασκηλιά):** Φαιά σήψη. Δόση: **210 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Ψεκασμοί φθινοπώρου-χειμώνα, μέχρι να φουσκώσουν τα μάτια. **ΑΜΠΕΛΙ:** Περονόσπορος, Ανθράκνωση, Βακτηριώσεις. Δόση: **260 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Σε περιοχές με υψηλή σχετική υγρασία και συχνές βροχοπτώσεις την άνοιξη, συνιστώνται 2 ψεκασμοί: α) λίγο πριν την άνθηση (στάδιο μούρου) και β) λίγο μετά τη γονιμοποίηση. **ΕΛΙΑ:** Κυκλοκόνιο, Γήοιοσπόριο, Καρκίνωση. Δόση: **325 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Ένας ψεκασμός με τη μικρή δόση στις αρχές του φθινοπώρου, πριν αρχίσουν οι βροχές και ένας δεύτερος, με τη μεγάλη δόση, στις αρχές της άνοιξης. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Παντζάρι-Κρεμμύδι-Τομάτα-Πιπεριά-Μελιτζάνα-Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Καρπούζι-Μπρόκολο-Κουνουπίδι-Λάχανο-Σπανάκι) (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου):** Περονόσπορος, Σεπτορίωση, Ανθράκνωση, Κηαδοσπορίωση, Βακτηριώσεις. Δόση: **190 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Οι ψεκασμοί να αρχίζουν μετά το ύψος των 15 εκ. των φυτών και να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ανά 15ήμερο. **ΠΑΤΑΤΑ:** Περονόσπορος, Ανθράκνωση. Δόση: **190-275 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Οι ψεκασμοί να αρχίζουν μετά το ύψος των 15 εκ. των φυτών και να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ανά 15ήμερο. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:** Κερκοσπορίωση. Δόση: **330 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Προληπτικοί ψεκασμοί ανά 10ήμερο, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):

Εσπεριδοειδή (200-250), Αμυγδαλιά-Φουντουκιά-Φιστικιά-Καρυδιά (100-150), Βερυκοκιά-Κερασιά-Ροδακινιά-Δαμασκηλιά (100-120), Αχλαδιά (100-200), Αμπέλι (50-150), Ελιά (150-300), Λαχανικά-Πατάτα (50-100), Ζαχαρότευτλα (40).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καθημερινική περίοδο:

Εσπεριδοειδή-Λαχανικά-Πατάτα-Ζαχαρότευτλα (3), Αμυγδαλιά-Φουντουκιά-Φιστικιά-Καρυδιά-Αχλαδιά-Βερυκοκιά-Κερασιά-Ροδακινιά-Δαμασκηλιά-Αμπέλι-Ελιά (2).

Παρατηρήσεις:

1) Οι μικρές δόσεις αφορούν στους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. **2)** Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. **3)** Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση των ασθενειών. **4)** Στις καλλιέργειες Αμπέλι, Εσπεριδοειδή, Αχλαδιά, Πυρηνόκαρπα, Πατάτα, Ελιά και Λαχανικά υπό κάλυψη, να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Εσπεριδοειδή-Αμπέλι-Πατάτα-Ζαχαρότευτλα-Ελιά: **21 ημέρες.**

Ακρόδρυα: **28 ημέρες.**

Αχλαδιά-Πυρηνόκαρπα: Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά τη εφαρμογή.

Τομάτα-Μελιτζάνα (υπαίθρου): **10 ημέρες.**

Τομάτα-Μελιτζάνα (θερμοκηπίου), Λοιπά Λαχανικά (υπαίθρου-θερμοκηπίου): **7 ημέρες.**

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση. Στο αμπέλι, να μην χρησιμοποιείται στις ποικιλίες Delaware, Rosette, Niagara και Concord και στην αχλαδιά, στις ποικιλίες D'Anjou, Comice και Sechel.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δε συνδυάζεται με ποητούς όταν ο ψεκασμός γίνεται εκτός της εποχής του ληθάργου των δένδρων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακκούλλες, σάκκοι), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίαση, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ -ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ /ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.

Cuprofix®

ULTRA

40_{wg}

Μεταλλικός Χαλκός (Cu) 40%

Βρέξιμοι κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση: **Μεταλλικός Χαλκός (Cu)** 40% β/β
(σε μορφή Τριβασικού θειικού χαλκού)
Βοηθητικές ουσίες: 18,37% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλ.οφ.: 60.104/21.02.2007 - Ημ.Λήξης Έγκρισης: 31.05.2014

DISPERSS®

Ανόργανο μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: **Cerexagri S.A.S**, Γαλλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας-Συσκευαστής-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσ/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. •Πλύντε τα χέρια και τα ακάθυστα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης, χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση. **Αντίδοτο:** Πενικιλιδιμίνη. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777**

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΕΚΑΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ 21 ΗΜΕΡΕΣ



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ