

ΚΟΥΠΡΟΦΙΞ ΝΤΙΣΠΕΡΣ: Ανόργανο μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζετε τα 2/3 του δοχείου του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΣΤΕΡΙΑΔΕΙΔΗ (Γκρέιφ φρουτ-Λεμονιά-Μανταρινιά-Πορτοκαλιά-Κιτριά-Νεραντζιά-Φράπα): Δόση: **400 γρ./100 λίτρα νερό.** Κορυφοξείρα. Προληπτικές εφαρμογές φθινοπώρου, εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Προσβολή κηλοειδών, φύλλων και καρπών. Εφαρμογή μετά από χαλάζι ή παγετό.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: Κορύνεο. Δόση: **400 γρ./100 λίτρα νερό.** Μία εφαρμογή το φθινόπωρο, όταν έχει πέσει το 75% των φύλλων και μία το χειμώνα, λίγο πριν την έκπτυξη των ευλοφιδρών σφαλλιών. Με την έναρξη της βλάστησης, γίνονται άλλες 1-2 εφαρμογές, εφόσον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. **ΚΑΡΥΔΙΑ:** Ανθράκινωση. Δόση: **400 γρ./100 λίτρα νερό.** Συνιστώνται 3-4 εφαρμογές, που αρχίζουν πριν βγουν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. Να αποφεύγονται οι εφαρμογές στην άνοιξη. **ΜΗΛΙΑ:** Φουζικήρα. Δόση: **550-625 γρ./100 λίτρα νερό.**

Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, συνιστώνται εφαρμογές στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερκοκιά-Κερασιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Δαμασκινιά-Βυσσινιά):** Εξόσασκος, Κορύνεο, Φαία σήψη. Δόση: **425 γρ./100 λίτρα νερό.** Προληπτικές εφαρμογές το φθινόπωρο, μόλις πέσουν τα φύλλα, και στο τέλος του χειμώνα, πριν φουσκώσουν τα μύδια. **ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια & Οινολοιπία σταφύλια):** Περονόσπορος, Ανθράκινωση. Δόση: **550-650 γρ./100 λίτρα νερό.** Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, προληπτικές εφαρμογές που αρχίζουν την άνοιξη, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες για την προσβολή συνθήκες, και συνεχίζονται ανάλογα με την εξέλιξη των τοπικών συνθηκών. **ΕΛΙΑ:** Δόση: **600-650 γρ./100 λίτρα νερό.**

Κυκλοκόνιο. Δύο εφαρμογές: η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο, λίγο πριν την έναρξη των βροχών, και η δεύτερη την άνοιξη, όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ. Γλοιοσπόριο. Δύο εφαρμογές: η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. Καρκινώση. Εφαρμογές μετά από χαλάζι ή παγετό. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Κρεμμύδι-Πιπεριά-Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Καρπούζι-Κουνουπίδι-Λάχανο-Μαρούλι-Σπανάκι-Σέλινο-Πράσο-Φασόλι):** Δόση: **350 γρ./100 λίτρα νερό.** Περονόσπορος, Σειποτρίωση. Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες. Ανθράκινωση. Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά. Βακτηριώσεις. Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σποροφύτων και σταματούν στην καρποδότηση. **ΤΟΜΑΤΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου):** Δόση: **550-625 γρ./100 λίτρα νερό.** Περονόσπορος. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Βακτηριακή κηλίδωση. Εφαρμογές με την εκδήλωση της ασθένειας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξόφλησή της. **ΠΑΤΑΤΑ:** Περονόσπορος. Δόση: **275-612,5 γρ./στρ.** για βαριά προσβολή και **175-275 γρ./στρ.** για ελαφρά προσβολή. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, οι εφαρμογές ξεκινούν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επαναλαμβάνονται ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Κερκοσπορίωση. Δόση: **550-650 γρ./100 λίτρα νερό.** Εφαρμογές που αρχίζουν με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΚΑΛΑΜΠΙΣΤΙΚΑ:** Δόση: **550-650 γρ./100 λίτρα νερό.** Περονόσπορος, Σειποτρίωση. Εφαρμογές που αρχίζουν με την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων. Φυτόφθορα. Εφαρμογή στα νεαρά φυτά, στο σπορείο ή μετά τη μεταφύτευση.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Εσπεριδοειδή (200-250), Αμυγδαλιά-Καρυδιά (100-150), Μήλιά (100-200), Πυρηνόκαρπα (100-120), Αμπέλι-Τομάτα υπαίθρου & θερμοκηπίου-Πατάτα-Καλλωπιστικά (50-100), Ελιά (150-300), Λαχανικά (50-80), Ζαχαρότευτλα (40).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: Τομάτα-Πατάτα-Καλλωπιστικά (6), Εσπεριδοειδή-Καρυδιά-Αμυγδαλιά-Αμπέλι-Ζαχαρότευτλα-Λαχανικά (4), Μήλι- Πυρηνόκαρπα-Ελιά (2).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: Τομάτα-Πατάτα-Καλλωπιστικά (6), Εσπεριδοειδή-Καρυδιά-Αμυγδαλιά-Αμπέλι-Ζαχαρότευτλα-Λαχανικά (4), Μήλι- Πυρηνόκαρπα-Ελιά (2).

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Εσπεριδοειδή (200-250), Αμυγδαλιά-Καρυδιά (100-150), Μήλιά (100-200), Πυρηνόκαρπα (100-120), Αμπέλι-Τομάτα υπαίθρου & θερμοκηπίου-Πατάτα-Καλλωπιστικά (50-100), Ελιά (150-300), Λαχανικά (50-80), Ζαχαρότευτλα (40).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: Τομάτα-Πατάτα-Καλλωπιστικά (6), Εσπεριδοειδή-Καρυδιά-Αμυγδαλιά-Αμπέλι-Ζαχαρότευτλα-Λαχανικά (4), Μήλι- Πυρηνόκαρπα-Ελιά (2).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: Τομάτα-Πατάτα-Καλλωπιστικά (6), Εσπεριδοειδή-Καρυδιά-Αμυγδαλιά-Αμπέλι-Ζαχαρότευτλα-Λαχανικά (4), Μήλι- Πυρηνόκαρπα-Ελιά (2).

Παρατηρήσεις:

1) Οι μικρές δόσεις αφορούν στους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνοιξη, ιδιαίτερα για τη μήλη, και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθε-

νείων. 2) Στις καλλιέργειες: αμπέλι, εσπεριδοειδή, μήλη, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη, να ακολουθούνται, στις περι-

οχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Ακρόδουρα (Αμυγδαλιά-Καρυδιά): **28 ημέρες.**

Εσπεριδοειδή-Αμπέλι (Επιτραπέζια & οινολοιπία σταφύλια)-Ελιά-Πατάτα-Ζαχαρότευτλα:

21 ημέρες.

Λαχανικά (υπαίθρου & θερμοκηπίου)-Τομάτα θερμοκηπίου: **7 ημέρες.**

Τομάτα υπαίθρου: **10 ημέρες.**

Μη-εφαρμοσίμο (καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή).

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Είναι φυτοτοξικό στη Ροδακινιά, Κερασιά και Δαμασκινιά, αφού φουσκώσουν τα μύδια. Επίσης, μπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα στα καλοκαυθόειδη, κάτω από ορισμένες συνθήκες (υψηλή υγρασία). Φυτοτοξικότητα παρουσιάζει επίσης σε ορισμένες ποικιλίες Μήλιας. Γενικά, ν'αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνοιξη.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δε συνδυάζεται με οργανοφωσφορικά και καρβαμικά εντομοκτόνα, καθώς και με maneb, mancozeb, folpet, captan και thiram. Επίσης, δε συνδυάζεται με ελαιοχώρα σκευάσματα, όταν ο ψεκασμός γίνεται εκτός της εποχής του ληθάρου των δένδρων. Σε περίπτωση ανάμειξης, να διαλύονται πρώτα τα στερεά σκευάσματα, μετά το Cuprofix® Disperss® και μετά τα σκευάσματα σε υγρή μορφή. Σε περίπτωση νέων συνδυασμών, να γίνεται μία μικρή δοκιμή πριν από την τελική εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι σακούλες και οσάκι, μαζί με τα κουτιά, που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίαση, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτιθενται όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι σακούλες και οσάκι, μαζί με τα κουτιά, που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίαση, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτιθενται όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι σακούλες και οσάκι, μαζί με τα κουτιά, που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίαση, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτιθενται όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι σακούλες και οσάκι, μαζί με τα κουτιά, που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίαση, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτιθενται όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι σακούλες και οσάκι, μαζί με τα κουτιά, που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίαση, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτιθενται όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Cuprofix® DISPERSS® 20WG

Βορδιγάλλιος πολτός (Cu) 20%

Βρέξιμοι κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση: **Μεταλλικός Χαλκός (Cu) 20% β/β**

(σε μορφή Βορδιγάλλιου πολτού)

Βοηθητικές ουσίες: 19,03% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.φ.: 6864/03.07.2002

Μηλ. Λήξης Έγκρισης: 31.05.2014



Χαλκούχο μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:

Cerexagri S.A.S. - Plaisir, Γαλλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας-Συσκευαστής-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559

Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης, κορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για ήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** πλύνετε το αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Πενικιλιδιμίνη.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝ ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΩΔΑ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΕΚΑΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ 21 ΗΜΕΡΕΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ /ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.



04/2011-5

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 100 γρ.