

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

- Μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές.
- Μην τρώτε ή πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
- Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών – προσώπου. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

- Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την επικέτα όπου είναι δυνατόν).
 - Σε περίπτωση κατάποσης να χορηγηθούν 2-3 ποτήρια νερό και να προκληθεί εμετός μόνο εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του, με ερεθισμό του φάρυγγα.
 - Σε περίπτωση εισπνοής, να μεταφερθεί ο ασθενής στον καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει, να γίνει τεχνητή αναπνοή.
 - Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. Να αποφεύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροϊκού οξέος.
- Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων : (210) 77 93 777.

Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Μην μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.

Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.

Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον.

Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:



Αμπακέκ έξτρα

ABAMEC EXTRA 1,8 EC

Εντομοκτόνο-Ακαρεοκτόνο

Γαλακτωματοποιήσιμο Συμπύκνωμα (EC)

Εγγυημένη Σύνθεση : Abamectin: 1,8 % β/ο
Βοηθ. ουσίες: 98,20% β/β

**Εντομοκτόνο - Ακαρεοκτόνο
στομάχου και επαφής.**

Προκαλεί παράλυση στα έντομα με
αποτέλεσμα το θάνατο τους από αστία.

- Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης
- Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Xn-Xi

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

N

Επικίνδυνο για το
περιβάλλον**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:**

Το παρόν σκεύασμα κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά βάσει της άδειας με αρ. πρωτ. 5141/55614/6-6-2012.

Είναι πανομοιότυπο με το σκεύασμα που παρασκευάζεται από την εταιρία ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LTD και ήδη κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά δυνάμει της με αρ.14236 έγκρισης κυκλοφορίας, ACARAMIK 1,8 EC.

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:



YPSILON A.E.

Δ. Γληνού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49

Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378

e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com

www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο 1 λίτρο

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ

Αχλαδιά: Ψύλλα (Psylla pyricola) **75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού + 250 κ.εκ. παραφινικού λαδιού (θερινός πολτός).** Με την εμφάνιση 8-12 προνυμφών ανά ετήσιο βλαστό μήκους 20 εκ.

Τομάτα υπαίθρου: Τετράνυχος (Tetra-nychus spp) **60-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Με την εμφάνιση 5-10 κινητών μορφών ανά φύλλο.

Λιριόμυζα (Liriomyza spp) **75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Τομάτα θερμοκηπίου: Τετράνυχος (Tetra-nychus spp) **60-80 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Με την εμφάνιση 5-10 κινητών μορφών ανά φύλλο.

Λιριόμυζα (Liriomyza spp.) **75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Τριανταφυλλιά: Τετράνυχος (Tetra-nychus urticae, Tetranychus cinnabae-rinus) **40-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Με την εμφάνιση των ακάρεων.

Ντάλια: Τετράνυχος (Tetranychus spp) **40-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Με την εμφάνιση των ακάρεων.

Λιριόμυζα (Liriomyza spp) **75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Ζέρμπερες: Λιριόμυζα (Liriomyza spp) **75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα:

Αχλαδιά: 150 + 375 κ.εκ. παραφινικού λαδιού (θερινός πολτός)/στρ.

Τομάτα υπαίθρου: Τετράνυχος: 80 κ.εκ./στρ., Λιριόμυζα: 100 κ.εκ./στρ.

Τομάτα θερμοκηπίου: Τετράνυχος: 160 κ.εκ./στρ., Λιριόμυζα: 200 κ.εκ./στρ.

Τριανταφυλλιά: 48 κ.εκ./στρ.

Ντάλια: Τετράνυχος: 48 κ.εκ./στρ., Λιριόμυζα: 80 κ.εκ./στρ.

Ζέρμπερες: 80 κ.εκ./στρ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί.

Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:

• Αχλαδιά: 100-150 λίτρα

• Τομάτα (υπαίθρου): 50-100 λίτρα

• Τομάτα (θερμοκηπίου): 50-200 λίτρα

• Καλλωπιστικά: 50-80 λίτρα.

Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 2/7 για όλες τις καλλιέργειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού και προσθέτουμε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος και λαδιού (όπου συνιστάται) αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Στην αχλαδιά, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται ο συνδυασμός ABAMEC 1,8EC EXTRA + λάδι 14 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του μυκητοκτόνου CAPTAN.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Να μην συνδυάζεται με διαβρέκτες ή άλλα πρόσθετα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αχλαδιά: 14 ημέρες

Τομάτα υπαίθρου: 3 ημέρες

Τομάτα θερμοκηπίου: 7 ημέρες