

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Να φοράτε κατάλληλα γάντια. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής στο θερμοκήπιο. • Μην εισέλθετε στην περιοχή εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικινδύνους απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Γενικές πληροφορίες: Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Αφαιρέστε το ρουχισμό που ήρθε σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα: Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Επιδείξτε τον περιέκτη, την ετικέτα και/ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο, απομακρυνέτε τον σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική φροντίδα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά κρύνοντας τα βλέφαρα ανοικτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης: Να ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά να πιείτε άφθονο νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία (απολύμανση, ζωτικές λειτουργίες).

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

BASF
The Chemical Company

Cabrio Duo®
4/7.2 EC

Pyraclostrobin/Dimethomorph (τυρακλόστρομπιν/ντιμεθομόρφ)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Pyraclostrobin 4% β/ο (ομάδα μεθοζυκαρβαμικά), Dimethomorph 7.2% β/ο (ομάδα μορφολινικά), Βοηθητικές ουσίες 89% β/β.

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνα της ομάδας Ωομυκήτων (περονόσποροι) και Ασκομυκήτων (ωΐδια).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- **Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.**
- **Ερεθίζει το δέρμα.**
- **Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 60305 / 19-1-2011

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγ. Παρασκευή, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BASF SE, Γερμανία.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF Espanola SL, Ισπανία.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσ/νίκη.

© Σήμα κατατεθέν BASF

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποτοξιστική και διαλασματική κίνηση, ενώ το dimethomorph δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος και εμφανίζει επίσης διαλασματική κίνηση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.

ΤΟΜΑΤΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου με δόση 250-400 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών στην αρχή της άνθησης. Η μέγιστη δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με το μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού, ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα (200-250 κ.εκ./στρέμμα). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ):** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου και του ωΐδιου με δόση 250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (250 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται προληπτική ψεκασμών με την έναρξη του σχηματισμού των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **ΠΕΠΟΝΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ):** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου με δόση 250 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5ου πραγματικού φύλλου. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημερών, εφόσον απαιτείται. **ΜΑΡΟΥΛΙ, ΛΥΚΟΤΡΙΒΟΛΟ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ):** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου με δόση 200-250 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-80 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5ου πραγματικού φύλλου. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΟ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ):** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου με δόση 500 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (200-250 κ.εκ./ στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-50 λίτρα / στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 3ου φύλλου. Συστήνεται η προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **ΠΑΤΑΤΑ:** Για την καταπολέμηση του περονόσπορου με δόση 200-250 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών πριν να κλείσουν οι γραμμές της καλλιέργειας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες, εφόσον απαιτείται. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής. Τα μικρότερα μεσοδιαστήματα να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου εμφάνισης της προσβολής. 2. Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. 3. Να ακολουθούνται, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προεδιοποιήσεων.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συστήσιμη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς και σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: • Εφαρμόστε το CABRIO DUO 4/7.2 EC προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές. • Εφαρμόστε το CABRIO DUO 4/7.2 EC σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης (Μέγιστος αριθμός συνεχόμενων εφαρμογών: 2). • Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΤΕΛΕΥΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΚΟΜΙΣΗ:

Τομάτα (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου), Πεπόνι (Υπαίθρου), Πατάτα 3 ημέρες. Αγγούρι, Κολοκύθι (Θερμοκηπίου) 1 ημέρα. Μαρούλι, Λυκοτριβόλο, Κρεμμύδι, Σκόρδο (Υπαίθρου): 7 ημέρες.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

