



ΚΑΛΙΠΕΡΙΕΣ-ΕΧΘΡΟ-ΔΟΣΙΕΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΜΗΛΟΙΔΙΑ (Μηλίς-Αχλαδίτις): Αφίδες (*Dysaphis plantaginea*, *Aphis pomi*): Δόση: 20 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Προληπτικά (εκτός της *Aphis pomi*), στο στάδιο της πρόκλησης κορυφής σε συνδυασμό με θερμό λάδι 2,5-3%. Κατασταλτικά, με την εμφάνιση της προσβολής, στο στάδιο των κλειστών μπουμπούκων ή μετά την άνθηση –πριν των πετάλων έως την ωρίμανση. Φυλλορρυκτές (*Phyllonoxysta biancaldella*, *P. confullella*, *Leucopetra mallolella*): Δόση: 20 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Εφαρμογή στο μέγιστο της εξέδου των ακμίων από το βούξιμο. Στην 1η γενεά συλλίπτεται με το τέλος της ανθοπής –πρώτες των πετάλων.

Καρποκακία μηλιάς (*Dysia rosaceana*): Δόση: 20 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις των Τοπικών Κέντρων Γεωργικών Προσδοποτήσεων.

Ογκος φεκατοκού υγρού: 100 λίτρα/σπρέιμα.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Κερσιά, Ροδοκιά, Νεκταρίνα, Βερκοκιά): Αφίδες (*Myzus persicae*, *Myzus cerasi*, *Anuraphis persicae-niger*, *Hyalopertus spp.*): Δόση: 15 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Προληπτικά σε συνδυασμό με θερμό λάδι 2% μέχρι το στάδιο της ροδάκης κορυφής. Κατασταλτικά, με την εμφάνιση της προσβολής μετά την άνθηση και πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση. **Ογκος φεκατοκού υγρού:** 100-150 λίτρα/σπρέιμα.

ΒΑΜΒΑΚΙ: Αφίδες (*Aphis gossypii*): Δόση: 10-15 κ.εκ./σπρέιμα. Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. **Ογκος φεκατοκού υγρού:** 50-70 λίτρα/σπρέιμα.

ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΙΠΕΡΙΣ (Υπαιθρου & Θερμοκηπίου): Αφίδες (*Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*, *Aphis gossypii*), Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*): Δόση: 20 κ.εκ./100 λίτρα νερό, (Θερμοκηπίου): Αλευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*): Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. **Ογκος φεκατοκού υγρού:** 100-150 λίτρα/σπρέιμα.

ΑΓΓΟΥΡΙ, ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ για τουρσί, ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Υπαιθρου & Θερμοκηπίου): Αφίδες (*Aphis gossypii*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*): Δόση: 20 κ.εκ./100 λίτρα νερό, (Θερμοκηπίου): Αλευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*): Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. **Ογκος φεκατοκού υγρού:** 100-150 λίτρα/σπρέιμα.

ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υπαιθρου): Αφίδες (*Aphis gossypii*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*): Δόση: 20 κ.εκ./100 λίτρα νερό, **Ογκος φεκατοκού υγρού:** 100-150 λίτρα/σπρέιμα, Αλευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*): Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα νερό, **Ογκος φεκατοκού υγρού:** 100-150 λίτρα/σπρέιμα.

ΠΑΤΑΤΑ: Αφίδες (*Macrosiphum euphorbiae*): Δόση: 15-20 κ.εκ./σπρέιμα. Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*): Δόση: 15 κ.εκ./σπρέιμα. **Ογκος φεκατοκού υγρού:** 50-80 λίτρα/σπρέιμα. Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής.

ΚΑΠΝΟΣ: Αφίδες (*Myzus persicae*): Δόση: 15 κ.εκ./σπρέιμα. Εφαρμογή

με την έναρξη της προσβολής. **Ογκος φεκατοκού υγρού:** 50-100 λίτρα/σπρέιμα.

ΚΑΛΟΠΙΠΕΤΙΚΑ: Τριαντάφυλλο, Γαρύφαλλο, Χρυσάνθεμο, Σέρπεντα (Υπαιθρου & Θερμοκηπίου): Αφίδες (*Macrosiphum rosae*, *Aphis tabae*, *Aphis gossypii*, *Myzus persicae*): Δόση: 25 κ.εκ./100 λίτρα νερό, (Θερμοκηπίου): Αλευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*): Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. **Ογκος φεκατοκού υγρού:** 100-150 λίτρα/σπρέιμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η δόση εφαρμογής εξαρτάται από την πυκνότητα του πλυθθαμίου. Λόγω του μεγάλου αριθμού αποκτών καλλιεργητικών να γίνεται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρό αριθμό φυτών πριν από την εκτεταμένη χρήση του σκευάσματος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: 14-21 ημέρες. **Μείκτες αρθρής επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μηλιά, Αχλαδί, Κερσιά, Ροδοκιά, Νεκταρίνα, Βερκοκιά: 1, Λοιπές καλλιεργήσεις: 2

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΗ: Μηλιά, Αχλαδί, Κερσιά, Ροδοκιά, Νεκταρίνα, Βερκοκιά: 14 ημέρες, Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Αγγουράκι για τουρσί, Κολοκυθάκι, Πιπέρι, Πεπόνι, Καρπούζι: 3 ημέρες, Βαμβάκι, Πατάτα: 21 ημέρες, Καπνός: 7 ημέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλλιεργών φυλλώματος. Ο ογκός του φεκατοκού υγρού πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να γίνει καλή διάβρωση του φυλλώματος. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Το Calypso 480 SC είναι δισυσστημικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση για την αντιμετώπιση κερφών, μολύνσεων καθώς και μαστικών εντόμων σε διάφορες καλλιεργήσεις. Η δράση του εντοπίζεται στην παρεμπόδιση της μεταφοράς των νευρικών ερεθισμάτων στα έντομα. Δρα ανταγωνιστικά ως προς την ακετυλοχολίνη που είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά των νευρικών σημάτων στα έντομα και δεσμεύεται αντί αυτής στους υποδοχείς της που υπάρχουν στις νευρικές συνάψεις. Το thiadiprid δεν αποδράζει όπως η ακετυλοχολίνη, αλλά παραμένει δεσμευμένο στη συγκεκριμένη θέση, με αποτέλεσμα να προκαλείται διατάραξη της ισορροπίας στη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και τελικά θάνατος του εντόμου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος. Διατηρούμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστάμενες καλλιεργήσεις και δόσεις εφαρμογής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφέλιμων αρθρόποδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες. Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συστάμενες δόσεις και μεσοδιάστημα και να εξοφολογείται ότι επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας. Εναλλαγή εντομοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτό των χλωροκοντυλινών. Να μην χρησιμοποιείται το Calypso 480 SC σε καλλιεργήσεις όπου εφαρμόστηκαν άλλα εντομοκτόνα της ομάδας των χλωροκοντυλινών στη ίδια καλλιεργητική περίοδο. Σε περίπτωση που τα χλωροκοντυλινά δεν είναι πλέον αποτελεσματικά, να μην εφαρμόζεται το Calypso 480 SC και να σταματήσει η χρήση εντομοκτόνων της ομάδας αυτής.

Βayer Ελλάς ABE
Ζωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6169100



Bayer CropScience



Πυκνό Ενσώλημμα (SC)

Δραστική ουσία: thiadiprid 48% β/ο (αμδα νεονικονοειδών)

Βοηθ. ουσίες: 57,5% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:

14004 / 4-2-2008

Δισυσστημικό Εντομοκτόνο

για την καταπολέμηση μυλντικών και μαστικών εντόμων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

- Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης. • Υποπίπτει ευαίσθητη κατάσταση σε επαφή με το δέρμα.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική

Συνσκευασία και Σήμανση:

Bayer Ελλάς ABE

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΓΟΝΙΩΔΩΝ (γεωργικές καλλιεργήσεις και υδάτινες επιφάνειες) - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ: Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του φεκατοκού υγρού και μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις καλλιεργήσεις οι οποίες απεχούν λιγότερο από **5 μέτρα** για τις καλλιεργήσεις αγρού και **20 μέτρα** για τις δενδροβάδες καλλιεργήσεις από τα επικοινωνιακά υδάτια (για προστασία υδρόβιων οργανισμών). **5 μέτρα** για τις δενδροβάδες καλλιεργήσεις από γεωργικές καλλιεργήσεις ή φυτά (για προστασία μη στοχευόμενων αρθρόποδων).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τρίπλο ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστράψουν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψόμετρου που έχουν κατάλληλο εδαφολόγιο για την ασφαλή καταστροφή του.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο στην αρχική αφαιρούμενη συσκευασία του το σκεύασμα παραμένει σταθερό τουλάχιστον για 2 χρόνια.

Μηερ. Παρασκευής - Μηερ. Λήξης: Βλέπε στο κατάστιχο του κυκλ. Αρ.Περιόδου: Βλέπε αναμεικτός φιάλης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. • Οι γάντιες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες γάντιες εφόσον ασχολούνται στο πεδίο εφαρμογής μετά την ψεκασία. • Το υλικό και ο περιεχόμενος του θεωρούνται κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελεύθερη του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεκτά δεδομένα ασφαλείας. **ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Γενικά: Απομακρύνετε τον ασθενή από την επικίνδυνη περιοχή. Εάν υπάρχει κίνδυνος να χάσει τη συνείδηση, τοποθετήστε τον σε σταθερό μέρος σε πλευρά (πλευρική) θέση. Σε περίπτωση ελαφρώς μετακίνησης τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαίρεστε τα ρούχα που έχουν ρυπαριθεί και ξεπλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα με καθαρό νερό και σαπούνι. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης (ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο) την επόμενη. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7733777.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφεκαστή ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επικοινωνιακά υδάτια για τις καλλιεργήσεις αγρού και 20 μέτρων για τις δενδροβάδες καλλιεργήσεις.

Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια αφεκαστή ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι για γεωργική ή για τις καλλιεργήσεις καλλιεργήσεις.

N 10 1443 10