

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Γενικά: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αν εμφανιστούν προβλήματα ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δείξτε την συσκευασία, την ετικέτα ή/και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα αμέσως με τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα, πιείτε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό και μην δίνετε τίποτα από το στόμα αν ο ασθενής είναι αναισθητός ή έχει σπασμούς.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματικήθεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια, από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημ. Παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.



CECECE EXTRA® 46 SL

Chlormequat chloride (χλωρμεκουάτ χλωραίντ)

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: Chlormequat chloride 46% β/β
Βοηθητικές ουσίες 36% β/β

Ρυθμιστής ανάπτυξης φυτών στις καλλιέργειες του Σιταριού, της Σίκαλης, της Βρώμης και των Καλλωπιστικών.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ,
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκ. Κυκλοφορίας: 8047/4-2-82

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF SE, Γερμανία

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Σίνδος, Θεσσαλονίκη.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

© Σήμα κατατεθέν BASF

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΙΤΑΡΙ, ΣΙΚΑΛΗ, ΒΡΩΜΗ: Για να αποφευχθεί το πλάγιασμα, συνιστώνται ψεκασμοί φυλλώματος με όγκο ψεκαστικού υγρού: 40 λίτρα/στρέμμα. Για το σίταρι, συνιστάται 1 ψεκασμός με δόση 200-300 (μαλακό σίταρι) ή 250-350 (σκληρό σίταρι) κ.εκ. ανά στρέμμα από το τέλος του αδελφώματος και την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους μέχρι την εμφάνιση του πρώτου κόμβου/γονάτου. Για τη σίκαλη, συνιστάται 1 ψεκασμός με δόση 200-300 κ.εκ. ανά στρέμμα από το τέλος του αδελφώματος μέχρι την εμφάνιση του δεύτερου κόμβου/γονάτου. Για τη βρώμη, συνιστάται 1 ψεκασμός με δόση 200-300 κ.εκ. ανά στρέμμα από το δεύτερο κόμβο/γονάτο μέχρι την ψηλάφηση της φόβης στον μίσχο.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: Το CECECE EXTRA ελαττώνει το ύψος και ενθαρρύνει την ανθοφορία πολλών καλλωπιστικών φυτών όπως: *Euphorbia pulcherrima*, *Acalypha hispida*, *Abutilon hybrida*, *Aphelandra squarrosa*, *Begonia elatior* hybr., *Begonia lorraine*, *Chrysanthemum indicum*, *Dianthus* spp. (γαρύφαλλο), *Fuchsia* hybr., *Sinningia* sp., *Petunia* sp., *Hibiscus rosa-sinensis*, *Hydrangea macrophylla hortensis*, *Kalanchoe blossfeldiana*, *Lilium* sp., *Bougainvillea* sp., *Pachystachys lutea*, *Achimenes hendersonii*, *Beloperone guttata*, *Coleus* hybr., *Impatiens valleriana*, *Calceolaria integrifolia*, *Chrysanthemum frutescens* και *Pelargonium zonale*.

Συνιστάται 1 ψεκασμός πριν την άνθηση με δόση 50-100 κ.εκ. ανά στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι μεγαλύτερες δόσεις εφαρμόζονται σε αναπτυγμένα φυτά.
2. Στη βρώμη να μην συνδυάζεται με ορμονικά ζιζανιοκτόνα και με ζιζανιοκτόνα επαφής γενικά.
3. Να μην χρησιμοποιείται όταν η καλλιέργεια είναι βρεγμένη ή όταν αναμένεται βροχή ή παγετός.
4. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες εγκατεστημένες σε εδάφη χαμηλής γονιμότητας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Διαλύουμε τη συνιστώμενη δόση στην ποσότητα νερού που απαιτείται και αναδεύουμε καλά. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται πολλές φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.